

SOYUT MATEMATİK

Babamın Anısına...
ve Aileme ...

Erhan GÜLER

İki Önermenin Denkliği

örnek P ve q herhangi iki önerme olduğuna göre

$(P \vee q) \wedge P' \equiv P' \wedge q$ olduğunu gösterin.

p	q	p'	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge p'$	$p' \wedge q$
1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0

↑ ↑

Temel Özellikler =

Teorem: P, q, r herhangi önermeler; f doğru bir önermeyi,

t'de yanlış bir önermeyi göstermek üzere aşağıdaki özellikler vardır :

- 1- $P \vee P \equiv P$ ($\vee$ 'nin ayrılık, tek kuvvet özelliği.)
- 2- $P \wedge P \equiv P$ ($\wedge$ 'nin " " " " -)
- 3- $P \vee Q \equiv Q \vee P$ ($\vee$ 'nin değişme özelliği.)
- 4- $P \wedge Q \equiv Q \wedge P$ ($\wedge$ 'nin " " " -)
- 5- $P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$ ($\vee$ 'nin birleşme özelliği.)
- 6- $P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$ ($\wedge$ 'nin " " " -)
- 7- $P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ ($\wedge$ 'nin $\vee$ üzerine dağılma özelliği.) soldan
- 8- $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ ($\vee$ 'nin $\wedge$ " " " " -) soldan.
- 9- $(P \wedge Q) \vee R \equiv (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$ ($\vee$ 'nin $\wedge$ " " " " -) sağdan
- 10- $(P \vee Q) \wedge R \equiv (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$ ($\wedge$ 'nin $\vee$ " " " " -) sağdan
- 11- $(P \vee t) \equiv P$, $P \vee f \equiv P$ ($\vee$ 'nin özdeşlik özellikleri.)
- 12- $P \wedge t \equiv P$, $P \wedge f \equiv f$ ($\wedge$ 'nin " " " " -)
- 13- $P \vee P' \equiv t$ ($\vee$ 'nin tanımlama özelliği.)
- 14- $P \wedge P' \equiv f$ ($\wedge$ 'nin " " " " -)
- 15- $(P')' \equiv P$ ($'$ 'nin " " " " -)
- 16- $(P \vee Q)' \equiv P' \wedge Q'$ ($\vee$ 'nin Demorgan özelliği.)
- 17- $(P \wedge Q)' \equiv P' \vee Q'$ ($\wedge$ 'nin " " " " -)

ispat// $PVP \equiv P$

P	P	PVP
1	1	1
0	0	0
	↑	↑

ispat// $PVQ \equiv QVP$

P	Q	PVQ	QVP
1	1	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
0	0	0	0
	↑	↑	↑

t = yanlış

f = doğru

ispat// $P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \wedge (Q \wedge R)$	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \wedge R$
1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
		↑		↑		↑

ispat// $P \wedge t \equiv t$

P	t	$P \wedge t$
1	0	0
1	0	0
0	0	0
0	0	0
	↑	↑

ispat// $PVt \equiv P$

P	t	PVt
1	0	1
1	0	1
0	0	0
0	0	0
	↑	↑

ispat// $PVf \equiv f$

P	f	PVf
1	1	1
1	1	1
0	1	1
0	1	1
	↑	↑

ispat// $P \wedge f \equiv P$

P	f	$P \wedge f$
1	1	1
1	1	1
0	1	0
0	1	0
	↑	↑

ispat// $(P')' \equiv P$

P	P'	$(P')'$
1	0	1
0	1	0
	↑	↑

ispat// $(P \vee Q)' \equiv P' \wedge Q'$

P	Q	$(P \vee Q)'$	P'	Q'	$P' \wedge Q'$
1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1
		↑		↑	↑

ispat// $(P \wedge Q)' \equiv P' \vee Q'$

P	Q	$(P \wedge Q)'$	$P' \vee Q'$
1	1	0	0
1	0	1	1
0	1	1	1
0	0	1	1
		↑	↑

Teorem: P ve Q herhangi iki önerme olmak üzere

$$P \Rightarrow Q \equiv P' \vee Q$$

ispat//

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$P' \vee Q$
1	1	1	1
1	0	0	0
0	1	1	1
0	0	1	1
		↑	↑

Teorem: P ve Q iki ön. olsun.

ispat// $(P \Rightarrow Q) \equiv (Q' \Rightarrow P')$

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$Q' \Rightarrow P'$
1	1	1	1
1	0	0	0
0	1	1	1
0	0	1	1
		↑	↑

$$\begin{aligned}
 (P \Rightarrow Q) &\equiv (P \vee Q) \text{ (Teoremler)} \\
 &\equiv (Q \vee P') \text{ (}\vee\text{nin deđisme öz.)} \\
 &\equiv (Q')' \vee P' \text{ (önerme öz.)} \\
 (P \Rightarrow Q) &\equiv (Q' \Rightarrow P') \text{ (Teoremler)}
 \end{aligned}$$

Problemler :

① Aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk tablolarını düzenleyin.

a) $(P \vee r) \wedge (P \Rightarrow Q)$

P	Q	r	$P \vee r$	$P \Rightarrow Q$	$(P \vee r) \wedge (P \Rightarrow Q)$
1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	1	0

c) $[Q' \wedge (P \Rightarrow Q)] \Rightarrow P'$

P	Q	P'	$Q' \wedge (P \Rightarrow Q)$	$[Q' \wedge (P \Rightarrow Q)] \Rightarrow P'$
1	1	0	0	1
1	0	0	1	0
0	1	1	0	1
0	0	1	1	1

b) $(P \Rightarrow P) \vee (P \Rightarrow P')$

P	P'	$P \Rightarrow P'$	$(P \Rightarrow P) \vee (P \Rightarrow P')$
1	0	0	1
1	0	0	1
0	1	1	1
0	1	1	1

d) $[P \wedge Q] \Rightarrow r \Rightarrow [P \Rightarrow (Q \Rightarrow r)]$

P	Q	r	$P \wedge Q$	$[P \wedge Q] \Rightarrow r$	$P \Rightarrow (Q \Rightarrow r)$	f(x)
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1

e) $[(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow r)] \Rightarrow (P \Rightarrow r)$

P	Q	r	$(P \Rightarrow Q)$	$(Q \Rightarrow r)$	$[(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow r)]$	$[(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow r)] \Rightarrow (P \Rightarrow r)$
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1

② "P : Havalar soğuktur." "Q : Yağmur yağıyor." olduğuna göre, aşağıdaki önermeleri düğün birer cümleyle ifade edin;

a- P' : Havalar soğuk değildir.

f- $Q \vee P'$: Yağmur yağıyor veya havalar soğuk değil.

b- $P \wedge Q$: Havalar soğuk ve yağmur yağıyor.

g- $P' \vee Q'$: Havalar soğuk değil veya yağmur yağmıyor.

c- $P \vee Q$: Havalar soğuk veya yağmur yağıyor.

h- $P' \Rightarrow Q'$: Havalar soğuk değilse yağmur yağmıyor.

d- $Q \Rightarrow P$: Yağmur yağdığı için havalara soğuk.

i- $(Q')'$: Yağmurun yağmadığı doğru değildir.

e- $P \Rightarrow Q'$: Havalar soğuk ise yağmur yağmıyor.

k- $(P \wedge Q') \Rightarrow P$: Havalar soğuk ve yağmur yağmıyor ise havalara soğuktur.

③ $P: "0 \text{ uzun boyludur.}"$ $q: "0 \text{ esmerdir.}"$ ise aşağıdakileri ifade ediniz:

a- $0 \text{ uzun boylu ve esmerdir. } (P \wedge q)$

b- $0 \text{ nun kısa boylu ve esmer olduğu doğru değildir. } (P' \wedge q)' \equiv P \vee q'$

c- $0 \text{ ne uzun boyludur ne de esmerdir. } (P' \wedge q')$

④ Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini belirtin,

a) Eğer $3+2=7$ ise $4+4=8$ dir. $P' \Rightarrow q \rightarrow 0 \Rightarrow 1 \equiv 1 //$

b) $2+2=5$ in doğru olması için gerek ve yeter şartın $4+4=10$ olduğu doğru değildir.

$$(P' \Leftrightarrow q')' \rightarrow (0 \Leftrightarrow 0)' \equiv 0 //$$

c) Samsun, Marmara Bölgesindedir. Ya da Karadeniz Bölgesi Türkiye'nin batısındadır.

$$(P' \vee q') \rightarrow (0 \vee 0) \equiv 0 //$$

⑤ Aşağıdaki bileşik önermeleri, önerme özelliklerinden yararlanarak en basit şekilde yazın,

$$a- (P \vee q')' \equiv P' \wedge q$$

$$d- (P' \wedge q')' \equiv (P \vee q)$$

$$\cancel{b- (P' \Rightarrow q)' \equiv P \wedge q'}$$

$$\cancel{e- (P' \Leftrightarrow q)' \equiv P \wedge q'}$$

$$c- (P \wedge q')' \equiv P' \vee q \equiv q \vee P' \equiv (q')' \vee P'$$

$$f- (P' \Leftrightarrow q')' \equiv P \Leftrightarrow q$$

$$\equiv q \Rightarrow P' \equiv P \Rightarrow q$$

⑥ Aşağıdaki önermeleri değişik biçimlerde ifade edin;

a) Havanın yağmurlu ve soğuk olduğu doğru değildir. $(P \wedge q)' \equiv P' \vee q'$

b) Kar yağıyor ise hava soğuktur önermesi doğru değildir. $(P \Rightarrow q)' \equiv (P' \vee q)' \equiv P \wedge q'$

c) "Gülün kırmızı olması için gerek ve yeter şart menekşenin mor olmasıdır" önermesi doğru değildir. $(P \Leftrightarrow q)'$

$$⑤ \quad b- (P' \Rightarrow q)' \equiv (P' \vee q)' \equiv (P \vee q)' \equiv P' \wedge q'$$

$$⑥ \quad (P' \Leftrightarrow q)' \equiv [(P' \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow P')]' \equiv [((P')' \vee q) \wedge (q' \vee P')]' \equiv [(P \vee q) \wedge (q' \vee P')]'$$

$$\equiv (P \wedge q') \vee (q \wedge P)$$

$$\equiv r \vee (q \wedge P) \equiv (r \vee q) \wedge (r \vee P)$$

$$\equiv [(P' \wedge q') \vee q] \wedge [(P' \wedge q') \vee P]$$

$$\equiv [(P' \vee q) \wedge (q' \vee q)] \wedge [(P' \vee P) \wedge (q' \vee P)]$$

$$\equiv [(P' \vee q) \wedge f] \wedge [f \wedge (q' \vee P)]$$

$$\equiv (P' \vee q) \wedge (q' \vee P) \equiv P \Leftrightarrow q$$

Soru

$$P \Rightarrow Q \neq Q \Rightarrow P$$

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow P$
1	1	1	1
1	0	0	1
0	1	1	0
0	0	1	1

Soru

$$P \Rightarrow (Q \vee R) \equiv (P \Rightarrow Q) \vee R$$

P	Q	R	$P \Rightarrow (Q \vee R)$	$(P \Rightarrow Q) \vee (P \Rightarrow R)$
1	1	1	1	1
1	1	0	1	1
1	0	1	1	1
1	0	0	0	0
0	1	1	1	1
0	1	0	1	1
0	0	1	1	1
0	0	0	1	1

Soru

$$P \Rightarrow (Q \Rightarrow R) \neq (P \Rightarrow Q) \Rightarrow R$$

P	Q	R	$P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)$	$(P \Rightarrow Q) \Rightarrow R$
1	1	1	1	1
1	1	0	0	0
1	0	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	1	1
0	1	0	0	0
0	0	1	1	1
0	0	0	1	0

Soru

$$P \Leftrightarrow Q' \text{ } \text{uyuşma mıdır?}$$

P	Q	P'	Q'	$P \Leftrightarrow Q'$	$P \Leftrightarrow Q$
1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1

$$P \Leftrightarrow Q \equiv P' \Leftrightarrow Q'$$


totoloji

$$\begin{aligned} P \Leftrightarrow Q' &\equiv (P' \Rightarrow Q) \wedge (Q' \Rightarrow P) \equiv [(P')' \vee Q] \wedge [(Q')' \vee P'] \\ &\equiv (P \vee Q') \wedge (Q \vee P') \equiv (Q \vee P') \wedge (P \vee Q') \equiv (P' \vee Q) \wedge (Q' \vee P) \equiv (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P) \\ &\equiv P \Leftrightarrow Q \end{aligned}$$

Önermelerin Elektrik Devrelerine Uygulanması :

En basit bir elektrik devresinde; bir anahtar 

bir lamba  akım kaynağı  vardır.



P: "Anahtarı kapalıdır," "Devreden akım geçer,"

"Lamba yanar," doğru ise,


"P anahtarı açıktır," devreden akım geçmez,"

lamba yanmaz, önermeleri de yanlıştır.

$P \Rightarrow Q$ nun doğruluk değeriyle ifade edilir.

Seri Bağlı Devreler :

P ve q gibi iki anahtar bulunan bir devreyi düşünelim.




P1q nun doğru olduğu zaman lamba yanar aksi halde lamba yanmaz.

P	q	P1q
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

→ yanar
} yanmaz.

Paralel Bağlı Devreler :

P ve q gibi iki anahtar bulunan bir devreyi düşünelim.




PVq doğru ise lamba yanar aksi halde lamba yanmaz.

P	q	PVq
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

→ yanar
} yanmaz.

Karışık Devreler :

Bir devrede, seri ve paralel bağlı anahtar varsa karışık devredir.



$(P1q)V(r1s)$

P

Lambanın yanması için gerek ve yeter şart nedir?

P	q	r	s	P1q	r1s	$(P1q)V(r1s)$
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

geçer

geçer

geçer

geçer

Teoremler için İspat Yolları :

Teoremler $P \Rightarrow Q$ ve $P \Leftrightarrow Q$ şeklinde olur. P hipotez, Q hükümdür. İki ispat metodu vardır.

a- Tümevarım metodu (ilkesi).

b- Tümdengelim " " .

Teorem (Tümdengelim ilkesi)

P, Q, R herhangi üç önerme olmak üzere $(P \Rightarrow R) \wedge (R \Rightarrow Q)$ bileşik önermesinin doğru olduğu durumlarda $P \Rightarrow Q$ önermesi de doğrudur.

P	Q	R	$P \Rightarrow R$	$R \Rightarrow Q$	$(P \Rightarrow R) \wedge (R \Rightarrow Q)$	$P \Rightarrow Q$
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	1	1	1	1

Tümdengelim ilkesinden faydalanarak teoremler iki türlü ispatlanır.

1- Doğrudan ispat

2- Dolaylı ispat

Doğrudan İspat :

$P \Rightarrow Q$ teoremi veriliyor. Bu teoremin doğruluğunu ispatlamak istersek,

$P \Rightarrow r_1$, (özellik teoremi) (P nin doğruluğundan r_1 doğru önermesi)

$r_1 \Rightarrow r_2$, (.....) (r_1 in " " " ")

$r_2 \Rightarrow r_3$, (.....) (r_2 nin " " " ")

$\vdots$
 $r_{n-1} \Rightarrow r_n$ (.....) (r_{n-1} in " " " ")

$r_n \Rightarrow Q$

$(P \Rightarrow r_1 \wedge r_1 \Rightarrow r_2) \Rightarrow (P \Rightarrow r_2)$ de doğrudur.

$(P \Rightarrow r_2 \wedge r_2 \Rightarrow r_3) \Rightarrow (P \Rightarrow r_3)$ "

$\vdots$
 $(P \Rightarrow r_n \wedge r_n \Rightarrow Q) \Rightarrow (P \Rightarrow Q)$ de doğrudur.

Teoremler için İspat Yolları :

Teoremler $P \Rightarrow Q$ ve $P \Leftrightarrow Q$ şeklinde olur. P hipotez, Q hükümdür. İki ispat metodu vardır.

a- Tümevarım metodu (ilkesi).

b- Tümdengelim " " .

Teorem (Tümdengelim ilkesi)

P, Q, R herhangi üç önerme olmak üzere $(P \Rightarrow R) \wedge (R \Rightarrow Q)$ bileşik önermesinin doğru olduğu durumlarda $P \Rightarrow Q$ önermesi de doğrudur.

P	Q	R	$P \Rightarrow R$	$R \Rightarrow Q$	$(P \Rightarrow R) \wedge (R \Rightarrow Q)$	$P \Rightarrow Q$
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	1	1	1	1

Tümdengelim ilkesinden faydalananarak teoremler iki türlü ispatlanır.

1- Doğrudan ispat

2- Dolaylı ispat

Doğrudan İspat :

$P \Rightarrow Q$ teoremi veriliyor. Bu teoremin doğruluğunu ispatlamak istersek,
 $P \Rightarrow r_1$, (özellik tanımı teoremi) (P nin doğruluğundan r_1 doğru önermesi)

$r_1 \Rightarrow r_2$, (.....) (r_1 in " r_2 " ")

$r_2 \Rightarrow r_3$, (.....) (r_2 nin " r_3 " ")

$\vdots$
 $r_{n-1} \Rightarrow r_n$ (.....) (r_{n-1} in " r_n " ")

$r_n \Rightarrow Q$

$(P \Rightarrow r_1 \wedge r_1 \Rightarrow r_2) \Rightarrow (P \Rightarrow r_2)$ de doğrudur.

$(P \Rightarrow r_2 \wedge r_2 \Rightarrow r_3) \Rightarrow (P \Rightarrow r_3)$ "

$\vdots$
 $(P \Rightarrow r_n \wedge r_n \Rightarrow Q) \Rightarrow (P \Rightarrow Q)$ de doğrudur.

Örnek // n doğal sayısı tek ise n^2 doğal sayısı da tektir.

$$n = 2k + 1$$

İspat n tek ise $n = 2k + 1$ (tek sayı tanımı)

$$n = 2k + 1 \Rightarrow n^2 = (2k + 1)^2 \quad (n \text{ yerine değeri yazılarak})$$

$$n^2 = (2k + 1)^2 \Rightarrow n^2 = 4k^2 + 4k + 1 \quad (\text{Doğal sayılarda çarpma işlemi})$$

$$n^2 = 4k^2 + 4k + 1 \Rightarrow n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1 \quad (\text{Ortak çarpan parantezine alma})$$

$$n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1 \Rightarrow n^2 = 2r + 1 \quad (r = 2k^2 + 2k \text{ yazılarak})$$

$$n^2 = 2r + 1 \Rightarrow n^2 \text{ tek sayıdır (tek sayı teoremi)}$$

n tek ise n^2 tektir.

Dolaylı ispat :

1) $(p \Rightarrow q) \equiv ((q' \Rightarrow p'))$ olmayışa erişim metodu ile ispat.

Örnek $3x + 2 \neq 5$ ise $2x + 3 \neq 5$ doğruluğunu ispatlayınız ?

$$q' : 2x + 3 = 5 \Rightarrow 3x + 2 = 5 : p'$$

$$2x + 3 = 5 \Rightarrow 2x + 3 = 2 + 3 \quad (\text{Doğal sayılarda toplama})$$

$$2x + 3 = 2 + 3 \Rightarrow 2x = 2 \quad (\text{Doğal sayılarda sadeleştirme})$$

$$2x = 2 \Rightarrow x = 1 \quad (" " \text{ çarpma işlemi sadeleştirme öz.})$$

$$x = 1 \Rightarrow 3x = 3 \quad (" " \text{ çarpma, her iki taraf 3 ile çarp.})$$

$$3x = 3 \Rightarrow 3x + 2 = 3 + 2 \quad (\text{iki tarafı 2 ile toplamak})$$

$$3x + 2 = 3 + 2 \Rightarrow 3x + 2 = 5 \quad (\text{toplama işlemi})$$

$$3x + 2 \neq 5 \Rightarrow 2x + 3 \neq 5$$

2) $(p \Rightarrow q) \equiv p' \vee q \equiv ((p')' \wedge q')' \equiv (p \wedge q')'$

$p \Rightarrow q$ nun doğruluğunu ispatlama yerine, $p \wedge q'$ in yanlış olduğunu ispatlarsak, teoremin doğruluğunu ispatlamış oluruz.

$p \wedge q' \equiv r \wedge r'$ Çelişki bulma yöntemi.

Örnek // $2x+3=5$ ise $3x+2=5$ olduğunu ispatlayınız?
 $P \Rightarrow Q$

$$P \wedge Q' : (2x+3=5 \wedge 3x+2 \neq 5)$$

$$\Rightarrow (2x+3=2+3) \wedge (3x+2 \neq 3+2) \text{ (Toplama işlemi)}$$

$$\Rightarrow (2x=2) \wedge (3x \neq 3) \text{ (Top. iş. sad. öz)}$$

$$\Rightarrow (x=1) \wedge (x \neq 1) \text{ (Çarp. iş. sad. öz)}$$

$P \Rightarrow Q$ doğru $P \wedge Q'$ yanlıştır.

Bir Önermenin Yanlış Olduğunu Gösterme :

① $P \Rightarrow Q$ veriliyor.

Aksine bir örnek bulma metodu.

$$P \Rightarrow Q \equiv P' \vee Q$$

$$(P \Rightarrow Q)' \equiv (P' \vee Q)' \equiv P \wedge Q'$$

Örnek // Bir doğal sayı 6 ve 4 ile bölünürse bu doğal sayı 24 ile de bölünür.

60 $6/60$ ve $4/60$ $24/60$ olduğu için yanlıştır.

$P: 6/60 \wedge 4/60$ doğrudur.

$Q: 24/60$ yanlıştır.

$Q': 24/60$ doğrudur. $P \wedge Q'$ doğrudur.

$(P \wedge Q')'$ yanlıştır, $P \Rightarrow Q$ yanlıştır.

② Çelişki bulma metodu :

$P \Rightarrow Q$ veriliyor.

$P \Rightarrow Q$ (1. sonuç)

P nin doğruluğundan faydalanarak doğru olduğu bilinen bir r_1 önermesi elde edelim. $P \Rightarrow r_1$

r_1 'in doğruluğundan, r_2 doğru önermesi elde ediliyor. $r_1 \Rightarrow r_2$

$P \Rightarrow r_1, r_1 \Rightarrow r_2, r_2 \Rightarrow r_3, \dots, r_n \Rightarrow r$

$\Rightarrow P \Rightarrow r$ doğrudur. (2. Sonuç)

$P \Rightarrow Q, P \Rightarrow r$

Sonuç : $P \Rightarrow Q$ doğru değildir.

Örnek Bir doğal sayı tek ise, karesi çift sayıdır,, önermesinin yanlış olduğunu ifade ediniz?

n doğal sayı, n^2 karesi olsun.

$n=2k+1$ tek ise, $n=2k$ çift ise.

İspat n tek $\Rightarrow n^2$ çifttir doğru olsun. (1. sonuç)

n tek ise $\Rightarrow n=2k+1$ (Tek doğal sayı tanımı)

$n=2k+1 \Rightarrow n^2=(2k+1)^2$ (n yerine değeri yazılarak)

$n^2=(2k+1)^2 \Rightarrow n^2=4k^2+4k+1$ (Doğal sayılarda çarpma işlemi tanımı)

$n^2=4k^2+4k+1 \Rightarrow n^2=2(2k^2+2k)+1$ (Ortak parantez)

$n^2=2(2k^2+2k)+1 \Rightarrow n^2=2k'+1$ ($2k^2+2k=k'$ yazılarak)

$n^2=2k'+1 \Rightarrow n^2$ tek sayıdır (Tek sayı tanımı)

n tek $\Rightarrow n^2$ tektir. (2. sonuç)

Sonuç = n tek ise n^2 çifttir önermesi yanlıştır.

Problemler =

1- Aşağıdaki önermelerin yanlış olduğunu ispat edin.

a) n doğal sayısı tek ise asaldır.

b) n doğal sayısı asal ise tektir.

2- Aşağıdaki önermelerin doğruluğunu ispat edin.

a) n doğal sayısı çift ise $(n+1)$ tektir.

b) $(n+1)$ doğal sayısı tek ise n çifttir.

c) $(m+n)$ doğal sayısı ~~tek~~ ise m veya n doğal sayısı tektir.

3- Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini belirtin.

a) Her teoremin karsıtı da doğrudur.

b) Her teoremin tersi de doğrudur.

c) Her teoremin karsıt-terisi de doğrudur.

① a- $P: n=9$ tektir.

$q: n=9$ asaldır. $q': n=9$ asal değildir.

$P \wedge q': n=9$ tektir ve asal değildir, doğrudur.

$(P \wedge q')' \equiv P \Rightarrow q$ yanlıştır.

" $n=9$ tek ise asaldır," yanlıştır.

b- $P: n=9$ asaldır.

$q: n=9$ tektir. $q': n=9$ tek değildir.

$P \wedge q': n=9$ asaldır ve tek değildir.

$(P \wedge q')' \equiv P \Rightarrow q$ yanlıştır.

" $n=9$ asal ise tektir," yanlıştır.

② a- $P: n$ doğal sayısı çifttir.

$q: (n+1)$ " " tektir.

n çift $\Rightarrow n=2k$ (çift sayı tanımı)

$n=2k \Rightarrow (n+1)=2k+1$ (yerine yazarak)

$(n+1)=2k+1 \Rightarrow n+1$ tek sayıdır. (Tek sayı tanımı)

n çift $\Rightarrow n+1$ tek sayıdır.

c- $P: (m+n)$ doğal sayısı tektir.

$q: m$ veya n doğal sayısı tektir.

$P \Rightarrow q: (m+n)$ tek ise m veya n tektir.

i)) m çift olsun. $m=2r$

$m+n$ tek $\Rightarrow (m+n)=2k+1$ (Tek sayı tanımı)

$(m+n)=(2k+1) \Rightarrow 2r+n=2k+1$ ($m=2r$ yazılarak)

$2r+n=2k+1 \Rightarrow n=2k+1-2r$ (n gözülerek)

$n=2k+1-2r \Rightarrow n=2(k-r)+1$ (Çarpanlara ayırma)

$n=2(k-r)+1 \Rightarrow n$ tek sayıdır.

KÜME Herhangi bir topluluktur. (=cümle)

Kümeler, $A, B, C, \dots$ gibi büyük harflerle gösterilir.

Meydana getirdiği topluluk, kümelerin elemanlarıdır. Elemanlar a, b, c gibi küçük harflerle gösterilir. Kümelerin elemanlarıyla gösterilmesi iki türdür.

1- Liste yöntemi (açık gösterim). $\{ \dots, \dots, \dots \}$

Örnek// Türkiye'nin E harfiyle başlayan illerinin kümesi,

$$\{ \text{Edirne, Eskişehir, Elazığ, Erzurum, Erzincan} \}$$

2- Özellik Yöntemiyle Gösterimi: $\{ x : x \text{ in sağladığı özellikler} \}$

(kapalı gösterimi.)

Örnek// $\{ x : x \text{ E harfiyle başlayan bir il} \}$

Örnek// $A = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \}$

$$A = \{ x : x \text{ bir doğal sayı } 1 \leq x \leq 7 \}$$

$$A = \{ x : x \text{ bir doğal sayı } 0 < x^2 < 50 \}$$

- Eğer bir a elemanı bir A kümesine aitse, $a \in A$, " a elemanı A ", şeklindedir.
- " " " " " aite değilse, $a \notin A$ " a elemanı değil A ", dır.

İki Kümenin Eşitliği:

A ve B iki küme olsun. A ve B kümeleri aynı elemanlardan kurulmuşsa, iki kümeye eşittirler denir ve $A=B$ yazılır.

Örnek// $A = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \}$ $B = \{ x : x \text{ bir doğal sayı } 1 \leq x \leq 7 \}$ $A=B$ dir.

Alt küme:

A ve B kümeleri verilsin.

$A \subset B$ veya $B \supset A$, A 'nin her bir elemanı B 'nin de elemanı ise, A kümesi B nin alt kümesidir. (B , A 'yı kapsar.)

$A \not\subset B$, $B \not\supset A$ değildir.

$A \subseteq B \Rightarrow (A=B \text{ veya } A \subset B \text{ doğru ise})$

$B \supseteq A$

Eğer $A \neq B$ ve $A \subset B$ ise ; A kümesi, B kümesinin has, (öz) alt kümesidir.

İki Kümenin Birleşimi :

A ve B kümeleri verilsin.

$A \cup B$: "A birleşim B", (A ve B de bulunan elemanlarla oluşan yeni küme.)

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ veya } x \in B\}$$

İki Kümenin Kesişimi :

A ve B iki küme olmak üzere A ve B de ortak olan elemanların oluşturduğu yeni küme, iki kümenin kesişimi (arakesiti) denir.

$A \cap B$ ile gösterilir.

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ ve } x \in B\}$$

Boş Küme :

Hiçbir elemanı olmayan kümeye denir. $\emptyset, \{\}$ şeklinde gösterilir.

$$\{x : x \text{'in sağladığı özellikler}\}$$


Örnek // $\{x : x \in \mathbb{R} \wedge x > 1 \wedge x \leq 1\} = \emptyset$

Venn Şeması


Bir kapalı şekil içine kümenin elemanları nokta halinde dizilir. Bu şekle

Venn şeması denir.

Örnek // $A = \{a, b, c, d\}$



$B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$



Açık Önerme

İçinde değişken (ya da değişkenler) bulunan ve bir hüküm bildiren ifadelere (cümlelere) açık önerme denir. Eğer bir tek değişken varsa; $p(x), q(x)$ ---- gibi

1- değişkenli açık önerme denir. 2 değişken varsa; $p(x, y), q(x, y)$ ---- gibi

2- değişkenli açık önerme denir.

Örnek // 1- x tamsayısı sıfırdan büyüktür.

2- $x=3$ ve $y=2$ dir.

3- $x^2 + y^2 = 1$ dir. ifadeleri birer açık önermedir.

Açık önermeden anlamsız ifadeler elde edilmesini önlemek için değişkenler yerine yazılan ifadeler (değerler) bir kümeden alınır. Bu kümeye açık önermenin tanım kümesi denir.

Örnek // x herhangi bir doğal sayı olmak üzere " $x+2 > 7$ " dir. ifadesi doğal sayılar kümesinde tanımlı bir açık önermedir.

$$p(x) : x+2 > 7 \text{ dir.}$$

$x=2$ için $p(2) : 4 > 7$, önermesi yanlıştır. Doğruluk değeri 0. dir

$x=8$ için $p(8) : 10 > 7$, önermesi doğrudur. " " 1 dir.

Tanım : Bir A kümesinde tanımlı bir $p(x)$ açık önermesi verilsin. Bu açık önermede x yerine yazıldığında hep doğru önermeler veren elemanların kümesine açık önermenin doğruluk kümesi denir.

Örnek // Doğal sayılar kümesinde tanımlı " $x+3 > 11$ ", açık önermesinin doğruluk kümesi nedir?

$$D = \{9, 10, 11, \dots\} \quad \text{değer} \quad \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\} \quad \text{tanım}$$

Örnek // Doğal sayılar kümesinde tanımlı $x+5 < 3$ açık önermesinin doğruluk kümesi nedir?

$$D = \emptyset \quad D = \{x | x \in \mathbb{N} \wedge x+5 < 3\} = \emptyset$$

Niceleyiciler :

1- Evrensel Niceleyici : $p(x)$, A kümesinde tanımlı bir açık önerme olsun.

"Her $x \in A$ için $p(x)$ dir." ifadesi bir önermedir.

Bu önerme $p(x)$ 'den elde edilen tüm önermeler doğru ise doğru, aksi halde yanlıştır.

"Her $x \in A$ için $p(x)$ tir." " $\forall x \in A, p(x)$,"

$\forall$: (Her) : Evrensel niceleyici.

Örnek // $\forall k \in \mathbb{N}$ için $2k+1$ tek sayıdır.

$\forall k \in \mathbb{N}, 2k+1$ tektir.

Örnek // " $\forall x \in \mathbb{N}$ için $x+4 > 3$ " $D = \mathbb{N}$

Sonuç = 1- $D \neq A$ ise önerme (doğruluk değeri) 0 dir.

2- $D = A$ ise " " " 1 dir.

Örnek // " $\forall x \in \mathbb{N}$ için $x+2 > 8$ "

$D = \{7, 8, 9, \dots\} \Rightarrow D \neq \mathbb{N}$ yanlış bir önermedir.

2- **Varlıksal Niteleyici** = $p(x)$, A kümesinde tanımlı bir açık önerme olsun. "En az bir $x \in A$ için $p(x)$ tir,, ifadesi de bir önermedir.

Bu önerme $p(x)$ den elde edilen önermelerden en az biri doğru olduğunda doğru, aksi halde yanlıştır.

En az bir $\equiv$ bazı

"Bazı $x \in A$ için $p(x)$ dir,, " $\exists x \in A, p(x)$,"

$\exists$: (Bazı = en az bir) : Varlıksal niteleyici.

Sonuç 1- $D = \emptyset$ ise yanlıştır.

2- $D \neq \emptyset$ ise doğrudur.

Örnek // "Bazı insanlar gözlüklüdür,,

$D \neq \emptyset$ doğrudur.

Örnek // " $\exists x \in \mathbb{N}$ için $(x-1)(x+2) = 0$ dir,,

$D \neq \emptyset$ doğrudur. $x=1$ veya $x=-2$ için bu önerme sıfırdır.

Niteleyiciler ve Bağlaçlar :

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ kümesinde tanımlı bir açık önerme $p(x)$ olsun.

" $\forall x \in A$ için $p(x)$ " $\equiv [p(a_1) \wedge p(a_2) \wedge \dots \wedge p(a_n)]$ doğrudur.

" $\exists x \in A$ için $p(x)$ " $\equiv [p(a_1) \vee p(a_2) \vee \dots \vee p(a_n)]$ doğrudur.

Niteleyicilerde Olumsuzluk

Teorem : A kümesinde tanımlı bir açık önerme $p(x)$ olsun.

a) $[\forall x \in A, p(x)]' \equiv [\exists x \in A, [p(x)]']$

b) $[\exists x \in A, p(x)]' \equiv [\forall x \in A, [p(x)]']$

İspat // a) " $\forall x \in A, p(x)$ " önermesi doğru ise $D = A$ doğrudur.

$\exists x \in A, [p(x)]'$ yanlıştır.

ii) " $\forall x \in A, p(x)$ " yanlış ise $D \neq A$

$\exists x \in A, [p(x)]'$ doğru olur.

$$[\forall x \in A, p(x)]' \equiv [\exists x \in A, [p(x)]']$$

b)

Niceleyicilerde Değitcilik =

Teorem = Bir A kümesinde tanımlı iki açık önerme $p(x)$ ve $q(x)$ olsun.

a- $[\forall x \in A, [p(x) \wedge q(x)]] \equiv [\forall x \in A, p(x)] \wedge [\forall x \in A, q(x)]$

b- $[\exists x \in A, [p(x) \vee q(x)]] \equiv [\exists x \in A, p(x)] \vee [\exists x \in A, q(x)]$

ispat// $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

⑤ $[\forall x \in A, p(x) \wedge q(x)] \equiv [p(a_1) \wedge q(a_1)] \wedge [p(a_2) \wedge q(a_2)] \wedge \dots \wedge [p(a_n) \wedge q(a_n)]$
 $\equiv [p(a_1) \wedge p(a_2) \wedge \dots \wedge p(a_n)] \wedge [q(a_1) \wedge q(a_2) \wedge \dots \wedge q(a_n)]$
 $\equiv [\forall x \in A, p(x)] \wedge [\forall x \in A, q(x)]$ (Andin birleşme ve değişme öz.)

⑥ $[\exists x \in A, [p(x) \vee q(x)]] \equiv [p(a_1) \vee q(a_1)] \vee [p(a_2) \vee q(a_2)] \vee \dots \vee [p(a_n) \vee q(a_n)]$
 $\equiv [p(a_1) \vee p(a_2) \vee \dots \vee p(a_n)] \vee [q(a_1) \vee q(a_2) \vee \dots \vee q(a_n)]$
 $\equiv [\exists x \in A, p(x)] \vee [\exists x \in A, q(x)]$ (Vnin birleşme ve değişme öz.)

Problemler =

1- $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ise A kümesinde tanımlanan, aşağıdaki açık önermelerin doğruluk kümesini bulun?

a) $x+3=10$ b) $x+3 < 5$ c) $x+3 < 10$ d) $x+3 < 7$

2- $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ise A kümesinde tanımlanan, aşağıdaki önermelerin yanlış olduğunda dair örnek verin?

a) $\forall x \in A, x+5 < 11$ d) $\forall x \in A, x$ tek tir.

b) $\forall x \in A, x^2 > 11$

c) $\forall x \in A, x$ asaldır.

3- Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini belirtin.

a) $\forall x \in \mathbb{R}, |x| = x$

c) $\exists x \in \mathbb{R}, |x| = 0$

b) $\forall x \in \mathbb{R}, x+1 \geq x$

d) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = x$

4- Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini belirtin.

a) $\forall x \in \mathbb{Z}, \frac{x}{x} = 1$

c) $\forall x \in \mathbb{Z}, (x^2 = 2x)'$

b) $\exists x \in \mathbb{Z}, \frac{x}{x} = 1$

d) $\exists x \in \mathbb{Z}, x = 2x$

5- $A = \{2, 3, 4, 5\}$ ise aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini belirtin ve olumsuzlarını (değilini) bulun.

a) $\exists x \in A, x+3 = 10$

c) $\exists x \in A, x+3 < 5$

b) $\forall x \in A, x+3 < 10$

d) $\forall x \in A, x+3 < 7$

Çözümler:

1- a) $x+3=10$, $D = \emptyset$ boş küme. $x+1 \geq x \Rightarrow x+1 > x$ veya $x+1 = x$

b) $x+3 < 5$ $D = \{0, 1\}$

c) $x+3 < 10$ $D = A$ doğru.

d) $x+3 < 7$ $D = \{0, 1, 2, 3\}$

2- a) $\forall x \in A, x+5 < 11$, $x=7$ ise $p(7) : 12 < 11$ $D \neq A$ yanlış.

b) $\forall x \in A, x^2 > 11$ $x=3$ ise $p(3) : 9 > 11$ $D \neq A$ yanlış.

c) $\forall x \in A$ x asaldır. $x=9$ $D \neq A$ yanlış.

d) $\forall x \in A$ x tektir $x=2$ ise $p(2) = \text{çifttir}$ $D \neq A$

3- a) $|x| = -x$ ise $D \neq A$ olur. yanlıştır.

b) $x+1 \geq x$, $\forall x \in \mathbb{R}$ doğrudur.

c) $\exists x \in \mathbb{R} |x| = 0$ $x=0$ ise $p(0) : |x| = 0$ dir. doğrudur.

d) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = x$ doğrudur $\{0, 1\}$ için.

4- a) $\forall x \in \mathbb{Z}, \frac{x}{x} = 1$ sıfır için $\frac{0}{0}$ olduğu için yanlıştır. Doğruluk değeri 0 dir.

b) $\exists x \in \mathbb{Z}, \frac{x}{x} = 1$ doğrudur.

c) $\forall x \in \mathbb{Z}, (x^2 = 2x)' \Rightarrow \forall x \in \mathbb{Z}, x^2 \neq 2x$ 2 için yanlıştır. Yanlış 0 dir.

d) $\exists x \in \mathbb{Z}, x = 2x$ doğrudur. $x=0$ için.

3- Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini belirtin.

a) $\forall x \in \mathbb{R}, |x| = x$ c) $\exists x \in \mathbb{R}, |x| = 0$

b) $\forall x \in \mathbb{R}, x+1 \geq x$ d) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = x$

4- Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini belirtin.

a) $\forall x \in \mathbb{Z}, \frac{x}{x} = 1$ c) $\forall x \in \mathbb{Z}, (x^2 = 2x)'$

b) $\exists x \in \mathbb{Z}, \frac{x}{x} = 1$ d) $\exists x \in \mathbb{Z}, x = 2x$

5- $A = \{2, 3, 4, 5\}$ ise aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini belirtin ve olumsuzlarını (değilini) bulun.

a) $\exists x \in A, x+3 = 10$ c) $\exists x \in A, x+3 < 5$

b) $\forall x \in A, x+3 < 10$ d) $\forall x \in A, x+3 < 7$

Çözümler:

1- a) $x+3 = 10$, $D = \emptyset$ boş küme. $x+1 \geq x \Rightarrow x+1 > x$ veya $x+1 = x$

b) $x+3 < 5$ $D = \{0, 1\}$

c) $x+3 < 10$ $D = A$ doğru.

d) $x+3 < 7$ $D = \{0, 1, 2, 3\}$

2- a) $\forall x \in A, x+5 < 11$, $x=7$ ise $p(7) : 12 < 11$ $D \neq A$ yanlış.

b) $\forall x \in A, x^2 > 11$, $x=3$ ise $p(3) : 9 > 11$ $D \neq A$ yanlış.

c) $\forall x \in A$ x aseldir, $x=9$ $D \neq A$ yanlış.

d) $\forall x \in A$ x tek tir $x=2$ ise $p(2) =$ çifttir $D \neq A$

3- a) $|x| = -x$ ise $D \neq A$ olur. yanlıştır.

b) $x+1 \geq x$, $\forall x \in \mathbb{R}$ doğrudur.

c) $\exists x \in \mathbb{R} |x| = 0$ $x=0$ ise $p(0) : |x| = 0$ dir. doğrudur.

d) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = x$ doğrudur $\{0, 1\}$ için.

4- a) $\forall x \in \mathbb{Z}, \frac{x}{x} = 1$ sıfır için $\frac{0}{0}$ olduğu için yanlıştır. Doğruluk değeri 0 dir.

b) $\exists x \in \mathbb{Z}, \frac{x}{x} = 1$ doğrudur.

c) $\forall x \in \mathbb{Z}, (x^2 = 2x)' \Rightarrow \forall x \in \mathbb{Z}, x^2 \neq 2x$ 2 için yanlıştır. Yanlış 0 dir.

d) $\exists x \in \mathbb{Z}, x = 2x$ doğrudur. $x=0$ için.

5- a) $\exists x \in A, x+3=10$ $A=\{2,3,4,5\}$ yanlıştır. 0.

b) $\forall x \in A, x+3 < 10$ doğrudur. 1 $D=A$ dir.

c) $\exists x \in A, x+3 < 5$ $D=\emptyset$

d) $\forall x \in A, x+3 \leq 7$ yanlıştır. 0

- Alt Küme -


Tanım = A ve B iki küme olsun.

" $\forall x \in A \Rightarrow x \in B$ " önermesi doğru ise "A kümesi B kümesinin alt kümesidir," denir. (Veya B kümesi A kümesini kapsar denir.)


$A \subseteq B$ ($B \supseteq A$) yazılır.

$$A \subseteq B \Leftrightarrow [\forall x \in A \Rightarrow x \in B]$$

A, B, C, D kümeleri verilirse.



$$B \subseteq A$$



$$D \not\subseteq C$$

Has Alt küme =

Tanım = A, B nin alt kümesi ve $A \neq B$ ise. A, B nin has alt kümesidir denir. (öz)

$A \subset B$ yazılır.

Teorem = A, B, C herhangi kümeler olmak üzere

a- $A \subseteq A$ (yansıma özelliği)

b- $[A \subseteq B \wedge B \subseteq A] \Leftrightarrow A=B$ (ters simetri özelliği)

c- $[A \subseteq B \wedge B \subseteq C] \Rightarrow (A \subseteq C)$ (geçişme özelliği)

İspat // a) $\forall x \in A \Rightarrow x \in B \Leftrightarrow A \subseteq B$

$$\forall x \in A \Rightarrow x \in A \Rightarrow A \subseteq A$$

$$b) [A \subseteq B \wedge B \subseteq A] \Leftrightarrow [\forall x \in A \Rightarrow x \in B] \wedge [\forall x \in B \Rightarrow x \in A]$$

$$\Leftrightarrow [x \in A \Leftrightarrow x \in B]$$

$$\Leftrightarrow A=B$$

(c) $[A \subseteq B \wedge B \subseteq C] \Rightarrow (A \subseteq C)$ Alt küme tanımından
 $(A \subseteq B \wedge B \subseteq C) \Rightarrow [\forall x \in A \Rightarrow x \in B] \wedge [\forall x \in B \Rightarrow x \in C]$
 $\Rightarrow (\forall x \in A \Rightarrow x \in C)$ (Tümdengelim ilkesine göre)
 $\Rightarrow (A \subseteq C)$ (Alt küme tanımından.)

Teorem: Boş küme her kümenin alt kümesidir.


İspat // $x \in \emptyset$ yanlıştır. (Boş kümenin elemanı yoktur.)

$\forall x \in \emptyset$ yanlış bir önermedir. (A herhangi bir küme olmak üzere)

$\forall x \in \emptyset \Rightarrow x \in A$ doğrudur. $\Rightarrow \emptyset \subseteq A$ doğrudur.

Evrensel Küme =

Tanım = Bir araştırma ve inceleme v.s.'de sözü geçen tüm kümeleri kapsayan bir kümeye evrensel küme denir. E sembolü ile gösterilir.



Problemler:

1- $A = \{2, \{4, 5\}, 4\}$ ise aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

a- $\{4, 5\} \subset A$

c- $\{\{4, 5\}\} \subset A$

e- $5 \in A$

b- $\{4, 5\} \in A$

d- $\{5\} \in A$

f- $\{5\} \subset A$

2- A, B, C herhangi kümeler olmak üzere, $[A \subseteq B$ ve $B \subseteq C$ ve $C \subseteq A]$ ise $A=B$ önermesinin doğruluk değerini bulunuz?

① a) yanlış b) doğru c) doğru d) yanlış e) yanlış f) yanlış.

② $[A \subseteq B \wedge B \subseteq C \wedge C \subseteq A] \Rightarrow A=B$

(Alt küme tanımından)

$$[A \subseteq B \wedge B \subseteq C \wedge C \subseteq A] = [(\forall x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (\forall x \in B \Rightarrow x \in C) \wedge (\forall x \in C \Rightarrow x \in A)]$$

$$\Rightarrow [(\forall x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (\forall x \in B \Rightarrow x \in A)] \text{ (tümdengelim ilkesi)}$$

$$\Rightarrow (A \subseteq B \wedge B \subseteq A) \Rightarrow A=B \text{ (Alt küme tanımından)}$$

Kümelerin bileşimi:

Tanım: A ve B iki küme olsun.

A ve B kümesinin ^{tüm} elemanlarıyla oluşan yeni kümedir.

$A \cup B$: "A bileşim B"

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

Venn Şeması



$A \cup B$

Örnek $A = \{a, b, c\}$ $B = \{c, d, e, f\}$ ise $A \cup B = \{a, b, c, d, e, f\}$ olur.

Teorem : A, B, C herhangi kümeler olmak üzere aşağıdaki özellikler doğrudur.

- ① $A \cup A = A$ (Birleşimin tek kuvvet öz.)
- ② $A \cup B = B \cup A$ (" değişme öz.)
- ③ $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (Birleşimin birleşme öz.)
- ④ $A \cup \emptyset = A$ (Birleşimde etkisiz eleman öz.)
- ⑤ $A \subseteq A \cup B$ ve $B \subseteq A \cup B$
- ⑥ $A \cup B = \emptyset \Leftrightarrow (A = \emptyset \wedge B = \emptyset)$
- ⑦ $A \subseteq B \Leftrightarrow B = A \cup B$

İspat // ① $A \cup A = A$

(birleşim tanımı)

① 1.yol, önermelerden faydalananarak, $\forall x \in A \cup A \Rightarrow (x \in A \vee x \in A)$ dir.
 $\Rightarrow (x \in A)$ (V'nin tek kuvvet öz.)

$\Rightarrow A \cup A \subseteq A$ ② (V'nin tek kuv. öz.) (birleşim tanımı) (A'ın küme tanımı)

2.yol, $\forall x \in A \Rightarrow (x \in A \vee x \in A) \Rightarrow (x \in A \cup A) \Rightarrow A \subseteq A \cup A$ ③

a.ve b. den dolayı $A \cup A = A$ dir.

② 2.yol $A \cup A = \{x : x \in A \vee x \in A\}$
 $= \{x : x \in A\}$ (V'nin tek kuvvet öz.)
 $= A$

② $A \cup B = B \cup A$

$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$ (birleşim tanımı)
 $= \{x : x \in B \vee x \in A\}$ (V'nin değişme öz.)
 $= B \cup A$

③ $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

$= \{x : x \in A \cup B \vee x \in C\}$ (birleşim tanımı)
 $= \{x : (x \in A \vee x \in B) \vee x \in C\}$ (" ")
 $= \{x : x \in A \vee (x \in B \vee x \in C)\}$ (V'nin birleşme öz.) =

$$= \{x : x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C)\}$$

$$= \{x : x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C)\}$$

$$= A \cup (B \cap C)$$

$$\textcircled{4} A \cup \emptyset = A$$

$$\forall x \in A \cup \emptyset \Rightarrow (x \in A \vee x \in \emptyset) \text{ (bilesim tanımı.)}$$

$$\Rightarrow x \in A$$

$$\Rightarrow A \cup \emptyset \subseteq A \quad \dots a$$

$$\forall x \in A \Rightarrow (x \in A \vee x \in \emptyset)$$

$$\Rightarrow x \in A \cup \emptyset \text{ (bilesim tanımı)}$$

$$\Rightarrow A \subseteq A \cup \emptyset \quad \dots b$$

a ve b den dolayı $A \cup \emptyset = A$ dir.

$$\textcircled{5} A \stackrel{?}{\subseteq} A \cup B$$

$$\forall x \in A \Rightarrow (x \in A \vee x \in B)$$

$$\Rightarrow x \in A \cup B \text{ (bilesim tanımı)}$$

$$\Rightarrow A \subseteq A \cup B$$

$$\textcircled{6} A \cup B = \emptyset \Leftrightarrow (A = \emptyset \wedge B = \emptyset)$$

$$A \cup B = \emptyset \Leftrightarrow (A \cup B \subseteq \emptyset \subseteq A \cup B)$$

ispat // 1. sart gerektir. $\Rightarrow A \cup B = \emptyset$ olsun.

$$[A \subseteq A \cup B \wedge A \cup B \subseteq \emptyset] \Rightarrow A \subseteq \emptyset \text{ (tundugelim ilkesine gore)}$$

$$\Rightarrow (A \subseteq \emptyset \wedge \emptyset \subseteq A) \text{ (bitt kune oz.)}$$

$$\Rightarrow A = \emptyset$$

Benzer sekilde, $B = \emptyset \Rightarrow A = \emptyset$ ve $B = \emptyset$ dir.

2. sart yeterdir. $\Leftarrow : (A = \emptyset \wedge B = \emptyset) \Rightarrow A \cup B = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$

$$\textcircled{7} A \subseteq B \Leftrightarrow B = A \cup B$$

$$[(B = A \cup B) \Leftrightarrow (B \subseteq A \cup B \wedge A \cup B \subseteq B)]$$

1. gerek sart $\Rightarrow : A \subseteq B \Rightarrow (\forall x \in A \Rightarrow x \in B)$

$$\forall x \in A \cup B \Rightarrow x \in A \vee x \in B \text{ (bilesim tanımı)}$$

$$\Rightarrow x \in B \vee x \in B$$

$$\Rightarrow x \in B$$

$$\Rightarrow A \cup B \subseteq B \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (A \cup B \subseteq B \wedge B \subseteq A \cup B) \Rightarrow A \cup B = B$$

$$2. \text{ şert yeter} \Leftarrow : A \cup B = B \Rightarrow (A \cup B \subseteq B \wedge B \subseteq A \cup B) \text{ (Eşitlik tanımı)}$$

$$\Rightarrow (A \subseteq A \cup B \wedge A \cup B \subseteq B \wedge B \subseteq A \cup B)$$

$$\Rightarrow (A \subseteq B \wedge B \subseteq A \cup B)$$

$$\Rightarrow A \subseteq B$$

$$A \cup B = B \Rightarrow A \subseteq B \text{ dir.}$$


Kümelerin Kesişimi = (Ara kesiti)

Tanım : A ve B iki küme olsun.

A ve B'nin ortak elemanlarının kümesi, A ve B'nin kesişimi olarak adlandırılır.

$A \cap B$: "A kesişim B"

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$



Örnek $A = \{a, b, c, d\}$ $B = \{c, d, f, g, h\}$
 $A \cap B = \{c, d\}$

Tanım : A ve B kümeleri için $A \cap B = \emptyset$ ise A ve B kümeleri ayrıktır denir.

Örnek Tek sayı $\cap$ Çift sayı $= \emptyset$

Teorem : A, B, C herhangi kümeler olmak üzere

- ① $A \cap A = A$ (kesişimin tek kuvvet öz.)
- ② $A \cap B = B \cap A$ (" değişme ")
- ③ $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (kesişimin birleşme öz.)
- ④ $(A \cap B) \subseteq A$ ve $A \cap B \subseteq B$
- ⑤ $A \cap \emptyset = \emptyset$
- ⑥ $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$

İspat // ① $A = \{x : x \in A\}$
 $= \{x : x \in A \wedge x \in A\}$
 $= \{x : x \in A \cap A\}$
 $= A \cap A$

Problemler :

1) m tamsayısı n tamsayısını tam olarak bölüyorsa, " m/n " yazılır.

" m , n 'yi böler" veya " m böler n " diye okunur. Buna göre ;

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \quad B = \{x : x \in A \wedge 3/x\} \quad C = \{x : x \in A \wedge 2/x\} \quad \text{ise,}$$

$B, C, B \cup C, B \cap C$ kümelerinin elemanlarını liste ve özellik yöntemiyle yazın?

2) $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B \cup C = \{1, 2, 7, 8\}$ ise $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ kümesinin elemanlarını liste yöntemiyle yazın?

3) $A \cup B = A \cap B \Leftrightarrow A = B$ ispatlayınız.

4) A, B, C, D herhangi kümeler olmak üzere, aşağıdaki özellikler vardır.

a- $A \subseteq B \Rightarrow A \cup C \subseteq B \cup C$

b- $A \subseteq B \wedge A \subseteq C \Rightarrow A \subseteq (B \cap C)$

c- $(A \subseteq B \wedge C \subseteq D) \Rightarrow (A \cup C) \subseteq (B \cup D)$

Çözümler :

1- $B = \{3, 6, 9\} \quad C = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

$$B \cup C = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\} = \{x : x \in B \vee x \in C\}$$
$$= \{x : x \in A (3/x \vee 2/x)\}$$

$$B \cap C = \{6\} = \{x : x \in B \wedge x \in C\}$$
$$= \{x : x \in A (3/x \wedge 2/x)\}$$

2- $(A \cap B) \cup (A \cap C) = A \cap (B \cup C)$

$$= \{1, 2\}$$

3- İspat // 1: gerek şart $\Rightarrow A \cup B = A \cap B$

$$A \subseteq A \cup B \Rightarrow [A \subseteq A \cup B \wedge (A \cup B = A \cap B)]$$

$$\Rightarrow A \subseteq A \cap B$$

$$\Rightarrow [A \subseteq A \cap B \wedge (A \cap B \subseteq B)]$$

$$\Rightarrow A \subseteq B \quad \dots (1)$$

$$B \subseteq A \cup B \Rightarrow [B \subseteq A \cup B \wedge (A \cup B = A \cap B)]$$

$$\Rightarrow$$

$$\Rightarrow$$

$$\Rightarrow B \subseteq A \quad (2)$$

1 ve 2 den

$A = B$ dir.

$$2: \text{yeter şart} \Leftrightarrow : A=B \Rightarrow A \cup B = A \cup A = A \quad \Rightarrow A \cap B = A \cap A = A$$

$$4-2) \underbrace{A \subseteq B}_P \Rightarrow \underbrace{A \cup C \subseteq B \cup C}_Q$$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow (\forall x \in A \Rightarrow x \in B) \text{ veriliyor.}$$

$$\text{ispat} // \forall x \in (A \cup C) \Rightarrow (x \in A \vee x \in C) \text{ Birleşim tanımı.}$$

$$\Rightarrow (x \in B \vee x \in C) \text{ hipotezden (alt küme tanımından)}$$

$$\Rightarrow (x \in B \cup C) \text{ birleşim tanımı}$$

$$\Rightarrow (A \cup C \subseteq B \cup C)$$

$$b) (A \subseteq B \wedge A \subseteq C) \stackrel{?}{\Rightarrow} A \subseteq (B \cap C)$$

$$(A \subseteq B \wedge A \subseteq C) \Rightarrow (A \cup B = B \wedge A \cup C = C) \text{ Alt küme öz.}$$

$$\Rightarrow (A \cup B) \cap (A \cup C) = B \cap C \text{ kesişim tanımı}$$

$$\Rightarrow [A \cup (B \cap C) = B \cap C] \text{ birleşimin kesişim üz. dağı. öz.}$$

$$\Rightarrow [A \subseteq A \cup (B \cap C) = B \cap C]$$

$$\Rightarrow A \subseteq B \cap C$$


c)

Bir Kümenin Tümlenyeni

E bir evrensel bir küme ve A herhangi bir küme olsun.

E'nin A kümesinde bulunmayan elemanlarının kümesine "A'nın E kümesine göre tümlenyeni" denir. Ve A' ile gösterilir. "A tümlenyeni" veya "A'nın tümlenyeni" okunur.

$$A' = \{x : x \in E \wedge x \notin A\}$$



Örnek// E : Alfabedeki harfler kümesi

A : " sesli harfler "

A' : Alfabedeki sessiz harfler kümesi.

Teorem: E evrensel küme, A ve B de herhangi iki küme olsun.

1- $A \cup E = E$

9- $E' = \emptyset$

2- $A \cap E = A$

10- $\emptyset' = E$

3- $A \cup A' = E$

11- $A \subseteq B \Rightarrow B' \subseteq A'$

4- $x \in A \Leftrightarrow x \notin A'$

5- $A \cap A' = \emptyset$

6- $(A \cup B)' = A' \cap B'$

7- $(A \cap B)' = A' \cup B'$

8- $(A')' = A$

İspat// 1- $A \cup E = E$

I. Metot// $A \cup E = \{x : x \in A \vee x \in E\}$ birleşim tanımı
 $= \{x : x \in E\}$
 $= E$

II. Metot// $\forall x \in A \cup E \Rightarrow (x \in A \vee x \in E)$ birleşim tanımı
 $\Rightarrow x \in E$

$\Rightarrow A \cup E \subseteq E$

$\forall x \in E \Rightarrow (x \in A \vee x \in E)$

$\Rightarrow x \in A \cup E$

$\Rightarrow E \subseteq A \cup E$

$A \cup E = E$ olur.

III. Metot// $A \subseteq B \Rightarrow A \cup B = B$ $B = E$ alınırsa

$A \subseteq E \Rightarrow A \cup E = E$ (birleşim ve alt küme öz.)

2- $A \cap E = A$

I. metot// $A \cap E = \{x : x \in A \wedge x \in E\}$
 $= \{x : x \in A\}$
 $= A$

3. metot// $A \subseteq E \Rightarrow A \cap E = A$

3- $A \cup A' = E$

$$A \cup A' = \{x : x \in A \vee x \in A'\} \quad \text{birleşim tanımı}$$

$$= \{x : x \in E\}$$

$$= E$$

4- $x \in A \Leftrightarrow x \notin A'$

$$x \in A \Leftrightarrow [(x \in A)'] \Leftrightarrow [x \notin A] \Leftrightarrow [x \in A'] \Leftrightarrow x \notin A'$$

5- $A \cap A' = \emptyset$

$$\emptyset = \{x : x \in \emptyset\} = \{x : x \in A \wedge x \in A'\} = \{x : x \in A \cap A'\} = A \cap A'$$

$$\emptyset = A \cap A'$$

6- $(A \cup B)' = A' \cap B'$

İspat ① $\forall x \in (A \cup B)' \Rightarrow x \notin A \cup B$ tümleyen tanımı

$$\Rightarrow (x \notin A \wedge x \notin B)$$

$$\Rightarrow x \in A' \wedge x \in B'$$

$$\Rightarrow x \in A' \cap B' \quad \text{kesişim tanımı}$$

$$\Rightarrow (A \cup B)' \subseteq A' \cap B'$$

② $\forall x \in A' \cap B' \Rightarrow (x \in A' \wedge x \in B')$ kesişim tanımı

$$\Rightarrow (x \notin A \wedge x \notin B)$$

$$\Rightarrow x \notin A \cup B$$

$$\Rightarrow x \in (A \cup B)'$$

$$\Rightarrow A' \cap B' \subseteq (A \cup B)'$$

$$A' \cap B' = (A \cup B)'$$

7- $(A \cap B)' = A' \cup B'$

$\forall x \in (A \cap B)' \Leftrightarrow x \notin A \cap B$ tümleyen tanımı

$$\Leftrightarrow (x \notin A \vee x \notin B)$$

$$\Leftrightarrow x \in A' \vee x \in B'$$

$$\Leftrightarrow x \in A' \cup B' \quad \text{birleşim tanımı}$$

$$\Leftrightarrow (A \cap B)' \subseteq A' \cup B'$$

$$(A \cap B)' = A' \cup B'$$

$$8 - (A')' = A$$

$$= \{x : x \in (A')'\}$$

$$= \{x : x \notin A'\}$$

$$= \{x : x \in A\} = A$$

$$11 - A \subseteq B \Leftrightarrow B' \subseteq A'$$

$$\text{Hipotez: } A \subseteq B \Rightarrow (\forall x \in A \Rightarrow x \in B)$$

$$\Rightarrow (x \notin B \Rightarrow x \notin A)$$


$$\Rightarrow (x \in B' \Rightarrow x \in A')$$

$$\Rightarrow B' \subseteq A'$$

İki Kümenin Farkı

A ve B iki küme olsun. A kümesinin B kümesinde bulunmayan elemanlarının kümesine A ve B kümelerinin farkı (B'nin A'dan farkı) denir. Ve

$A \setminus B$ ile gösterilir. "A fark B" diye okunur.



Örnek $A = \{x : -3 \leq x < 1, x \in \mathbb{R}\} = [-3, 1)$

$$B = \{x : -1 \leq x \leq 2, x \in \mathbb{R}\} = [-1, 2]$$

$$A \setminus B = [-3, -1] \quad B \setminus A = [1, 2]$$

$$A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$$

Teorem: A ve B iki küme olmak üzere,

$$A \setminus B = A \cap B'$$

İspat //

$$\begin{aligned} A \setminus B &= \{x : x \in A \wedge x \notin B\} \\ &= \{x : x \in A \wedge x \in B'\} \\ &= \{x : x \in A \cap B'\} \\ &= A \cap B' \end{aligned}$$

Problemler :

A, B, C herhangi kümeler olmak üzere,

1- $A \setminus B' = A \cap B$

2- $(A \setminus B)' = B \cup A'$ özelliklerinin doğruluğunu ispatlayınız?

3- $A \cap [(A \cup B) \setminus B]$ kümesini kümelerle ilgili özellikler yardımıyla en basit şekilde yazın.

4- $A \subseteq B$ ise $C \setminus B \subseteq C \setminus A$ önermesinin doğruluğunu ispatlayınız?

5- $A \setminus (A \cap B) = A \setminus B$

$A \setminus (B \cup C) = A \setminus B \cap A \setminus C$ önermelerinin doğruluğunu ispatlayınız?

Çözümler :

① $A \setminus B' = \{x : x \in A \wedge x \notin B'\}$
 $= \{x : x \in A \wedge x \in B\}$ tümleyen tanımı
 $= \{x : x \in A \cap B\}$ kesişim tanımı
 $= A \cap B$

② $(A \setminus B)' = \{x : x \in (A \setminus B)'\}$
 $= \{x : x \notin A \setminus B\}$
 $= \{x : x \notin (A \cap B')\}$ teoremden
 $= \{x : x \notin A \vee x \notin B'\}$
 $= \{x : x \in A' \vee x \in B\}$
 $= \{x : x \in A' \cup B\}$
 $= A' \cup B$

$(A \setminus B)' = (A \cap B')' = A' \cup B$

③ $A \cap [(A \cup B) \setminus B] = A \cap [(A \cup B) \cap B']$ Teoremden
 $= A \cap [(A \cap B') \cup (B \cap B')]$ kesişimin birli. öz. değ. öz.
 $= A \cap [(A \cap B') \cup \emptyset]$
 $= A \cap [A \cap B']$ bileşimin etkisiz eleman öz.
 $= (A \cap A) \cap B'$ kesişimin birli. öz.
 $= A \cap B'$ " tek kuv. öz.
 $= A \setminus B$ teoremden (farkın tanımı)

$$④ A \subseteq B \Rightarrow C \setminus B \subseteq C \setminus A$$

$$A \subseteq B \Rightarrow B' \subseteq A' \text{ teoremden}$$

$$\Rightarrow C \cap B' \subseteq C \cap A'$$

$$\Rightarrow C \setminus B \subseteq C \setminus A \text{ teoremden (farkın tanımı)}$$

$$⑤ \bullet A \setminus (A \cap B) = A \setminus B$$

$$A \setminus (A \cap B) = A \cap (A \cap B)' \text{ teoremden}$$

$$= A \cap (A' \cup B')$$

$$= (A \cap A') \cup (A \cap B')$$

$$= (\emptyset \cup (A \cap B'))$$

$$= A \cap B'$$

$$= A \setminus B$$

$$\bullet A \setminus (B \cup C) = A \setminus B \cap A \setminus C$$

$$A \setminus (B \cup C) = A \cap (B \cup C)'$$

$$= A \cap (B' \cap C') \text{ De Morgan'dan}$$

$$= (A \cap A) \cap (B' \cap C') \text{ tek kuvvet öz.}$$

$$= (A \cap B') \cap (A \cap C')$$

$$= (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$


$$\text{Ödev // } (A \setminus B) \cap C \equiv (A \cap C) \setminus (B \cap C)$$

İki Kümenin Simetrik Farkı :

A ve B iki küme olsun. $A \cup B$ kümesinin, $A \cap B$ kümesinde olmayan elemanlarının kümesine, A ve B'nin simetrik farkı denir.

$A \Delta B$ "A simetrik fark B"

Venn Şeması,



$$\text{Örnek // } A = \{a, b, c, d\} \quad B = \{d, e, f\}$$

$$A \Delta B = \{a, b, c, e, f\}$$

Örnek // $A = [-3, 1]$ $B = [-2, 2]$ $A \cap B = (-2, 1]$ $A \cup B = [-3, 2]$ 31

$$A \Delta B = [-3, -2] \cup (1, 2)$$

$$A \Delta B = \{x : x \in (A \cup B) \wedge x \notin A \cap B\}$$

Teorem = A, B kümeleri için $A \Delta B = B \Delta A$ dir. (ödev)

İspat // $A \Delta B = \{x : x \in A \cup B \wedge x \notin A \cap B\}$
 $= \{x : x \in B \cup A \wedge x \notin B \cap A\} = B \Delta A$

Teorem : $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ dir.

$$\begin{aligned} A \Delta B &= \{x : x \in A \cup B \wedge x \notin A \cap B\} \\ &= \{x : x \in A \cup B \wedge x \in (A \cap B)'\} \\ &= \{x : (x \in A \vee x \in B) \wedge x \in (A \cap B)'\} \\ &= \{x : [x \in A \wedge x \in (A \cap B)'] \vee [x \in B \wedge x \in (A \cap B)']\} \\ &= \{x : [x \in A \wedge (x \notin A \vee x \notin B)] \vee [x \in B \wedge (x \notin A \vee x \notin B)]\} \\ &= \{x : [\underbrace{(x \in A \wedge x \notin A)}_t \vee (x \in A \wedge x \notin B)] \vee [(x \in B \wedge x \notin A) \vee \underbrace{(x \in B \wedge x \notin B)}_t]\} \\ &= \{x : t \vee (x \in A \setminus B) \vee (x \in B \setminus A) \vee t\} \\ &= \{x : (x \in A \setminus B) \vee (x \in B \setminus A)\} \\ &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \end{aligned}$$

Problemler:

1- $A = \{1, 2, 3, 5, 7, 8, 9\}$ $B = \{1, 4, 6, 8, 9\}$ ise $A \Delta B = ?$

2- E evrensel küme olmak üzere

a) $A \Delta \emptyset = A$

b) $A \Delta E = A'$


c) $A \Delta A = \emptyset$ olduğunu ispatlayın?

3- $A \Delta (B \cap A) = A \setminus B$

4- $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$

5- $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$ önermesinin doğruluk değerini bulunuz.

Çözüm/ 1-



$$\begin{aligned} A \Delta B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \\ &= \{2, 3, 4, 5, 6, 7\} \end{aligned}$$

$$2- a) A \Delta \emptyset = A$$

$$\begin{aligned} A \Delta \emptyset &= (A \setminus \emptyset) \cup (\emptyset \setminus A) \\ &= (A \cap \emptyset') \cup (\emptyset \cap A') \\ &= (A \cap E) \cup \emptyset \\ &= A \cup \emptyset = A \end{aligned}$$

$$b) A \Delta E = A'$$

$$\begin{aligned} A \Delta E &= (A \setminus E) \cup (E \setminus A) \\ &= (A \cap E') \cup (E \cap A') \\ &= (A \cap \emptyset) \cup A' \\ &= \emptyset \cup A' = A' \end{aligned}$$

$$c) A \Delta (B \cap A) = A \setminus B$$

$$\begin{aligned} A \Delta (B \cap A) &= [A \setminus (B \cap A)] \cup [(B \cap A) \setminus A] \\ &= [A \cap (B \cap A)'] \cup [(B \cap A) \cap A'] \\ &= [A \cap (B' \cup A')] \cup [B \cap (A \cap A')] \\ &= [(A \cap B') \cup (A \cap A')] \cup [B \cap \emptyset] \\ &= [(A \cap B') \cup \emptyset] \cup \emptyset \\ &= A \cap B' \\ &= A \setminus B \end{aligned}$$

Sonlu ve Sonsuz Kümeler :

Eleman sayıları sonlu (belli) olan kümelere sonlu kümeler, sonsuz sayıda olan kümelere de sonsuz kümeler denir.

$\{x : x \in \mathbb{Z} \text{ ve } x < -1\}$ sonsuz küme

$[-1, 2] = \{x : x \in \mathbb{R} \text{ ve } -1 \leq x \leq 2\}$ sonsuzdur. (Reel sayı olduğu için)

Sonlu bir A kümesinin eleman sayısını,

$n(A)$, $s(A)$, $|A|$ ifade ederiz.

Teorem: A ve B kümeler ise,

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

İspat // 1° $A \cap B = \emptyset$ ise

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$

2° $A \cap B \neq \emptyset$ ise

$$A = A \cap E = A \cap (B \cup B')$$

$$\Rightarrow A = (A \cap B) \cup (A \cap B')$$

$$B = B \cap E = B \cap (A \cup A')$$

$$\Rightarrow B = (B \cap A) \cup (B \cap A')$$

$$(A \cap B) \cap (A \cap B') = A \cap (B \cap B') \cap A$$

$$= A \cap \emptyset \cap A = \emptyset$$

$$\Rightarrow n(A) = n[(A \cap B) \cup (A \cap B')]$$

$$\Rightarrow \underline{n(A) = n(A \cap B) + n(A \cap B')}$$

$$(B \cap A) \cap (B \cap A') = B \cap (A \cap A') \cap B$$

$$= B \cap \emptyset \cap B = \emptyset$$

$$\Rightarrow n(B) = n[(B \cap A) \cup (B \cap A')]$$

$$\Rightarrow \underline{n(B) = n(B \cap A) + n(B \cap A')}$$

$$\Rightarrow n(A) + n(B) = 2n(A \cap B) + n(A \cap B') + n(B \cap A')$$

$$\Rightarrow n(A) + n(B) - n(A \cap B) = \underline{n(A \cap B) + n(A \cap B') + n(B \cap A')}$$

$$(A \cap B) \cap (A \cap B') = A \cap (B \cap B') \cap A = \emptyset$$

$$(A \cap B') \cap (B \cap A') = (A \cap A') \cap (B \cap B') = \emptyset$$

$$(A \cap B) \cap (B \cap A') = \emptyset$$

$$\underline{(A \cap B) \cup (A \cap B') \cup (B \cap A')} =$$

$$= [\underline{C} \cup (A \cap B')] \cup (B \cap A') = [(C \cup A) \cap (C \cup B')] \cup (B \cap A')$$

$$= [(A \cap B) \cup A] \cap [(A \cap B) \cup B'] \cup (B \cap A')$$

$$= A \cap [(A \cup B') \cap (B \cup B')] \cup (B \cap A')$$

$$= A \cap [(A \cup B') \cap E] \cup (B \cap A')$$

$$= [A \cap (A \cup B)] \cup (B \cap A')$$

$$= A \cup (B \cap A')$$

$$= (A \cup B) \cap (A \cup A')$$

$$= (A \cup B) \cap E$$

$$= A \cup B$$

$$\boxed{n(A) + n(B) - n(A \cap B) = n(A \cup B)}$$

Problemler:

1- E evrensel küme 10 elemanlıdır.

$n(A)=5$ $n(B)=3$ $n(A \cap B)=1$ ise $n(A \cup B)$, $n(A')$, $n(A \cap B')$, $n(A' \cap B')$ nedir?

2- A ve B iki küme olmak üzere

$n(A \cup B) = n(A)$ ise A ve B kümeleri arasındaki bağıntıyı bulun.

3- A, B, C herhangi kümeler olmak üzere $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) -$

$[n(A \cap B) + n(A \cap C) + n(B \cap C)] - n(A \cap B \cap C)$ old. isp.

4- Bir okulda açılan yabancı dil kursuna 30 öğrenci katılmıştır.

Bu öğrencilerden 16'sı İngilizce, 11'i Fransızca, 15'i Almanca kursunu başarmıştır.

İngilizce ve Almanca kursunu başaranların sayısı 5

" Fransızca 4

Almanca " 6 ise ve

her öğrencinin en az bir kurstan başarılı olduğu bilindiğine göre bu üç kursun

herbirisinden başarılı olan ve olmayan öğrenci sayısını bulun?

Çözümler:

1- $n(E)=10$ $n(A)=5$ $n(B)=3$ $n(A \cap B)=1$

• $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$$n(A \cup B) = 5 + 3 - 1 = 7 //$$

$$n(A') = ? \quad E = A \cup A' \quad A \cap A' = \emptyset$$

$$n(E) = n(A) + n(A')$$

$$10 = 5 + n(A')$$

$$\bullet n(A') = 5 //$$

$$\bullet n(B') = 10 - 3 = 7 //$$

$$\bullet n(A \cap B') =$$

$$A = A \cap E = A \cap (B \cup B')$$

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B')$$

$$= (A \cap B) \cup (A \cap B') = \emptyset$$

ayrık kümelerdir.

$$n(A) = n[(A \cap B) \cup (A \cap B')]$$

$$n(A) = n(A \cap B) + n(A \cap B')$$

$$5 = 1 + n(A \cap B')$$

$$n(A \cap B') = 4$$

$$\bullet n(A' \cap B') =$$

$$B' = B' \cap E \text{ (Alt küme tanımından)}$$

$$= B' \cap (A' \cup A)$$

$$= (B' \cap A') \cup (B' \cap A)$$

$$(B' \cap A') \cap (B' \cap A) = \emptyset$$

$$n(B') = n(B' \cap A') + n(B' \cap A)$$

$$7 = n(B' \cap A') + 4$$

$$n(A' \cap B') = 3 //$$

$$\text{Veya; } A' \cap B' = (A \cup B)'$$
 (De Morgan)

$$n(A' \cap B') = n(A \cup B)' = 10 - 7 = 3 //$$

$$2- \quad n(A \cup B) = n(A) \quad A \cup B = A$$

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$n(A) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$0 = n(B) - n(A \cap B)$$

$$n(B) = n(A \cap B) \quad A \cap B = B$$

$$\left. \begin{array}{l} A \cup B = A \Rightarrow \begin{array}{l} A \subseteq A \cup B \\ A \cup B \subseteq A \end{array} \\ A \cap B = B \Rightarrow \begin{array}{l} B \subseteq A \cap B \\ A \cap B \subseteq B \end{array} \end{array} \right\} B \subseteq A$$

$$3- \quad n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - [n(A \cap B) + n(A \cap C) + n(B \cap C)] - n(A \cap B \cap C)$$

$$= n[(A \cup B) \cup C]$$

$$= n(A \cup B) + n(C) - [n(A \cup B) \cap C]$$

$$= n(A) + n(B) - n(A \cap B) + n(C) - n[(A \cap C) \cup (B \cap C)]$$

$$= n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - \{ [n(A \cap C) + n(B \cap C)] - n[(A \cap C) \cap (B \cap C)] \}$$

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

$$4- \quad n(I) = 16 \quad n(F) = 11 \quad n(A) = 15$$

$$n(I \cap A) = 5 \quad n(I \cap F) = 4 \quad n(A \cap F) = 6$$

$$30 - 16 = 14 \quad I \text{ başarısız.}$$

$$n(I \cup F \cup A) = 30$$

$$30 - 11 = 19 \quad F \text{ başarısız.}$$

$$n(I \cap F \cap A) =$$

$$30 - 15 = 15 \quad A \text{ başarısız.}$$

$$n(I \cup F \cup A) = n(I) + n(F) + n(A) - \{ n(I \cap F) + n(I \cap A) + n(F \cap A) \} + n(A \cap F \cap I)$$

$$16 - 3 - 2 - 1 = 10 \text{ kişi } I \text{ den başarılı}$$

$$30 = 16 + 11 + 15 - (4 + 5 + 6) + n(A \cap F \cap I)$$

$$n(A \cap F \cap I) = 3 \text{ kişi başarılı}$$

- Kümeler Ailesi -

Örnek // $A = \{a, b, c\}$ kümesinin alt kümeleri,

$$\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$$

$$A_1 = \emptyset, A_2 = \{a\}, A_3 = \{b\}, A_4 = \{c\}, A_5 = \{a, b\}, A_6 = \{a, c\}, A_7 = \{b, c\}, A_8 = A$$

$I = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ gibi bir I kümesi seçersek, bu kümenin her bir i elemanına, bir A_i kümesi karşılık getirilmiş olur. Tersine olarak da, her bir A_i kümesine I 'nin bir i elemanı karşılık getirilmiş olur.

Tanım : Herhangi bir I kümesi veriliyor. I 'nin her bir i elemanı için, bir A_i kümesi varsa, I kümesine "indisleyen küme" (indisler kümesi), I 'nin her bir i elemanına bir "indis", A_i kümelerinden herbirine de "indislenmiş küme" denir.

Tanım : (Kümeler Ailesi) : I indisler kümesi olmak üzere ve her bir $i \in I$ için bir A_i kümesi varsa, $\mathcal{A} = \{A_i : i \in I\}$ kümesine kümeler ailesi denir. (Elementları da küme olan kümeye kümeler ailesi denir.)

Kümeler Ailesi
(tekil)

küme aileleri
(çoğul)

Örnek // $A_1 = [-1, 1) = \{x : x \in \mathbb{R} \text{ ve } -1 \leq x < 1\}$

$$A_2 = [-2, 1/2)$$

$$A_3 = [-3, 1/3)$$

$$A_4 = [-4, 1/4)$$

$$\mathcal{A} = \{A_1, A_2, A_3, A_4\} = \{A_i : i \in I\}$$

$$I = \{1, 2, 3, 4\}$$

Örnek // $A_1 = \{a, b, c, g, d\}$ $A_2 = \{b, c, e, f, g\}$ $A_3 = \{a, b, g, f, g, h, i, j, j\}$

$$\mathcal{A} = \{A_1, A_2, A_3\}, I = \{1, 2, 3\}$$

- Boş Aile -

$\mathcal{A} = \{A_i : i \in \emptyset\}$ ailesine boş aile denir.

Tanım : (Alt Aile) : $\mathcal{A} = \{A_i : i \in I\}$ ve $\mathcal{B} = \{A_j : j \in J\}$ aileleri veriliyor.

Eğer $J \subseteq I$ ise " $\mathcal{B}$ ailesi $\mathcal{A}$ ailesinin alt ailesidir" denir. Sembolik olarak

$$\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A} \text{ ile gösterilir.}$$

Örnek // $\mathcal{A} = \{A_1, A_2, A_5\}$ $\mathcal{B} = \{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5\}$ ise

$$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B} \text{ dir.}$$

Kümeler Ailesinin Birleşimi :

$\mathcal{A} = \{A_i : i \in I\}$ kümeler ailesi verildiğinde,

$\{x : \exists k \in I, x \in A_k\}$ kümesine $\mathcal{A}$ ailesinin birleşimi denir.

$$[\exists k \in I, x \in A_k] \equiv (x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee x \in A_3 \vee \dots \vee x \in A_n) \\ \equiv [x \in (A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n)]$$

Sembolik olarak,

$$\bigcup_{i \in I} A_i, \quad \bigcup \mathcal{A}, \quad \bigcup_{A_i \in \mathcal{A}} A_i$$

Örnek // $A_1 = [-1, 1)$ $A_2 = [-2, 1/2)$ $A_3 = [-3, 1/3)$ $A_4 = [-4, 1/4)$ $\mathcal{A} = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$

$$\bigcup \mathcal{A} = \{x : \exists k \in I, x \in A_k\} = \{x : x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee x \in A_3 \vee x \in A_4\} \\ = [-1, 1) \cup [-2, 1/2) \cup [-3, 1/3) \cup [-4, 1/4) \\ = [-4, 1)$$

Örnek // $A_1 = \{a, b, c, f, d\}$ $A_2 = \{b, c, e, f, g\}$ $A_3 = \{a, b, c, f, g, h, i, j\}$

$\mathcal{A} = \{A_1, A_2, A_3\}$ ise

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}$$

Teorem : Boş ailenin birleşimi boş kümeye eşittir.

İspat // $\mathcal{A} = \{A_i : i \in \emptyset\}$ ise

$$\bigcup \mathcal{A} = \{x : \exists k \in \emptyset, x \in A_k\}$$

$\exists k \in \emptyset, x \in A_k$ önermesi yanlıştır. Çünkü en az bir k elemanı, boş kümenin

bir elemanı ise hiçbir x elemanı olmayan bir küme de yoktur. Sonuç boş kümedir.

- Kümeler Ailesinin Kesişimi -

$\mathcal{A} = \{A_i : i \in I\}$ kümeler ailesi verildiğinde,

$\{x : \forall k \in I, x \in A_k\}$ kümesine $\mathcal{A}$ ailesinin kesişimi denir.

$$[\forall k \in I, x \in A_k] \equiv (x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge x \in A_3 \wedge \dots \wedge x \in A_n) \\ \equiv [x \in (A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_n)]$$

Sembolik olarak

$$\bigcap_{i \in I} A_i, \quad \bigcap \mathcal{A}, \quad \bigcap_{A_i \in \mathcal{A}} A_i$$

Örnek // $A_1 = [-1, 1)$ $A_2 = [-2, 1/2)$ $A_3 = [-3, 1/3)$ $A_4 = [-4, 1/4)$

$\mathcal{A} = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$

$$\bigcap \mathcal{A} = \{x : \forall k \in I, x \in A_k\} = A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 = [-1, 1/4)$$

Tanım: $\mathcal{A} = \{A_i : i \in I\}$ olduğuna göre $\forall k, t \in I$ için $k \neq t \Rightarrow A_k \cap A_t = \emptyset$

önermesi doğru ise $\mathcal{A}$ ailesine ayrık aile denir.

Örnek $I = \{1, 2, 3\}$ $A_1 = \{a, b\}$ $A_2 = \{c, d, e\}$ $A_3 = \{f, g, h\}$ ise

$\mathcal{A} = \{A_i : i \in I\}$ ayrık mıdır?

Kesişimleri $\emptyset$ olduğu için $\mathcal{A}$ ayrık ailedir.

Teorem: Boş ailenin kesişimi evrensel kümeye eşittir.

ispat // $\mathcal{A} = \{A_i : i \in \emptyset\}$ $\bigcap_{i \in \emptyset} A_i = \{x : \forall k \in \emptyset, x \in A_k\}$

$$E = \bigcap_{i \in \emptyset} A_i \Rightarrow \begin{cases} \bigcap_{i \in \emptyset} A_i \subseteq E \\ E \subseteq \bigcap_{i \in \emptyset} A_i \end{cases}$$

Evrensel kümenin bir elemanını alalım. $y \in E$ seçelim.

$$(\forall y \in \bigcap_{i \in \emptyset} A_i) \Leftrightarrow (\forall k \in \emptyset, y \in A_k)$$

$$E \subseteq \bigcap_{i \in \emptyset} A_i \Rightarrow (E \subseteq \bigcap_{i \in \emptyset} A_i \wedge \bigcap_{i \in \emptyset} A_i \subseteq E) \Rightarrow E = \bigcap_{i \in \emptyset} A_i$$

Teorem: (Genelleştirilmiş De Morgan kuralları):

$\mathcal{A} = \{A_i : i \in I\}$ olduğuna göre

$$a - (\bigcup_{i \in I} A_i)' = \bigcap_{i \in I} A_i'$$

$$b - (\bigcap_{i \in I} A_i)' = \bigcup_{i \in I} A_i'$$

ispat // a) $\forall x \in (\bigcup_{i \in I} A_i)' \Leftrightarrow x \notin \bigcup_{i \in I} A_i$

$$\Leftrightarrow (\forall k \in I, x \notin A_k)$$

$$\Leftrightarrow (\forall k \in I, x \in A_k')$$

$$\Leftrightarrow x \in \bigcap_{i \in I} A_i'$$

$$\Leftrightarrow \left. \begin{aligned} (\bigcup_{i \in I} A_i)' &\subseteq \bigcap_{i \in I} A_i' \\ \bigcap_{i \in I} A_i' &\subseteq (\bigcup_{i \in I} A_i)' \end{aligned} \right\} (\bigcup_{i \in I} A_i)' = \bigcap_{i \in I} A_i'$$

$$\Leftrightarrow \bigcap_{i \in I} A_i' \subseteq (\bigcup_{i \in I} A_i)'$$

b) $\forall x \in (\bigcap_{i \in I} A_i)' \Leftrightarrow x \notin \bigcap_{i \in I} A_i$ Tümler tanımları

$$\Leftrightarrow (\exists k \in I, x \notin A_k)$$

$$\Leftrightarrow (\exists k \in I, x \in A_k')$$

$$\Leftrightarrow x \in \bigcup_{i \in I} A_i$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow (\bigcap_{i \in I} A_i)' &\subseteq \bigcup_{i \in I} A_i' \\ \Leftrightarrow \bigcup_{i \in I} A_i' &\subseteq (\bigcap_{i \in I} A_i)' \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \Leftrightarrow (\bigcap_{i \in I} A_i)' &\subseteq \bigcup_{i \in I} A_i' \\ \Leftrightarrow \bigcup_{i \in I} A_i' &\subseteq (\bigcap_{i \in I} A_i)' \end{aligned}} \right\} (\bigcap_{i \in I} A_i)' = \bigcup_{i \in I} A_i'$$

Teorem: (Genelleştirilmiş dağılım kuralları):

$A = \{A_i : i \in I\}$, $B = \{B_j : j \in J\}$ olmak üzere

$$1- (\bigcup_{i \in I} A_i) \cap (\bigcup_{j \in J} B_j) = \bigcup_{i \in I} \left[\bigcup_{j \in J} (A_i \cap B_j) \right] = \bigcup_{j \in J} \left[\bigcup_{i \in I} (A_i \cap B_j) \right]$$

$$2- (\bigcap_{i \in I} A_i) \cup (\bigcap_{j \in J} B_j) = \bigcap_{i \in I} \left[\bigcap_{j \in J} (A_i \cup B_j) \right] = \bigcap_{j \in J} \left[\bigcap_{i \in I} (A_i \cup B_j) \right]$$

İspat // 1) $\forall x \in (\bigcup_{i \in I} A_i) \cap (\bigcup_{j \in J} B_j) \Leftrightarrow (x \in \bigcup_{i \in I} A_i \wedge x \in \bigcup_{j \in J} B_j)$ kesişim tanımları

$$\Leftrightarrow [(\exists k \in I, x \in A_k) \wedge (\exists t \in J, x \in B_t)] \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \Leftrightarrow [(\exists k \in I, x \in A_k) \wedge (\exists t \in J, x \in B_t)] \\ \Leftrightarrow [\exists k \in I, \exists t \in J (x \in A_k \wedge x \in B_t)] \end{aligned}} \right\} \text{kümeler ailesinin bileşimi tanımından.}$$

$$\Leftrightarrow [\exists k \in I, \exists t \in J (x \in A_k \wedge x \in B_t)]$$

$$\Leftrightarrow [\exists k \in I, (\exists t \in J, x \in A_k \cap B_t)]$$

$$\Leftrightarrow (\exists k \in I, x \in \bigcup_{j \in J} A_k \cap B_j)$$

$$\Leftrightarrow x \in \bigcup_{i \in I} \left[\bigcup_{j \in J} (A_i \cap B_j) \right]$$

2) $\forall x \in (\bigcap_{i \in I} A_i) \cup (\bigcap_{j \in J} B_j) \Leftrightarrow (x \in \bigcap_{i \in I} A_i \vee x \in \bigcap_{j \in J} B_j)$

$$\Leftrightarrow [(\exists k \in I, x \in A_k) \vee (\exists t \in J, x \in B_t)]$$

$$\Leftrightarrow [\exists k \in I, \exists t \in J (x \in A_k \vee x \in B_t)]$$

$$\Leftrightarrow [\exists k \in I, (\exists t \in J, x \in A_k \cup B_t)]$$

$$\Leftrightarrow (\exists k \in I, x \in \bigcap_{j \in J} A_k \cup B_j)$$

$$\Leftrightarrow x \in \bigcap_{i \in I} \left[\bigcap_{j \in J} (A_i \cup B_j) \right]$$

$$\Leftrightarrow \bigcap_{i \in I} \left[\bigcap_{j \in J} (A_i \cup B_j) \right]$$

Örnek $I = \{1, 2, 3\}$, $J = \{1, 2\}$ $(\bigcup_{i \in I} A_i) \cap (\bigcup_{j \in J} B_j)$ kümesini

$A_i \cap B_j$ kümelerinin birleşimi olarak yazın.

$$\begin{aligned} (\bigcup_{i \in I} A_i) \cap (\bigcup_{j \in J} B_j) &= \bigcup_{i \in I} \left[\bigcup_{j \in J} (A_i \cap B_j) \right] \\ &= \bigcup_{i \in I} [(A_i \cap B_1) \cup (A_i \cap B_2)] \\ &= [(A_1 \cap B_1) \cup (A_1 \cap B_2)] \cup [(A_2 \cap B_1) \cup (A_2 \cap B_2)] \cup [(A_3 \cap B_1) \cup (A_3 \cap B_2)] \\ &= (A_1 \cap B_1) \cup (A_1 \cap B_2) \cup (A_2 \cap B_1) \cup (A_2 \cap B_2) \cup (A_3 \cap B_1) \cup (A_3 \cap B_2) \\ \text{Veya,} &= \bigcup_{j \in J} \left[\bigcup_{i \in I} (A_i \cap B_j) \right] \\ &= \bigcup_{j \in J} [(A_1 \cap B_j) \cup (A_2 \cap B_j) \cup (A_3 \cap B_j)] \\ &= [(A_1 \cap B_1) \cup (A_2 \cap B_1) \cup (A_3 \cap B_1)] \cup [(A_1 \cap B_2) \cup (A_2 \cap B_2) \cup (A_3 \cap B_2)] \\ &= (A_1 \cap B_1) \cup (A_2 \cap B_1) \cup (A_3 \cap B_1) \cup (A_1 \cap B_2) \cup (A_2 \cap B_2) \cup (A_3 \cap B_2) \end{aligned}$$

Tanım: (Bir kümenin kuvvet kümesi):

Herhangi bir kümenin tüm alt kümelerinden meydana gelen aileye bu kümenin kuvvet kümesi denir. Bir A kümesinin kuvvet kümesi $P(A)$ ile gösterilir.

$$P(A) = \{A_i : A_i \subseteq A\}$$

Örnek: $A = \{a, b, c\}$ ise

$$P(A) = \{\emptyset, A, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}$$

Tanım: Bir kümenin ayrımı (= parçalanışı):

Bos olmayan bir A kümesi ve bu A kümesinin alt kümelerinden oluşan bir $\mathcal{A} = \{A_i : i \in I\}$ ailesi verilsin. Eğer,

$$1^\circ \emptyset \notin \mathcal{A}$$

$$2^\circ (\forall k, t \in I \text{ ve } k \neq t) \Rightarrow A_k \cap A_t = \emptyset$$

$$3^\circ A = \bigcup_{i \in I} A_i$$

(ayrışımı)

özellikleri sağlanıyorsa $\mathcal{A}$ ailesi A kümesinin bir ayrımı (parçalanışı) dir denir.

Örnek: $\mathcal{C} = \{0, 2, 4, 6, \dots, 2n, \dots\}$ $\mathcal{T} = \{1, 3, 5, 7, \dots, 2n+1, \dots\}$

$\mathcal{A} = \{\mathcal{C}, \mathcal{T}\}$ ailesi $\mathbb{N}'$ 'nin bir ayrımıdır.

$$\emptyset \notin \mathcal{A} \quad \mathcal{C} \cap \mathcal{T} = \emptyset \quad \mathcal{C} \cup \mathcal{T} = \mathbb{N}$$

Örnek: $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ $A_1 = \{1, 3\}$ $A_2 = \{7, 8, 9, 10\}$

$A_3 = \{2, 5, 6\}$ $A_4 = \{4, 9\}$

$\mathcal{A} = \{A_i : i \in I\}$ $I = \{1, 2, 3, 4\}$

$\emptyset \notin \mathcal{A}$ $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ $A_1 \cap A_3 = \emptyset$ $A_1 \cap A_4 = \emptyset$

$A_2 \cap A_3 = \emptyset$ $A_2 \cap A_4 = \emptyset$ $A_3 \cap A_4 = \emptyset$

$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 = A$

Tanım: Bir kümenin örtüsü:

$\mathcal{A} = \{A_i : i \in I\}$ olmak üzere $\mathcal{A}$ ailesinin birleşimi bir A kümesini kapsıyorsa " $\mathcal{A}$ ailesi A kümesinin bir örtüsüdür" denir.

$$A \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$$

Örnek: $A = \{0, 1, 2\}$ $\mathcal{A} = \{\{1, 2, 3\}, \{0, 2, 5\}, \{3, 4\}\}$ A kümesi, $\mathcal{A}$ nın bir örtüsü müdür?

$\bigcup \mathcal{A} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \supset \{0, 1, 2\} = A$ örtüsüdür.

Problemler:

1- $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq x \leq b$ eşitsizliğini sağlayan reel sayıların kümesi,

$[a, b]$ ile gösterilir. $Z = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ ve $\mathcal{A} = \{A_k : k \in Z \text{ ve } A_k = [k, k+1]\}$

olduğuna göre aşağıdaki kümeleri en basit şekilde gösterin.

a) $A_1 \cup A_2$ b) $A_{-2} \cup A_{-1} \cup A_0$ c) $A_3 \cap A_4$ d) $\bigcup_{i \in Z} A_i$

2- $a, b \in \mathbb{R}$, $a < x < b$ eşitsizliğini sağlayan reel sayıların kümesi,

(a, b) ile gösterilir. $S = \{1, 2, 3, 4, \dots, n, \dots\}$ ve $\mathcal{A} = \{A_n : n \in S \text{ ve } A_n = (0, 1/n)\}$

olduğuna göre aşağıdaki kümeleri en basit şekilde gösterin.

a) $A_3 \cap A_{20}$ b) $k, t \in S, A_k \cup A_t$ c) $A_3 \cup A_7$ d) $k, t \in S, A_k \cap A_t$

3- Sayma sayıları kümesinin bir ayrımı,

$\{\{1\}, \{2, 3\}, \{4, 5, 6\}, \{7, 8, 9, 10\}, \{11, 12, 13, 14, 15\}, \dots\}$ ise bu ayrımın 40. elemanı

olan kümenin elemanları toplamını bulun?

4- $\mathcal{A} = \{A_n : n \in S\}$ verilsin. $B_1 = A_1$, $B_2 = A_2 \setminus A_1$, $B_3 = A_3 \setminus \{A_1 \cup A_2\}$

$\dots B_n = A_n \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right)$ $n = 2, 3, \dots$ olmak üzere

$\mathcal{B} = \{B_n : n \in S\}$ kümeler ailesi tanımlanıyor. $\mathcal{B}$ ailesinin kümelerinin ikiser

ikiser ayrık olduklarını ispat edin.

5- Düzlemde merkezi başlangıç noktasında olan 3 yarıçaplı çembere 5m0

ışten teget olan 1 yarıçaplı dairelerin kümesini $\mathcal{A}$ ve 2 yarıçaplı dairelerin kümesini de $\mathcal{B}$ ile gösterelim. $U\mathcal{A}$ ve $U\mathcal{B}$ kümelerini bulun.

6- $A = \{1, 2, 3\}$ kümesinin tüm ayrımlarını bulun.

7- $\mathcal{A} = \{A_i : i \in I\}$ ailesi veriliyor. $J \subset I$ ise

a) $\bigcup_{i \in J} A_i \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$ b) $\bigcap_{i \in J} A_i \subseteq \bigcap_{i \in I} A_i$ olduklarını ispat edin.

8- $\mathcal{A} = \{A_i : i \in I\}$ verilsin ve B bir küme olsun.

a) $\forall i \in I$ için $A_i \subseteq B$ ise $\bigcup_{i \in I} A_i \subseteq B$ dir.

b) $\forall i \in I$ için $B \subseteq A_i$ ise $B \subseteq \bigcap_{i \in I} A_i$ olduğunu ispat edin.

Gözümler :

1-a) $a \leq x \leq b$ $[a, b] = \{x : x \in \mathbb{R} \text{ ve } a \leq x \leq b\}$

$\mathcal{A} = \{A_k : k \in \mathbb{Z} \text{ ve } A_k = [k, k+1]\}$

$A_1 \cup A_2 = ?$ $A_1 = [1, 2]$ $A_2 = [2, 3]$

$A_1 \cup A_2 = [1, 2] \cup [2, 3] = [1, 3]$

b) $A_{-2} \cup A_{-1} \cup A_0 = ?$

$A_{-2} = [-2, -1]$ $A_{-1} = [-1, 0]$ $A_0 = [0, 1]$

$A_{-2} \cup A_{-1} \cup A_0 = [-2, -1] \cup [-1, 0] \cup [0, 1]$
 $= [-2, 1]$

c) $A_3 \cap A_4 = ?$

$A_3 = [3, 4]$ $A_4 = [4, 5]$

$A_3 \cap A_4 = [3, 4] \cap [4, 5] = \{4\}$

d) $\bigcup_{i \in \mathbb{Z}} A_i = ?$ $A_{-2} \cup A_{-1} \cup A_0 \cup A_1 \cup A_2 \cup \dots$

$= \dots \cup [-1, 0] \cup [0, 1] \cup [1, 2] \cup \dots$

$= \mathbb{R} //$

2- $a < x < b$, $(a, b) = \{x : x \in \mathbb{R} \text{ ve } a < x < b\}$ $S = \{1, 2, 3, \dots\}$

$\mathcal{A} = \{A_n : n \in S \text{ ve } A_n = (0, 1/n)\}$

a) $A_3 \cup A_7$ $A_3 = (0, 1/3)$ $A_7 = (0, 1/7)$

$A_3 \cup A_7 = (0, 1/3) = A_3$

b) $A_3 \cap A_{20} = ?$

$$A_3 = (0, 1/3) \quad A_{20} = (0, 1/20) \Rightarrow A_3 \cap A_{20} = (0, 1/3) \cap (0, 1/20) = (0, 1/20) = A_{20}$$

c) $k, t \in S, A_k \cup A_t = ?$

1) $k > t \Rightarrow \frac{1}{t} > \frac{1}{k}$

$$A_k = (0, 1/k) \quad A_t = (0, 1/t)$$

$$A_k \cup A_t = (0, 1/t) = A_t$$

2) $k < t \Rightarrow \frac{1}{t} < \frac{1}{k}$

$$A_k = (0, 1/k) \quad A_t = (0, 1/t)$$

$$A_k \cup A_t = (0, 1/k) = A_k$$

d) $k, t \in S, A_k \cap A_t = ?$

1) $k > t \Rightarrow \frac{1}{t} > \frac{1}{k}$

$$A_k = (0, 1/k) \quad A_t = (0, 1/t)$$

$$A_k \cap A_t = (0, 1/k) = A_k$$

2) $k < t \Rightarrow \frac{1}{t} < \frac{1}{k}$

$$A_k = (0, 1/k) \quad A_t = (0, 1/t)$$

$$A_k \cap A_t = (0, 1/t) = A_t$$

3- $\left\{ \underbrace{\{1\}}_{I}, \underbrace{\{2,3\}}_{II}, \underbrace{\{4,5,6\}}_{III}, \underbrace{\{7,8,9,10\}}_{IV}, \dots \right\}$

$$1+2+\dots+40 = \frac{40 \cdot 41}{2} = 20 \cdot 41 = 820 //$$

$$1+2+\dots+39 = \frac{39 \cdot 40}{2} = 780$$

$$\sum_{i=1}^{820} - \sum_{i=1}^{780} = \frac{820 \cdot 821}{2} - \frac{780 \cdot 781}{2} =$$

4- $i \neq j, B_i \cap B_j = \emptyset, i, j \in S$

İspat// Aksini farzedelim.

$$i \neq j, B_i \cap B_j \neq \emptyset \text{ olsun} \Rightarrow i \neq j, \exists x \in B_i \cap B_j$$

$$\Rightarrow (x \in B_i \wedge x \in B_j) \quad i < j \text{ olsun.}$$

$$\Rightarrow \left[x \in A_i \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{i-1} A_k \right) \wedge x \in A_j \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{j-1} A_k \right) \right]$$

$$\Rightarrow \left[\left(x \in A_i \wedge x \notin \bigcup_{k=1}^{i-1} A_k \right) \wedge \left(x \in A_j \wedge x \notin \bigcup_{k=1}^{j-1} A_k \right) \right] \text{ (fark tanımları)}$$


$$\Rightarrow \left[x \in A_i \wedge (x \notin A_1 \wedge \dots \wedge x \notin A_{i-1}) \right] \wedge \left[x \in A_j \wedge (x \notin A_1 \wedge \dots \wedge x \notin A_{j-1}) \right]$$

$$\Rightarrow (x \in A_i \wedge x \notin A_i \wedge x \in A_j) \quad \wedge x \in A_i \wedge \dots \wedge x \in A_{j-1}]$$

$$\Rightarrow (x \in A_i \wedge x \notin A_i) \text{ çelişkidir ve yanlıştır.}$$


B ailesinin kümeleri ayrıktır.

5-



$$A = \bigcup A_i = \{x : \exists i \in I, x \in A_i\} = \{x : x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \dots \vee x \in A_n\}$$

$$\bigcap A_i = \{x : x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge \dots\} = \phi$$



$$B \Rightarrow \bigcup B = \{x : x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \dots\} \text{ yarıçapı 3 olan daire}$$

$$\bigcap B = \{x : A_1 \wedge x \in A_2 \wedge \dots\} \text{ yarıçapı 1 olan daire bölgesi}$$

6- $A = \{1, 2, 3\}$

$$\bullet \phi \notin A \quad \bullet i \neq j \quad A_i \cap B_j = \phi \quad \bullet A = \bigcup A$$

$$\phi, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, A$$

a) $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$ A kümesinin bir elemanıdır.

b) $\{\{1, 2\}, \{3\}\}$ " "

c) $\{\{2, 3\}, \{1\}\}$ " "

d) $\{\{1, 3\}, \{2\}\}$ " "

olmak üzere 4 tane ayrımı vardır.

7- $A = \{A_i : i \in I\}, J \subseteq I, J = \{1, 2, \dots, n\}, I = \{1, 2, \dots, n, n+1, \dots, p\}$ olsun.

a) $\bigcup_{i \in J} A_i \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$

$$\begin{aligned} \text{İspat} \quad \forall x \in \bigcup_{i \in J} A_i &\Rightarrow (x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \dots \vee x \in A_n) \\ &\Rightarrow (x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \dots \vee x \in A_n \vee x \in A_{n+1} \vee \dots \vee x \in A_p) \\ &\Rightarrow (x \in A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n \vee A_{n+1} \vee \dots \vee A_p) \\ &\Rightarrow x \in \bigcup_{i \in I} A_i \end{aligned}$$

b) $\bigcap_{i \in I} A_i \subseteq \bigcap_{i \in J} A_i$

$$\begin{aligned} \text{İspat} \quad \forall x \in \bigcap_{i \in I} A_i &\Rightarrow (x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge \dots \wedge x \in A_n \wedge x \in A_{n+1} \wedge \dots \wedge x \in A_p) \\ &\Rightarrow (x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge \dots \wedge x \in A_n) \\ &\Rightarrow (x \in A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n) \\ &\Rightarrow x \in \bigcap_{i \in J} A_i \end{aligned}$$

$$8- A = \{A_i : i \in I\}$$

$$a) \forall i \in I \text{ için } A_i \subseteq B \Rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \subseteq B$$

$$\text{İspat} // A_i \subseteq B \Leftrightarrow (\forall x \in A_i \Rightarrow x \in B) \quad (\text{Alt küme tanımı})$$

$$\forall x \in \bigcup_{i \in I} A_i \Rightarrow (\exists k \in I, x \in A_k) \quad (\text{kümeler ailesinin bileşimi tanımı})$$

$$\Rightarrow x \in B \quad (\text{Hipotezden})$$

$$\Rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \subseteq B$$

b)

$$\text{İspat} // B \subseteq A_i \Leftrightarrow (\forall x \in B \Rightarrow x \in A_i) \quad I = \{1, 2, \dots, n\}$$

$$\forall x \in B \Rightarrow (x \in B \wedge x \in B \wedge \dots \wedge x \in B) \quad (\wedge \text{ bağlacının tek kuvvet öz.})$$

$$\Rightarrow (x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge x \in A_3 \wedge \dots \wedge x \in A_n)$$

$$\Rightarrow x \in (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$$

$$\Rightarrow x \in \bigcap_{i \in I} A_i$$

Tanım : (Sıralı ikili) :

a ve b gibi iki eleman verilsin. Sıra önemli olmak üzere (a, b) şeklindeki ifadeye bir sıralı ikili denir.

$$(a, b) \text{ aralığı, } (a, b) = \{x : x \in \mathbb{R} \text{ ve } a < x < b\}$$

$$(a, b) \text{ ikilisi,}$$

Eşitlik =

$$(a, b) \text{ ve } (c, d) \text{ ikillileri verilsin. } (a, b) = (c, d) \Rightarrow (a = c \wedge b = d)$$

$$a : (a, b) \text{ sıralı ikilisinin birinci bileşeni.}$$

$$b : \text{ " " " ikinci bileşeni.}$$

$$(a, b) \neq (b, a) \text{ genellikle farklıdır.}$$

Tanım : (Sıralı üçlü)

a, b, c herhangi üç eleman olsun. Sıra önemli olmak üzere (a, b, c) ifadesine sıralı üçlü denir.

Tanım : (Sıralı n-li) : $a_1, a_2, \dots, a_n$ herhangi n eleman olsun.

21 Sıra düzenli olmak üzere $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ifadesine sıralı n-li denir.

a_1 : $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ Sıralı n'linin birinci bileşeni

a_2 :
" " " ikinci "

a_n
" " " n-inci "

dir.

Örnek/ $(10, -3, 2, 6)$ sıralı 4'lü

$(7, 11, 0, 8, 9, -1/2)$ sıralı 6-lıdır.

- Kümelerin Kartezyen Çarpımı -

Tanım: A, B iki küme olmak üzere,

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A \wedge y \in B\}$$

kümesine "A ve B'nin kartezyen çarpımı" denir.

$$B \times A = \{(x, y) : x \in B \wedge y \in A\}$$

$A \times B \neq B \times A$ dir.

$$A = B \Rightarrow A \times A = A^2 = \{(x, y) : x \in A \wedge y \in A\} = \{(x, y) : x, y \in A\}$$

Tanım: $A \times A$ 'nin (x, x) şeklindeki elemanlarının kümesine $A \times A$ nin köşegeni denir.

Örnek/ $A = \{a, b\}$, $B = \{1, 2\}$

$$A \times B = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2)\}$$

$$A \times A = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$$

$\{(a, a), (b, b)\}$ $A \times A$ nin köşegenidir.

Teorem: A, B ve C herhangi kümeler olmak üzere.

1) $A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$

2) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$, $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$

3) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$, $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$

4) $A \subseteq B \Rightarrow A \times C \subseteq B \times C$, $(A \subseteq B \wedge C \subseteq D) \Rightarrow (A \times C) \subseteq (B \times D)$

5) $A \times B = \emptyset \Rightarrow (A = \emptyset \vee B = \emptyset)$

İspat/2 $A \times (B \cup C) = \{(x, y) : x \in A \wedge y \in (B \cup C)\}$ (kart. çarp. tan.)

$$= \{(x, y) : x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C)\}$$
 (bileşim tanımı)

$$= \{(x, y) : (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C)\}$$
 ($\wedge$ nin $\vee$ üz. dağı. öz.)

$$= \{(x,y) : (x,y) \in A \times B \vee (x,y) \in A \times C\}$$

$$= (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$3/ \forall x \in A (x \in B \cap C) \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in (B \cap C) \text{ kart. şer. tan.}$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in A) \wedge (y \in B \wedge y \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \wedge (x \in A \wedge y \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x,y) \in A \times B \wedge (x,y) \in A \times C$$

$$\Leftrightarrow (x,y) \in A \times B \cap (A \times C) \text{ kes. tan.}$$

$$\Leftrightarrow A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$4- A \subseteq B \Rightarrow [A \times C \subseteq B \times C] : \text{hipotez } A \subseteq B \Leftrightarrow (\forall x \in A \Rightarrow x \in B)$$

$$\forall (x,y) \in A \times C \Rightarrow (x \in A \wedge y \in C) \text{ (kartezyen çarpım tanımı)}$$

$$\Rightarrow (x \in B \wedge y \in C) \text{ (hipotezden)}$$

$$\Rightarrow (x,y) \in B \times C$$

$$\Rightarrow A \times C \subseteq B \times C$$

$$5- \underbrace{A \times B = \emptyset}_P \Rightarrow \underbrace{(A = \emptyset \vee B = \emptyset)}_Q \equiv [(A = \emptyset \vee B = \emptyset)]' \Rightarrow A \times B \neq \emptyset$$

$$(P \Rightarrow Q) \equiv (Q' \Rightarrow P')$$

$$\equiv [(A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset) \Rightarrow A \times B \neq \emptyset]$$

$$\text{ispat} // (A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset) \Rightarrow (\exists x \in A \wedge \exists y \in B)$$

$$\Rightarrow \exists (x,y) \in A \times B$$

$$\Rightarrow A \times B \neq \emptyset$$

Problemler :

$$1- (x+y, 1) = (3, x-y) \quad x=? \quad y=?$$

2- $A \subseteq B$ olduğuna göre $A \times A \subseteq A \times B$, $A \times B \subseteq B \times B$ önermelerinin doğru olduğunu ispatlayın.

3- A, B herhangi iki küme olmak üzere,

$$a) A' \times B' = (A \times B)'$$

$$b) (A \times A) \cap (B \times B) = (A \cap B) \times (A \cap B) \text{ doğruluk değerlerini bulun.}$$

4- A, B, C, D herhangi kümeler olmak üzere,

$$(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D), \quad (A \times B) \cup (C \times D) = (A \cup C) \times (B \cup D)$$

önermelerinin doğruluk değerlerini bulun.

$$= \{(x,y) : (x,y) \in A \times B \vee (x,y) \in A \times C\}$$

$$= (A \times B) \cup (A \times C)$$

3/ $\forall x \in A, x(B \cap C) \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in (B \cap C)$ kart. çarpım tan.

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in A) \wedge (y \in B \wedge y \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \wedge (x \in A \wedge y \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x,y) \in A \times B \wedge (x,y) \in A \times C$$

$$\Leftrightarrow (x,y) \in A \times B \cap (A \times C) \quad \text{kes. tan.}$$

$$\Leftrightarrow A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

4- $A \subseteq B \Rightarrow [A \times C \subseteq B \times C] : \text{hipotez } A \subseteq B \Leftrightarrow (\forall x \in A \Rightarrow x \in B)$

$$\forall (x,y) \in A \times C \Rightarrow (x \in A \wedge y \in C) \quad (\text{kartezyen çarpım tanımı})$$

$$\Rightarrow (x \in B \wedge y \in C) \quad (\text{hipotezden})$$

$$\Rightarrow (x,y) \in B \times C$$

$$\Rightarrow A \times C \subseteq B \times C$$

5- $\underbrace{A \times B = \emptyset}_p \Rightarrow \underbrace{(A = \emptyset \vee B = \emptyset)}_q \Leftrightarrow [(A = \emptyset \vee B = \emptyset)' \Rightarrow A \times B \neq \emptyset]$
 $\Leftrightarrow [(A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset) \Rightarrow A \times B \neq \emptyset]$
 $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (q' \Rightarrow p')$

İspat// $(A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset) \Rightarrow (\exists x \in A \wedge \exists y \in B)$

$$\Rightarrow \exists (x,y) \in A \times B$$

$$\Rightarrow A \times B \neq \emptyset$$

Problemler :

1- $(x+y, 1) = (3, x-y) \quad x=? \quad y=?$

2- $A \subseteq B$ olduğuna göre $A \times A \subseteq A \times B$, $A \times B \subseteq B \times B$ önermelerinin doğru olduğunu ispatlayın.

3- A, B herhangi iki küme olmak üzere,

a) $A' \times B' = (A \times B)'$

b) $(A \times A) \cap (B \times B) = (A \cap B) \times (A \cap B)$ doğruluk değerlerini bulun.

4- A, B, C, D herhangi kümeler olmak üzere,

$$(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D), \quad (A \times B) \cup (C \times D) = (A \cup C) \times (B \cup D)$$

önermelerinin doğruluk değerlerini bulun.

5- A, B, C kümeler ve

$$A \times (B \times C) = (A \times B) \times C \text{ olduğunu gösteriniz.}$$

6- A, B, C kümeleri için, $A = B \cap C$ ise

a) $A \times A = (B \times B) \cap (C \times C)$ b) $A \times A = (B \times C) \cap (C \times B)$

önergelerinin doğruluk değelerini bulun.

7- Aşağıdaki kümeleri geometrik olarak açıklayın.

a) $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ b) $\mathbb{R} \times \{-5\}$ c) $\mathbb{R} \times (1, 3)$

d) $[1, 3] \times \mathbb{R}$ e) $[1, 3] \times (1, 3)$ f) $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{R} \text{ ve } x^2 + y^2 = 1\}$

g) $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{R} \text{ ve } x^2 + y^2 = 1\} \times [0, 1]$

h) $[0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$ i) $\{(x, y, z) : x, y, z \text{ ve } x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$

8- A, B sonlu kümeler olmak üzere

$$n(A) = n \quad n(B) = m \text{ ise } n(A \times B) = n \cdot m \text{ olduğunu ispat edin.}$$

9- A, B, C sonlu kümeler ve $A \cap B = A \cap C = B \cap C = \emptyset$ olduğuna göre

$$n(A) = 15 \quad n(B) = 10 \quad n(C) = 8 \text{ ise}$$

a) $A \times B$ b) $A \times (B \times C)$ c) $A \times (B \cup C)$

kümelerinin eleman sayısını bulun.

Çözümler// 1- $(x+y, 1) = (3, x-y)$

$$\left. \begin{array}{l} x+y=3 \\ x-y=1 \end{array} \right\} \Rightarrow x=2 \quad y=1$$

2- $A \subseteq B$, $A \times A \subseteq A \times B$

$$A \subseteq B \Rightarrow (\forall x \in A \Rightarrow x \in B)$$

$$\forall (x, y) \in A \times A \Rightarrow (x \in A \wedge y \in A) \quad (\text{kart. çarp. tanımı})$$

$$\Rightarrow (x \in A \wedge y \in B)$$

$$\Rightarrow (x, y) \in A \times B$$

$$\Rightarrow A \times A \subseteq A \times B$$

3- a) $A' \times B' = (A \times B)'$

$$= \{(x, y) : x \in A' \wedge y \in B'\} \quad (\text{kartezyen çarpımı tanımı})$$

$$= \{(x, y) : x \notin A \wedge y \notin B\} \quad (\text{Tümleyen tanımı})$$

$$(A \times B)' = \{(x, y) : (x, y) \notin A \times B\}$$

$$= \{(x, y) : x \notin A \vee y \notin B\}$$

iki önerme denk değildir. Doğruluk değeri 0

$$4- (A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$$

$$= \{(x, y) : (x, y) \in A \times B \wedge (x, y) \in C \times D\}$$

$$= \{(x, y) : (x \in A \wedge y \in B) \wedge (x \in C \wedge y \in D)\} \text{ kar. çarp. tanımı}$$

$$= \{(x, y) : (x \in A \wedge x \in C) \wedge (y \in B \wedge y \in D)\} \quad \wedge \text{ nın deęiř. ve birli. öz.}$$

$$= \{(x, y) : x \in A \cap C \wedge y \in B \cap D\} \text{ kes. tan.}$$

$$= (A \cap C) \times (B \cap D)$$

$$5- A \times (B \times C) \stackrel{?}{=} (A \times B) \times C$$

$$= \{(x, y, z) : x \in A \wedge (y, z) \in B \times C\}$$

$$= \{(x, y, z) : x \in A \wedge (y \in B \wedge z \in C)\}$$

$$= \{(x, y, z) : (x \in A \wedge y \in B) \wedge z \in C\}$$

$$= \{(x, y, z) : (x, y) \in A \times B \wedge z \in C\}$$

$$= (A \times B) \times C$$

$$6- a/ A \times A = (B \times B) \cap (C \times C)$$

$$A = B \cap C \rightarrow A \subseteq B \cap C$$

$$B \cap C \subseteq A$$

$$A \times A = (B \cap C) \times A$$

$$= (B \times A) \cap (C \times A)$$

$$= [B \times (B \cap C)] \cap [C \times (B \cap C)]$$

$$= [(B \times B) \cap (B \times C)] \cap [(C \times B) \cap (C \times C)]$$

$$= (B \times B) \cap (C \times C) \cap (B \times C) \cap (C \times B)$$

$$(B \times B) \cap (C \times C) = \{(x, y) : (x, y) \in B \times B \wedge (x, y) \in C \times C\}$$

?

7- a) $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ iki boyutlu düzlemdaki noktalar kümesi.


$$b) \mathbb{R} \times \{-5\} = \{(x, y) : x \in \mathbb{R} \wedge y = -5\}$$


$y = -5$ doğrusu.

$$c) \mathbb{R} \times (1, 3) = \{(x, y) : x \in \mathbb{R} \wedge y \in (1, 3)\}$$


$$d) [1, 3] \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x \in [1, 3] \wedge y \in \mathbb{R}\}$$

$$e) [1, 3] \times (1, 3) = \{(x, y) : x \in [1, 3] \wedge y \in (1, 3)\}$$




f) $\{(x,y) : (x,y) \in \mathbb{R} \wedge x^2 + y^2 = 1\}$ 

g) $\{(x,y) : x,y \in \mathbb{R} \wedge x^2 + y^2 = 1\} \times [0,1]$
 $= \{(x,y,z) : x^2 + y^2 = 1 \wedge z \in [0,1]\}$



h) $[0,1] \times [0,1] \times [0,1] = \{(x,y,z) : x,y,z \in [0,1]\}$



i)

küre.

8- $n(A) = n$ $n(B) = m$ $n(A \times B) = n \cdot m$

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$

$A = \{a_1\} \cup \{a_2\} \cup \dots \cup \{a_n\}$ $B = \{b_1\} \cup \{b_2\} \cup \dots \cup \{b_m\}$

$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

$A \times B = \{a_1\} \cup \{a_2\} \cup \dots \cup \{a_n\} \times B$

$= (\{a_1\} \times B) \cup (\{a_2\} \times B) \cup \dots \cup (\{a_n\} \times B)$

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(\overset{\emptyset \text{ ise}}{A \cap B}) = n(A) + n(B)$ dir.

$A \times B = (\{a_1\} \times B) \cap (\{a_2\} \times B) = \emptyset \Rightarrow$

$(\{a_i\} \times B) \cap (\{a_j\} \times B) = \emptyset \quad i \neq j \text{ ise}$

$n(A \times B) = n(\{a_1\} \times B) + n(\{a_2\} \times B) + \dots + n(\{a_n\} \times B)$

$\{a_1\} \times B = \{a_1\} \times [\{b_1\} \cup \{b_2\} \cup \dots \cup \{b_m\}]$

$= \{a_1\} \times \{b_1\} \cup \{a_1\} \times \{b_2\} \cup \dots \cup \{a_1\} \times \{b_m\}$

$n(\{a_1\} \times B) = n(\{a_1\} \times \{b_1\}) + n(\{a_1\} \times \{b_2\}) + \dots + n(\{a_1\} \times \{b_m\})$

$= \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{m \text{ tane}} = m$

$\Rightarrow \underbrace{m + m + \dots + m}_{n \text{ tane}} + n = m \cdot n$

9- $n(A)=15$ $n(B)=10$ $n(C)=8$ $A \cap B = A \cap C = B \cap C = \emptyset$ 51

$$n(A \times B) = n \cdot m = 10 \cdot 15 = 150$$

$$n[A \times (B \cup C)] = n(A) \cdot n(B \cup C) = n(A)[n(B) + n(C) - n(B \cap C)] = 15(10 + 8) = 15 \cdot 18$$

$$n(A \times B \times C) = n[A \times (B \times C)] = n(A) \cdot n(B \times C) = n(A) \cdot n(B) \cdot n(C) = 15 \cdot 10 \cdot 8 = 80 \cdot 15.$$

Tanım: 1) A, B, C kümeleri verildiğinde

$$A \times B \times C = \{(x, y, z) : x \in A \wedge y \in B \wedge z \in C\} \text{ kümesine,}$$

A, B, C kümelerinin Kartezyen çarpımı denir.

2) $A_1, A_2, \dots, A_n$ gibi n tane küme verildiğinde

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_1 \in A_1 \wedge x_2 \in A_2 \wedge \dots \wedge x_n \in A_n\} \text{ kümesine,}$$

$A_1, A_2, \dots, A_n$ kümelerinin Kartezyen çarpımı denir.

$$\underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{n \text{ tane}} = A^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_1, x_2, \dots, x_n \in A\}$$

$$A = \mathbb{R} \text{ ise } \mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{n \text{ tane}} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

$$n=2 \text{ ise } \mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\} \text{ 2 boyutlu öklid uzayı.}$$

$$n=3 \text{ ise } \mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\} \text{ 3 boyutlu öklid uzayı.}$$

- BAĞINTI -

Bir sınıftaki öğrencilerin kümesi A olsun. "X ve y aynı burçtandır."

önermesi (cümlesi) veriliyor. Bu önermenin doğruluk kümesi D olsun.

$$D = \{(x, y) : x, y \in A \text{ ve } x \text{ ile } y \text{ aynı burçtandır.}\}$$

"X ve y aynı burçtandır" önermesi ile $(x, y) \in D$ önermesi aynı anlamı vermektedir.

Tanım: Boş olmayan bir A kümesi verilsin. $A \times A$ nin boş olmayan her alt kümesine A' kümesinde bir bağıntı (1-1'li bağıntı) denir.

Örnek // $A = \{x : x \text{ Samsun ili nüfusuna kayıtlıdır.}\}$

$$\{(x, y) : x, y \in A \text{ ve } x, y \text{ nin annesidir.}\}$$

$$\{(x, y) : x, y \in A \text{ ve } x, y \text{ nin dedesidir.}\}$$

$$\{(x, y) : x, y \in A \text{ ve } x, y \text{ nin teyzesidir.}\}$$

$$\{(x, y) : x, y \in A \text{ ve } x, y \text{ den gençtir.}\}$$

Tanım: Boş olmayan iki küme A ve B olsun.

$A \times B$ nin her boş olmayan alt kümesine A dan B ye bir bağıntı denir.

(bir 2-li bağıntı)

Genel olarak α, β, γ gibi gösterilir.

Örnek // $A = \{4, 6, 9, 15\}$, $B = \{2, 3, 5\}$ ve

$$\beta = \{(x, y) : x \in A \wedge y \in B \wedge y \mid x\}$$
$$= \{(4, 2), (6, 2), (6, 3), (9, 3), (15, 3), (15, 5)\}$$

Tanım: A kümesinden B kümesine bir β bağıntısı verilsin.

$(x, y) \in \beta$ "ise" B nin y elemanı, A nin x elemanı ile β bağıntısı yardımıyla bağlıdır." veya "A nin x elemanı, B nin y elemanı ile eşlenmiştir" denir. Sembolik olarak,

1) $y \beta x$: y elemanı β yardımıyla x 'e bağlıdır. $(x, y) \in \beta$

2) $x \rightarrow y$: x elemanı y ile eşlenmiştir. $(x, y) \in \beta$

$$(x, y) \in \beta \Leftrightarrow y \beta x \Leftrightarrow x \rightarrow y$$

Örnek // $\beta = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{N} \text{ ve } x + 2y = 4\}$ bağıntısı,


$$y \beta x \Leftrightarrow x + 2y = 4 \text{ şeklinde de verilir.}$$

Bağıntının Şeması :

$$A, B \Rightarrow \beta \subseteq A \times B$$


Örnek // $A = \{4, 6, 9, 15\}$ $B = \{2, 3, 5\}$

$$\beta = \{(4, 2), (6, 2), (6, 3), (9, 3), (15, 3), (15, 5)\}$$



Venn Şeması.

Bağıntının Grafiği :



Tanım: $A_1, A_2, \dots, A_n$ kümeleri verilsin,

$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ kümesi için,

" $A = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ olmak üzere A dan B ye olan bir bağıntıya, bir n -li bağıntı denir.

Tanım: A kümesinden B kümesine bir,

$\beta = \{(x, y) : x \in A \wedge y \in B, y \beta x\}$ bağıntısı verilsin.

$\{(y, x) : (x, y) \in \beta\}$ bağıntısına β bağıntısının ters bağıntısı denir. ve β^{-1} ile gösterilir.

$$\beta^{-1} = \{(y, x) : x \in A \wedge y \in B \wedge y \beta x\}$$



Örnek // $A = \{4, 6, 9, 15\}$ $B = \{2, 3, 5\}$

$\beta = \{(x, y) : x \in A \wedge y \in B \wedge y | x\}$ ise β liste yöntemiyle yazılırsa,

$$\beta = \{(4, 2), (6, 2), (6, 3), (9, 3), (15, 3), (15, 5)\}$$

$\beta^{-1} = \{(y, x) : y \in B \wedge x \in A \wedge y | x\}$ ise β^{-1} yazılacak olursa,

$$\beta^{-1} = \{(2, 4), (2, 6), (3, 6), (3, 9), (3, 15), (5, 15)\}$$



Venn Şeması

- İki Bağıntının Bileşkesi -

Tanım: $B \cap C \neq \emptyset$ olmak üzere A dan B ye bir β ve C den D 'ye bir δ bağıntısı verilsin. Yani

$$\beta = \{(x, y) : x \in A \wedge y \in B \wedge y \beta x\}$$


$$\delta = \{(u, v) : u \in C \wedge v \in D \wedge v \delta u\} \text{ olsun.}$$

A 'dan D kümesine, $\{(x, z) : \exists y \in B \cap C \text{ için } (x, y) \in \beta \wedge (y, z) \in \delta\}$

bağıntısına β ve δ bağıntılarının bileşkesi denir.

Bileşke bağıntı sembolik olarak

$\delta \circ \beta$ yazılır ve "β bileşke δ" diye okunur.



Örnek // $A = \{4, 6, 9, 15\}$ $B = \{2, 3, 5, 17\}$ $C = \{2, 3, 5, 7\}$ $D = \{8, 10, 12\}$

$$\beta = \{(x, y) : x \in A \wedge y \in B \wedge y | x\} \quad B \cap C = \{2, 3, 5\}$$

$$\delta = \{(x, y) : x \in C \wedge y \in D \wedge x | y\}$$

bileşke bağıntısını özellik ve liste yöntemiyle yazacak olursak,


$$\delta \circ \beta = \{(x, z) : \exists y \in B \cap C, (x, y) \in \beta \wedge (y, z) \in \delta\}$$

$$\beta = \{(4, 2), (6, 2), (6, 3), (9, 3), (15, 3), (15, 5)\}$$

$$\delta = \{(2, 8), (2, 10), (2, 12), (3, 12), (5, 10)\}$$

$$\delta \circ \beta = \{(4, 8), (4, 10), (4, 12), (6, 8), (6, 10), (6, 12), (9, 12), (15, 12), (15, 10)\}$$

$$\beta \circ \delta = ?$$



Problemler:

1- $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ kümesinde tanımlı β bağıntısı $y\beta x \Leftrightarrow x = y - 1$ şeklinde veriliyor. β bağıntısını liste yöntemiyle yazınız.

2- $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ kümesinde tanımlanan

$\beta = \{(2, 5), (3, 2), (3, 7), (4, 4), (6, 4), (8, 1)\}$ bağıntısı veriliyor. $\beta^{-1} \circ \beta$ bağıntısını liste yöntemiyle yazınız.

Gözüm // 1- $x = 0 \Rightarrow y = 1$ $\beta = \{(0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$
 $x = 1 \Rightarrow y = 2$

2- $\beta^{-1} = \{(5, 2), (2, 3), (7, 3), (4, 4), (4, 6), (1, 8)\}$

$$\beta^{-1} \circ \beta = \{(x, z) : x, y \in \beta \wedge y, z \in \beta^{-1}\} = \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (4, 6), (6, 4), (6, 6), (8, 8)\}$$

Tanım : (Özdeşlik Bağıntısı) :

A bir küme olmak üzere $A \times A$ nın köşegen elemanları ile teşkil edilen bağıntıya, A'nın özdeşlik bağıntısı denir. A'nın özdeşlik bağıntısı I_A ile gösterilir.

Örnek // $A = \{0,1,2,3\}$ $I_A = \{(0,0), (1,1), (2,2), (3,3)\}$

- Bağıntının Özellikleri -

Tanım : (Yansıma Özelliği) :

β , A kümesinde tanımlı bir bağıntı olsun.

$\forall x (x \in A \Rightarrow (x,x) \in \beta)$ ise " β nın yansıma özelliği vardır." veya

" β yansıyan bir bağıntıdır" denir.

Tanım : (Simetri Özelliği) :

β , A kümesinde tanımlanan bir bağıntı olsun. $(x,y) \in A$ olmak üzere,

$\forall (x,y) \in \beta \Rightarrow (y,x) \in \beta$ önermesi doğru ise β nın simetri özelliği vardır denir. (veya " β simetrik bir bağıntıdır" denir.)

Örnek // $A = \{1,2,3\}$ $\beta = \{(1,1), (2,2), (1,3), (3,1), (2,3), (3,2)\}$

β bağıntısı simetriktir, yansıyan değildir.

Tanım : (Ters Simetri Özelliği) :

A kümesinde tanımlı bir β bağıntısı verilsin. $(x,y) \in A$ olmak üzere,

$x \neq y$ ve $(x,y) \in \beta \Rightarrow (y,x) \notin \beta$ dir. Önermesi doğru ise β bağıntısı A kümesinde ters simetri özelliğine sahiptir denir.

Örnek // $A = \{a,b,c\}$ $\beta = \{(b,c), (a,b), (a,a)\}$

$(c,b) \notin \beta$ $(b,a) \notin \beta$ $a=a$ (β ters simetriktir.)

Tanım : (Geçişme Özelliği) :

A kümesinde tanımlı bir β bağıntısı verilsin. $x,y,z \in A$ olmak üzere,

$(x,y) \in \beta$ ve $(y,z) \in \beta \Rightarrow (x,z) \in \beta$ önermesi doğru ise " β bağıntısının geçişme özelliği vardır" denir.

Örnek // $A = \{a,b,c\}$ $\beta = \{(a,c), (b,b), (c,b), (a,b)\}$

β 'nin geçişme özelliği vardır.

(β bağıntısı geçişli bir bağıntıdır.)

Problemler:

1 - Doğal sayılar kümesinde aşağıdaki önermelerle verilen bağıntıların özelliklerini inceleyin.


a) $x \leq y$

b) $x | y$

c) $x+y=10$

2 - $A=\{a,b,c\}$ kümesinde tanımlanan aşağıdaki bağıntıların özelliklerini inceleyin

a)



b)



c)



d)



3 - $\beta = \{(x,y) : (x,y) \in \mathbb{N} - \{0\} \wedge xy \text{ tek sayı}\}$ bağıntısının özelliklerini inceleyin.

4 - γ ve β , A kümesinde tanımlanan iki bağıntı olsun. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulun.

a- β ve γ yansıyan ise $\beta \cap \gamma$ da yansıyandır.

b- β yansıyan ise $\beta \cap \beta^{-1} \neq \emptyset$ dir.

c- β ve γ simetrik ise $\beta \cup \gamma$ da simetriktr.

d- β simetrik ise $\beta \cap \beta^{-1} \neq \emptyset$ dir.

e- β ve γ ters simetrik ise $\beta \cup \gamma$ da ters simetriktr.

f- β ve γ geçişli ise $\beta \cap \gamma$ da geçişlidir.

5- Bir üçgenin A° nin ölçüsü 55° ise B ve C açılarının ölçüleri arasındaki bağıntıyı özellik yöntemiyle yazın. Bu bağıntı simetrik midir?

6- $A=\{1,2,3,4\}$ kümesinde tanımlanan bir β bağıntısının $(1,1), (2,3), (3,4)$ elemanlarını içerdigi bilinmektedir.

a) β yansıyan olacak şekilde, β nin elemanlarını yazın. Bu soruya birden çok cevap bulmak mümkün müdür?

b) β simetrik olmak üzere β bağıntısının elemanlarını yazın. Birden çok cevap bulmak mümkün müdür?

c) β , yansıyan, simetrik, geçişli olduğuna göre, β nin elemanlarını yazın. Birden çok cevap bulmak mümkün müdür?

7- Boş olmayan bir A kümesinde tanımlanan tüm bağıntıların simetrik olması için A kümesi nasıl bir küme olmalıdır?

Çözümler

1 - a - $(X \leq y) \equiv (X < y \vee X = y)$

$\forall x \in \mathbb{N}, x = x \Rightarrow x \leq x \Rightarrow x, x \in \beta$ yansıyandır.

$\forall (x, y) \in \mathbb{N}, (x, y) \in \beta \Rightarrow x \leq y \Rightarrow y \leq x$

$x=1, y=2 \Rightarrow (1 \leq 2) \in \beta \Rightarrow (1, 2) \in \beta$ simetri değil

$(2, 1) \notin \beta$ ters simetri. geçişme vardır.

$\forall x, y, z \in \mathbb{N} : (x, y) \in \beta \wedge (y, z) \in \beta \Rightarrow x \leq y \wedge y \leq z \Rightarrow x \leq z \quad (x, z) \in \beta$

b - $\forall x \in \mathbb{N} : x/x \Rightarrow (x, x) \notin \beta$

$x=0 \Rightarrow \frac{0}{0}$ yansıyan değil.

$(x, y) \in \mathbb{N}, (x, y) \in \beta \Rightarrow x/y$

$x=2, y=4, \quad 2/4$ fakat $4/2$ simetri yoktur. ters simetri var.

$\forall x, y, z \in \mathbb{N} \Rightarrow (x/y) \wedge (y/z) \Rightarrow x/z$ geçişme var.

2 - a) $\beta = \{(a, b), (a, c), (b, c)\}$

yansıyan değil, simetri değil, ters simetri, geçişme var.

b) $\beta = \{(a, a), (a, b), (b, c), (c, a)\}$

yansıyan değil, simetri değil, ters simetri, geçişme yok.

c) $\beta = \{(a, a), (a, b), (b, b), (b, c), (c, c), (a, c)\}$

yansıma var, simetri değil, ters simetri, geçişli.

d) $\beta = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (a, c), (c, a)\}$

yansıyan, simetri, ters simetri yok, geçişli.

3 - i) $\forall x \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, x \cdot x = x^2$ tek sayı mıdır?

$x=4 \Rightarrow 4 \cdot 4 = 16$ tek sayı değil. $(4, 4) \notin \beta$ yansıyan değil.

ii) $\forall x, y \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, (x, y) \in \beta \Rightarrow xy$ tek sayı.

$\Rightarrow y \cdot x$ tek sayı $(y, x) \in \beta$ simetri var. ters sim yok.

iii) $\forall x, y, z \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, (x, y) \in \beta \wedge (y, z) \in \beta \Rightarrow x \cdot y$ tek sayı $\wedge y \cdot z$ tek sayı

$\Rightarrow x \cdot z$ tek sayıdır. geçişme var.

4- a) β ve γ yansıyan ise $\beta \cap \gamma$ da yansıyandır.

İspat // β ve γ yansıyan $\Rightarrow [\forall x \in A, (x, x) \in \beta] \wedge [\forall x \in A, (x, x) \in \gamma]$
 $\Rightarrow \forall x \in A, (x, x) \in \beta \wedge (x, x) \in \gamma$
 $\Rightarrow \forall x \in A, (x, x) \in \beta \cap \gamma$ (kesişim tanımı)
 $\Rightarrow \beta \cap \gamma$ yansıyandır.

b) β yansıyan ise $\beta \cap \beta^{-1} \neq \emptyset$ dir.

İspat // β yansıyan $\Rightarrow [\forall x \in A, (x, x) \in \beta]$ (yansıyan bağıntı tanımı)
 $\Rightarrow [\forall x \in A, (x, x) \in \beta^{-1}]$
 $\Rightarrow \forall x \in A, (x, x) \in \beta \wedge (x, x) \in \beta^{-1}$
 $\Rightarrow \forall x \in A, (x, x) \in \beta \cap \beta^{-1}$ (kesişim tanımı)
 $\Rightarrow \beta \cap \beta^{-1} \neq \emptyset$

c) β ve γ simetrik ise $\beta \cup \gamma$ da simetriktir.

İspat // β ve γ simetrik $\Rightarrow$

$$\Rightarrow [\forall x, y \in A, (x, y) \in \beta \Rightarrow (y, x) \in \beta] \wedge [\forall x, y \in A, (x, y) \in \gamma \Rightarrow (y, x) \in \gamma]$$
$$\Rightarrow [(x, y) \in \beta \vee (y, x) \in \beta] \Rightarrow [(y, x) \in \beta \vee (x, y) \in \beta]$$
$$\Rightarrow [(x, y) \in \beta \cup \gamma \Rightarrow (x, y) \in \beta \cup \gamma]$$
$$\Rightarrow \beta \cup \gamma \text{ simetriktir.}$$

d) β simetrik ise $\beta \cap \beta^{-1} \neq \emptyset$ dir.

İspat // β simetrik ise


$$\Rightarrow [\forall x, y \in A, (x, y) \in \beta \wedge (y, x) \in \beta]$$
$$\Rightarrow [(y, x) \in \beta^{-1} \wedge (x, y) \in \beta^{-1}]$$
$$\Rightarrow (x, y) \in \beta \wedge (x, y) \in \beta^{-1} \Rightarrow x, y \in \beta \cap \beta^{-1} \Rightarrow \beta \cap \beta^{-1} \neq \emptyset$$

e) β ve γ geçişli ise $\beta \cap \gamma$ da geçişlidir.

İspat // β geçişli ve γ geçişli $\Rightarrow$

$$\Rightarrow [\forall x, y, z \in A, (x, y) \in \beta \wedge (y, z) \in \beta \Rightarrow (x, z) \in \beta] \wedge [\forall x, y, z \in A, (x, y) \in \gamma \wedge (y, z) \in \gamma \Rightarrow (x, z) \in \gamma]$$
$$\Rightarrow [(x, y) \in \beta \wedge (x, y) \in \gamma] \wedge [(y, z) \in \beta \wedge (y, z) \in \gamma] \Rightarrow [(x, z) \in \beta \wedge (x, z) \in \gamma]$$
$$\Rightarrow [(x, y) \in \beta \cap \gamma \wedge (y, z) \in \beta \cap \gamma] \Rightarrow [(x, z) \in \beta \cap \gamma]$$
$$\Rightarrow \beta \cap \gamma \text{ geçişme özelliğine sahiptir.}$$

5-



$$\beta = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R} \text{ } x+y=125^\circ\} \text{ simetriktr.}$$

6- a) $\beta = \{(1,1), (2,3), (3,4), (2,2), (3,3), (4,4)\}$ (4,3) ilave edilebilir.

b) $\beta = \{(1,1), (2,3), (3,4), (3,2), (4,3)\}$ (4,4) ilave edilebilir.

c) $\beta = \{(1,1), (2,3), (3,4), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (3,1), (3,2), (4,3), (2,4), (4,2)\}$

~ ?

7- $A = \{a\}$ $A \times A = \{(a,a)\}$ $\beta = \{(a,a)\}$ küme tek elemanlı olmalıdır.

Tanım: (Denklik = Eşdeğerlik Bağlantısı):

Bir A kümesinde tanımlanan bir bağlantının yansıma, simetri ve geçişme özellikleri varsa; " β , A kümesinde bir denklik bağlantısıdır", denir.

Örnek// $A = \{x : x \text{ T.C. vatandaşıdır.}\}$ kümesinde tanımlanan

$$\beta = \{(x, y) : x, y \in A \text{ ve } x \text{ ile } y \text{ aynı ılele değmiştir}\} \text{ bağlantısı}$$

denklik bağlantısı mıdır?

i) $\forall x \in A, (x, x) \in \beta$ yansıyandır.

ii) $\forall x, y \in A, (x, y) \in \beta \Rightarrow (y, x) \in \beta$ simetriktr.

iii) $\forall x, y, z \in A, (x, y) \in \beta \wedge (y, z) \in \beta \Rightarrow (x, z) \in \beta$ geçişlidir.

Örnek// $\beta = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z} \text{ ve } x-y \text{ çift tamsayıdır}\}$

i) $\forall x \in \mathbb{Z}, x-x=0$ çifttir. $(x, x) \in \beta$ doğrudur. yansıyandır.

ii) $\forall (x, y) \in \mathbb{Z}, (x, y) \in \beta \Rightarrow x-y \text{ çifttir} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, x-y=2k$

$$\Rightarrow -(x-y) = -2k \Rightarrow (y-x) = 2(-k), -k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow y-x \text{ çift tamsayı } (y, x) \in \beta \text{ dir. simetriktr.}$$

iii) $\forall x, y, z \in \mathbb{Z}, (x, y) \in \beta \wedge (y, z) \in \beta \Rightarrow x-y \text{ çift ve } y-z \text{ çift tamsayıdır.}$

$$\Rightarrow (\exists k \in \mathbb{Z}, x-y=2k) \wedge (\exists r \in \mathbb{Z}, y-z=2r)$$

$$\Rightarrow (x-y) + (y-z) = 2k + 2r$$

$$\Rightarrow x-z = 2(k+r), k+r \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow x-z \text{ çifttir.}$$

$$\Rightarrow (x, z) \in \beta \text{ geçişme vardır.}$$

β bağlantısı $\mathbb{Z}$ kümesinde bir denklik bağlantısıdır.

Tanım: Denklik (= Eşdeğerlik) Sınıfları :

Bir A kümesinde tanımlı bir β denklik bağıntısı verilsin.

$(x,y) \in \beta$ ise "y elemanı β denklik bağıntısı ile x elemanına denktir,, denir.

A'nın bir x elemanına denk olan tüm elemanlarının kümesine x'in denklik sınıfı denir. $\bar{x}$ veya $[x]$ ile gösterilir.

$$\bar{x} = \{y : y \in A \wedge (x,y) \in \beta\}$$

Örnek// $\beta = \{(x,y) : x,y \in \mathbb{Z} \text{ ve } x-y \text{ çift tamsayıdır.}\}$

1 ve 2 tamsayılarının denklik sınıflarını bulalım.

$$\bar{1} = \{y : y \in \mathbb{Z} \wedge (1,y) \in \beta\} = \{y : y \in \mathbb{Z} \wedge 1-y \text{ çift tamsayı}\}$$

$$\bar{1} = \{\dots, -5, -3, -1, 1, 3, 5, \dots\} = T$$

$$\bar{2} = \{y : y \in \mathbb{Z} \wedge (2,y) \in \beta\} = \{y : y \in \mathbb{Z} \wedge 2-y \text{ çift tamsayı}\}$$

$$\bar{2} = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\} = \varnothing$$

Teorem: Bir A kümesi ve bu kümede tanımlı bir β denklik bağıntısı verilsin.

- a) A'nın her elemanının boş kümeden farklı en az bir denklik sınıfı vardır.
- b) A'nın herhangi iki elemanının denklik sınıfı ya ayrıktır ya da eşittir.
- c) Tüm denklik sınıflarının birleşimi A ya eşittir.

İspat// a) $\forall x \in A, (x,x) \in \beta \Rightarrow x \in \bar{x} \Rightarrow \bar{x} \neq \emptyset$

b) $x,y \in A, \bar{x} : x$ 'in denklik sınıfı, $\bar{y} : y$ 'nin denklik sınıfı olsun.
 $\Rightarrow y \in \bar{x}$ veya $y \notin \bar{x}$

i) $y \in \bar{x}$ olsun ve $a \in \bar{y}$ alalım.

$$(y \in \bar{x} \wedge a \in \bar{y}) \Rightarrow (x,y) \in \beta \wedge (y,a) \in \beta$$

$$\Rightarrow (x,a) \in \beta$$

$$\Rightarrow (a,x) \in \beta \Rightarrow a \in \bar{x}$$

$$[\forall a \in \bar{y} \Rightarrow a \in \bar{x}] \Rightarrow \bar{y} \subseteq \bar{x}$$

Benzer şekilde, $\forall a \in \bar{x} \Rightarrow a \in \bar{y}$

$$\Rightarrow \bar{x} \subseteq \bar{y}$$

O halde, $\bar{x} = \bar{y}$ olur.

$$ii) \quad (y \notin \bar{X} \Rightarrow \bar{X} \cap \bar{y} = \emptyset) \equiv (\bar{X} \cap \bar{y} \neq \emptyset \Rightarrow y \in \bar{X})$$

$$\bar{X} \cap \bar{y} \neq \emptyset \Rightarrow \exists a \in A, a \in \bar{X} \cap \bar{y} \quad \text{boş küme tanımı}$$

$$\Rightarrow \exists a \in A, (a \in \bar{X} \wedge a \in \bar{y}) \quad \text{kesişim tanımı}$$

$$\Rightarrow \exists a \in A, ((x, a) \in \beta \wedge (y, a) \in \beta) \quad \text{denklik sınıfı tanımı}$$

$$\Rightarrow (x, a) \in \beta \wedge (a, y) \in \beta \quad \text{simetri öz.}$$

$$\Rightarrow (x, y) \in \beta \quad \text{geçişme öz.}$$

$$\Rightarrow y \in \bar{X}$$

Tanım: (Bölüm kümesi)

Bir A kümesinde tanımlı bir β denklik bağıntısı verilsin. β bağıntısının A 'dan ayırdığı tüm denklik sınıflarının kümesine A 'nın β ya göre bölüm kümesi denir. Ve A/β ile gösterilir.

Örnek // $\beta = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z} \text{ ve } x-y \text{ çift tamsayıdır}\}$

$$\bar{1} = T, \quad \bar{2} = \emptyset$$

$$\mathbb{Z}/\beta = \{\bar{1}, \bar{2}\} = \{T, \emptyset\}$$

Denklik Bağıntısı ve Ayrımlar:

Teorem: Bir A kümesinde tanımlı bir β denklik bağıntısının tanımladığı bölüm kümesi A 'nın bir ayrımını oluşturur.

İspat // A kümesinde tanımlı β denklik bağıntısının tanımladığı bölüm kümesi A/β dir.

- Bölüm kümesindeki her bir denklik sınıfı boş kümeden farklıdır.
- Bölüm kümesindeki herhangi iki denklik sınıfı ayrık iki kümedir.
- Bölüm kümesindeki denklik sınıflarının birleşimi A kümesine eşittir.

Bunların doğru olması teoremin ispatını tanımlar.

Teorem: Bir A kümesinin her bir ayrımı, ayrımındaki her küme bir denklik sınıfı olacak biçimde, A kümesinde bir denklik bağıntısı tanımlar.

İspat // A kümesinin $\{B_i\}_{i \in I}$ ayrımını gözönüne alalım. Ayrımı oluşturan B_i kümelerinden her biri, A kümesinin bir alt kümesidir. Bu alt kümeleri denklik sınıfı olarak alan bir denklik bağıntısının bulunduğunu ispatlayalım.

A kümesinde β bağıntısını,

$(x,y) \in \beta \Leftrightarrow x$ ile y aynı bir B_i kümesindedir, biçiminde tanımlayalım.

$\forall x \in A$ için $x \in B_i$ olacak biçimde I indisler kümesinde yalnız bir tane i elemanı vardır. Bu nedenle bağıntı yansıyandır.

$(x,y) \in \beta \Leftrightarrow x,y \in B_i \Leftrightarrow y,x \in B_i \Leftrightarrow (y,x) \in \beta$ olduğundan β simetrik tir.

$[(x,y) \in \beta \text{ ve } (y,z) \in \beta] \Leftrightarrow [x,y \in B_i \text{ ve } y,z \in B_i]$

$\Leftrightarrow x,z \in B_i \Leftrightarrow (x,z) \in \beta$ olduğundan β geçişlidir.

Buna göre β bağıntısı bir denklik bağıntısıdır.

Örnek // $A = \{1,2,3,4,5\}$ olmak üzere A kümesinin $\{\{1,3,5\}, \{2,4\}\}$ ayrımının tanımladığı denklik bağıntısını yazınız?

β bağıntısının A kümesinden ayırdığı denklik sınıfları, $\{1,3,5\}$ ve $\{2,4\}$ tür.

Denklik sınıflarında bulunan elemler birbirlerine denk olduklarından,

$\beta = \{(1,1), (3,3), (5,5), (1,3), (3,1), (1,5), (5,1), (3,5), (5,3), (2,2), (2,4), (4,2), (4,4)\}$ olur.

Alıştırmalar //

1)

: ১৮৫৬/৬৬

Sıralama Bağintısı :

Bir kümede tanımlanan bir bağintının yansıma, ters simetri ve geçişme özellikleri varsa bu bağintıya bir sıralama bağintısı denir. Bir A kümesinde bir sıralama bağintısı tanımlı ise A kümesine sıralı küme denir. Bir kümede tanımlı sıralama bağintısı $\leq$ sembolü ile gösterilir. Yani,

$$x, y \in \leq \Leftrightarrow x \leq y$$

Okunuşu, $x \leq y$: "x, y'den önce gelir veya eşittir."

Özel olarak $x \leq y$ ve $x \neq y$ ise : $x < y$ yazılır. Okunuşu, "x, y'den önce gelir."

Tanım : Bir A kümesinde tanımlı bir sıralama bağintısı verilsin. $\forall x, y \in A$ için

(x, y) çifti bu bağintıya göre karşılaştırılabilir. Yani " $x \leq y$ veya $y \leq x$ "

önermesi doğru ise A kümesine tam sıralı denir. Aksi halde A kümesine

parçalı (kısmi) sıralıdır denir.

Örnek // $A = \{1, 2\}$ ise bu kümenin kuvvet kümesinde $(P(A))$ 'da $\subseteq$ bağintısı

tanımlanıyor. Bu bağintının sıralama bağintısı ve nasıl sıralı olduğunu göstere lim.

$$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, A\}$$

$$\subseteq = \{(x, y) : x, y \in P(A) \wedge x \subseteq y\}$$

$$\subseteq = \{(\emptyset, \emptyset), (\emptyset, \{1\}), (\emptyset, \{2\}), (\emptyset, A), (\{1\}, \{1\}), (\{1\}, A), (\{2\}, \{2\}), (\{2\}, A), (A, A)\}$$

Yansıma, ters simetri ve geçişme var.

$$(\emptyset, \{1\}) \in \subseteq \Rightarrow \emptyset \subseteq \{1\}$$

$\emptyset, \{1\}$ elemanları karşılaştırılabilir elemanlardır.

$$\{1\}, \{2\} \in P(A) \Rightarrow \{1\} \subseteq \{2\} \vee \{2\} \subseteq \{1\} \text{ önermesi yanlıştır.}$$

$\{1\}, \{2\}$ elemanları karşılaştırılamayan elemanlardır.


$P(A)$ kuvvet kümesi parçalı sıralıdır.

Örnek // $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ kümesinde $\leq$ bağintısı bir sıralama bağintısıdır.

A kümesi tam sıralıdır.

Sıralama Bağintısının Venn Şeması ve Güzeliği :

Örnek // $A = \{x, y, z, t, e\}$ kümesinde $\leq$ bağintısı veriliyor.



Verin Fenası

$$x \leq y$$

Gizelge



A kümesi parçalı sıralıdır.

(Tüm elemanları karşılaştırılamadığı

işin) iyi sıralı değildir.

Teorem : Bir A kümesinde tanımlı bir sıralama bağıntısının tersi de, A kümesinde bir sıralama bağıntısıdır.

İspat // β , A kümesinde bir sıralama bağıntısıdır.

$$\beta \subseteq A \times A \Rightarrow \beta, A'da \text{ bir bağıntıdır.}$$

$$\Rightarrow \beta^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in \beta\} \subseteq A \times A$$

$$i - \beta \text{ yansıyandır} \Rightarrow \forall x \in A, (x, x) \in \beta \Rightarrow (x, x) \in \beta^{-1} \Rightarrow \beta^{-1} \text{ yansıyandır.}$$

$$ii - \beta \text{ ters-simetriktir} \Rightarrow \forall (x, y) \in A \wedge x \neq y, (x, y) \in \beta \Rightarrow (y, x) \notin \beta$$

$$(y, x) \in \beta \Rightarrow (x, y) \notin \beta^{-1} \Rightarrow \beta^{-1} \text{ ters simetriktir.}$$

$$iii - \beta \text{ geçişlidir} \Rightarrow [\forall x, y, z \in A, (x, y) \in \beta \wedge (y, z) \in \beta \Rightarrow (x, z) \in \beta]$$

$$\Rightarrow (y, x) \notin \beta \wedge (z, y) \notin \beta \Rightarrow (z, x) \notin \beta \quad (\beta \text{ nin ters sim. öz.})$$

$$\Rightarrow (z, y) \notin \beta \wedge (y, x) \notin \beta \Rightarrow (z, x) \notin \beta \quad (\wedge \text{ nin değişme öz.})$$

$$\Rightarrow (z, y) \in \beta^{-1} \wedge (y, x) \in \beta^{-1} \Rightarrow (z, x) \in \beta^{-1} \quad (\text{ters bağıntı tanımı})$$

$$\Rightarrow \beta^{-1} \text{ geçişlidir.}$$

Sıralama Bağıntısı ile İlgili Kavramlar :

Tanım : (Büyükçe Eleman) :

Bir A kümesinde bir $\leq$ sıralama bağıntısı verilsin. Ve $m \in A$ olsun.

A'nın $m \leq x$ olacak şekilde m'den farklı hiçbir elemanı yoksa, m'ye A'nın bir büyükçe elemanı denir. Yani $m \leq x \Leftrightarrow m = x$ ise.

Tanım : (Küçükçe Eleman) :

Bir A kümesinde bir $\leq$ sıralama bağıntısı verilsin. Ve $n \in A$ olsun.

A'nın $x \leq n$ olacak şekilde n'den farklı hiçbir elemanı yoksa, n'ye A'nın bir küçükçe elemanı denir. Yani $x \leq n \Leftrightarrow x = n$ ise.


Tanım : Bir A kümesi ve bu kümede bir sıralama bağıntısı verilsin.

$x, y \in A$ için $x \leq y$ ise

i- x, y 'den küçük veya eşittir.

ii- y, x 'ten büyük veya eşittir.

Örnek // $A = \{a, b, c, d, e\}$ kümesinin sıralama bağıntısı şekildeki gibidir.



$x \in A$ için

$x \leq a \Rightarrow x = a$ (a : küçükse elemandır.)

$c \leq x \Rightarrow c = x$
 $e \leq x \Rightarrow e = x$ } c, e : büyükse elemanlardır.

Tanım : (En Büyük Eleman) :

Bir A kümesi ve bu kümede bir sıralama bağıntısı verilsin. A kümesinin tüm elemanlarından büyük olan bir b elemanı varsa, b'ye A'nın en büyük elemanı denir.

Tanım : (En Küçük Eleman) :


Bir A kümesi ve bu kümede bir sıralama bağıntısı verilsin. A kümesinin tüm elemanlarından küçük olan bir b elemanı varsa, b'ye A'nın en küçük elemanı denir.

Örnek // $A = \{a, b, c, d, e\}$

$a \leq b$
 $a \leq c$
 $a \leq d$
 $a \leq e$
 $a \leq a$

$a \leq c$
 $b \leq c$
 $d \leq c$

$e \leq c$ yanlış



a : en ^{küçük} büyük eleman.

e, c : büyüktedir. (en büyük değildir.)

Tanım : (Üst Sınır - Alt Sınır) :

Bir A kümesinde tanımlı bir sıralama bağıntısı verilsin. ve $B \subseteq A$ olsun.

1- $\forall x \in B$ için $x \leq a$ olacak şekilde bir $a \in A$ varsa, bu a elemanına B'nin bir üst sınırı denir.


2- $\forall x \in B$ için $b \leq x$ olacak şekilde bir $b \in A$ varsa, bu b elemanına B'nin bir alt sınırı denir.

Örnek // $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$

$B = \{a, b, c, e\}$

$a \leq a$
 $b \leq a$
 $c \leq a$
 $e \leq a$

$\Rightarrow a, B$ nin bir üst sınırlandır.



B'nin alt ve üst sınırları var mıdır?

$a \leq d, d \leq d, c \leq d, e \leq d \Rightarrow d, B$ nin bir üst sınırlandır.

$a \in B, d \notin B$ B kümesinin bu bağıntıya göre bir alt sınırı yoktur.

$\text{İzd}_1 \beta = \{x : x \in A \text{ ve } \exists y \in B \text{ için } (x,y) \in \beta\}$ β 'nin A 'ya izdüşümü (I-izdüşümü)

$\text{İzd}_2 \beta = \{y : y \in B \text{ ve } \exists x \in A \text{ için } (x,y) \in \beta\}$ β 'nin B 'ye " (II. ")

Örnek,, $A = \{1,2\}$ $B = \{a,b,c\}$ kümesinde $\beta = \{(1,b), (2,b), (1,c)\}$ dir.

β 'nin A 'ya ve B 'ye izdüşümlerini bulalım.


$$\text{İzd}_1 \beta = \{1,2\} = A$$

$$\text{İzd}_2 \beta = \{b,c\} \subset B$$

Problemler :

- 1- $A = \{a,b,c\}$ kümesinin $P(A)$ kuvvet kümesinde tanımlı " $\subseteq$ " bağıntısının $P(A)$ kuvvet kümesinde bir sıralama bağıntısı olduğunu gösterin ve çizelgesini bulun?
- 2- $S = \{1,2,3, \dots\}$ kümesinde bir $\leq$ bağıntısı $x \leq y \Leftrightarrow x|y$ olarak tanımlanıyor.
 - a) Bu bağıntının sıralama bağıntısı olduğunu ispat edin.
 - b) S kümesi bu bağıntıya göre nasıl sıralıdır?
 - c) S 'nin $\{24,12,6\}$, $\{3,5,15\}$, $\{15,30,5\}$ kümeleri bu bağıntıya göre tam sıralı mıdır?
- 3- $A = \{2,3,5,10,30,60\}$ kümesi ve bu kümede $\beta = \{(x,y) : x,y \in A \wedge x|y\}$ bağıntısı veriliyor.
 - a) β 'nin bir sıralama bağıntısı olduğunu gösterin.
 - b) Çizelgesini bulun.
 - c) Sıralama bağıntısıyla ilgili kavramları belirtin.
- 4- $A = \{2,3,4,5,6,8,9,10\}$ kümesinde $x \beta y \Leftrightarrow x,y$ 'nin bir katıdır. ($x = ky$ $k \in \mathbb{Z}^+$) bağıntısı veriliyor.
 - a) Sıralama bağıntısı olduğunu gösterin.
 - b) Çizelgesini bulun.
 - c) A 'nın büyükçe ve küçükçe elemanlarını belirtin.
 - d) A 'nın en büyük ve en küçük elemanları var mıdır? Neden?

5-



$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ kümesinde, yandaki sına ile bir sıralama bağıntısı veriliyor. Ve $B = \{4, 5, 6\} \subseteq A$ olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

- B'nin üst sınırlarının kümesini,
- B'nin alt " " bulunuz.
- $\text{eküs}(B)$ ve $\text{ebas}(B)$ elemanlarını bulunuz.

6- $\mathbb{Z}^+$ kümesinde $\beta = \{(m, n) : m, n \in \mathbb{Z}^+ \wedge m/n\}$ bağıntısı tanımlanıyor.

- β 'nin bir sıralama bağıntısı olduğunu ispat edin.
- $A = \{m, n\}$ kümesinin bu bağıntıya göre alt sınırlarının kümesini bulun.
- A 'nin bu bağıntıya göre üst sınırlarının kümesini bulun.
- $\text{ebas}(A)$ ve $\text{eküs}(A)$ elemanlarını bulun.

7- $\mathbb{R}$ kümesinde $\ll$ sıralama bağıntısı veriliyor. Buna göre $A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}^+\}$ kümesinin,

- Alt sınırlarını,
- Üst sınırlarını,
- $\text{ebas}(A)$ ve $\text{eküs}(A)$ elemanlarını bulun.

Çözümler.

$$1- A = \{a, b, c\} \Rightarrow P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, A, \{c\}\}$$

$$\subseteq = \{(x, y) : x, y \in P(A) \wedge x \subseteq y\}$$


i- $\forall x \in P(A), x = x \Rightarrow x \subseteq x \Rightarrow (x, x) \in \subseteq$ yansıma özelliği vardır.

ii- $\forall x, y \in P(A), x \neq y \wedge (x, y) \in \subseteq \Rightarrow x \neq y \wedge x \subseteq y \Rightarrow y \not\subseteq x \Rightarrow (y, x) \notin \subseteq$ simetrik.

iii- $\forall x, y, z \in P(A), (x, y) \in \beta \wedge (y, z) \in \beta \Rightarrow (x \subseteq y \wedge y \subseteq z)$

$\Rightarrow x \subseteq z \Rightarrow (x, z) \in \subseteq$ geçişlidir.

$\subseteq$ bağıntısı bir sıralama bağıntısıdır.



2- $x, y \in S, x \leq y \Leftrightarrow x/y$

b- $2, 3 \in S$ $2 \not\leq 3 \wedge 3 \not\leq 2$ tan sıralı değil, parçalı sıralıdır.


c- $3 \leq 5 \Leftrightarrow 3/5$ yanlıştır. Sayma sayıları kümesi bu bağıntıya göre iyi sıralı değildir. (Boş olmayan her alt kümesinin elemanı yoktur.)

S' 'de $\leq$ iyi sıralıdır, tan sıralıdır.

Z' 'de $\leq$ tan sıralıdır. (karşılaştırılabilir elemanları olmadığı için)

iyi sıralı değildir.

3-b- $A = \{2, 3, 5, 10, 30, 60\}$ $(x, y) \in \beta \Leftrightarrow x/y$



Üst sınırı 60, alt sınırı yoktur. Üstten sınırlıdır. Alttan sınırlı değildir.

4- $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10\}$ $(x, y) \in \beta \Rightarrow x, y$ nin bir katıdır. ($x = ky$ $k \in \mathbb{Z}^+$)

• $\forall x \in A, x = 1 \cdot x \Rightarrow (x, x) \in \beta$ yansıma vardır.

• $\forall x, y \in A, (x, y) \in \beta \Rightarrow x = ky \wedge x \neq y$

$\Rightarrow y \neq r \cdot x \Rightarrow (y, x) \notin \beta$ ters sim. var.


• $\forall x, y, z \in A, (x, y) \in \beta \wedge (y, z) \in \beta \Rightarrow (x, z) \in \beta$

$\Rightarrow x = k \cdot r \cdot z$

$\Rightarrow x$ z'nin bir katıdır. $(x, z) \in \beta$ geçişlidir.

β bir sıralama bağıntısıdır.

$\beta = \{(x, y) : x = ky\} = \{(2, 2), (4, 2), (6, 2), (8, 2), (10, 2), (3, 3), (6, 3), (9, 3), \dots\}$



A'nın büyükçe elemanları 2, 3, 5 tir.

A'nın küçükçe " 6, 8, 9, 10 dur.

En büyük ve en küçük elemanı yoktur.

tüm
elemanlarından
sonra gelen

5- $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

A'nın küçükçe elemanı : 8

B'nin üst sınırları, 1, 2, 3

" büyükçe elemanı : 1, 2

" alt

" , 6, 8.

$eküs(B) = 3$ $ebas(B) = 6$

6- $B = \{(m, n) : m, n \in \mathbb{Z}^+ \wedge m/n\}$

$A = \{m/n\}$
 $\Rightarrow m \leq n$

A'nın alt sınırları : m'den küçük ve m'yi bölen veya m'ye eşit olan tüm $\mathbb{Z}^+$ kümesi.

$ebas(A) = m$

A'nın üst sınırları : m'den büyük ve n tarafından bölünen tüm $\mathbb{Z}^+$ kümesi.

$eküs(A) = n$

7- $\mathbb{R}$ 'de $\leq$ sıralama bağıntısı veriliyor. $A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}^+\} \subseteq \mathbb{R}$ parçalı sıralıdır. iyi sıralı değildir.

A'nın alt sınırları : Sıfırdan küçük veya sıfıra eşit olan tüm reel sayılar.

$A = \{x : 0 < x \leq 1, x \in \mathbb{Q}\}$

$x \leq 0 \wedge x \in \mathbb{R}$

$ebas(A) = 0 \notin A$

A'nın üst sınırları : 1'den büyük veya eşit olan tüm reel sayılar.

$eküs(A) = 1 \in A$

$x \geq 1, x \in \mathbb{R}$

A kümesi sınırlı bir kümedir.

- FONKSİYON -

Tanım: Boş olmayan A ve B kümeleri ve A'dan B'ye bir f bağıntısı verilsin.

f bağıntısı $\forall x \in A$ elemanını B'nin "bir ve bir tek" y elemanına eşliyorsa

f bağıntısı A'dan B'ye bir fonskiyondur, denir.

Bu iki peye dikkat edilmelidir.





1- $\forall x \in A$ için bir y elemanı $y = f(x)$ olacak şekilde mutlaka bulunmalıdır.

2- $x \in A$ ya karşılık gelen, B'nin y elemanı "bir ve bir tek" olmalıdır.

A: fonskiyonun tanım kümesi,

B: " değer(değerler) kümesidir.

Örnek // $A = \{-2, 0, 1\}$ $B = \{4, 0, 1, 6\}$



1. Tanım: A'dan B'ye bir f fonksiyonu $f: A \rightarrow B$ veya $A \xrightarrow{f} B$ gibi sembollerle gösterilir.


2. Tanım: Eğer $(x, y) \in f$ ise y elemanına "x'in f'deki görüntüsü" (x'in f altındaki görüntüsü "x'in f'deki resmi") denir. ve $y = f(x)$ yazılır. Bu ifadeye fonksiyonun kuralı denir.

Tanım: $f: A \rightarrow B$ bir fonksiyon ve $A_1 \subseteq A$ olsun.

$$f(A_1) = \{y : \exists x \in A_1 \text{ ve } y = f(x)\}$$

kümesine, A_1 kümesinin f'deki görüntüsü (resmi) denir. $f(A_1) \subseteq B$

Eğer $A = A_1$ alınırsa $f(A) \subseteq B$



Örnek //

$$A = \{1, 2, 3\} \quad B = \{a, b, c, d\}$$

$$f = \{(1, a), (2, b), (3, c)\}$$

$$A_1 = \{2, 3\} \subset A \quad f(A_1) = \{b, c\}$$

$$f(A) = \{a, b, c\} \subset B$$

Örnek //

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

$$A_1 = [0, 1] \quad f(A_1) = \{0, 1\} \subset \mathbb{R}$$

$$f([-1, 1]) = [0, 1] \quad f(\mathbb{R}) = [0, \infty) = \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$$

Tanım: $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu verilsin ve $A_1 \subseteq A$ olsun.

$y: A_1 \rightarrow B$, $g(x) = f(x)$, $\forall x \in A_1$ olan g fonksiyonuna f 'nin A_1 kümesine kısıtlanmış (daraltılmış) denir.

Simbolik olarak $f|_{A_1} = g$ ile gösterilir.

Tanım: $f: A \rightarrow B$ verilsin. ve $A \subseteq A_1$ olsun.

$g: A_1 \rightarrow B$, $\forall x \in A$ için $g(x) = f(x)$ şeklinde tanımlanan g fonksiyonuna f 'nin A_1 kümesine genişletilmiş denir.

Örnek //

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = \cos x$$

$$g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z \mapsto f(z) = \cos z$$

$$z = x + iy$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$x \mapsto f(x) = \cos x$$

Örnek //

$$f: \mathbb{Z} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Q}$$



$$x \mapsto f(x) = \frac{1}{x}$$

$$g: \mathbb{Q} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$x \mapsto g(x)$$

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \text{ ise} \\ 0 & x \notin \mathbb{Z} \text{ ise} \end{cases}$$

f, g 'nin $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ kümesine kısıtlanmışdır.



Ters Görüntü =

$f: A \rightarrow B$ bir fonksiyon olsun ve $y \in B$ verilsin. $y = f(x)$ olacak şekilde bir $x \in A$ elemanı varsa bu x elemanına y 'nin ters görüntüsü denir. y 'nin ters görüntüleri kümesi $f^{-1}\{y\}$ ile gösterilir.

$$f^{-1}\{y\} = \{x : x \in A \text{ ve } y = f(x)\} \subseteq A$$

Örnek // $A = \{a, b, c, d\}$ $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$$f = \{(a, 4), (b, 6), (c, 1), (d, 4)\}$$

$$f^{-1}\{1\} = \{c\} \quad f^{-1}\{2\} = \{\} \quad f^{-1}\{3\} = \emptyset = \{\} \quad f^{-1}\{4\} = \{a, d\}$$

$$f^{-1}\{5\} = \emptyset \quad f^{-1}\{6\} = \{b\}$$

Tanım: $f: A \rightarrow B$ bir fonksiyon. ve $B_1 \subseteq B$ olsun.

$f^{-1}(B_1) = \{x : x \in A \text{ ve } f(x) \in B_1\}$ kümesine B_1 kümesinin ters görüntüsü denir.




Örnek // $A = \{a, b, c, d\}$ $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$$f = \{(a, 4), (b, 6), (c, 1), (d, 6)\}$$

$$B_1 = \{1, 2, 4\} \text{ ise } f^{-1}(B_1) = \{c, a, d\}$$

Problemler :

1- $A = \{a, b, c\}$ $B = \{x, y, z\}$ ise aşağıdakilerden hangileri A dan B ye fonksiyondur.



2- Aşağıdakilerden hangileri A 'dan B 'ye fonksiyondur.

a) $A = \{1, 2, 3\}$ $B = \{2, 4, 6\}$ $f = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6)\}$ fonksiyondur.

b) $A = \{1, 2, 3, 4\}$ $B = \{a, b, c, d\}$ $f = \{(3, a), (4, b), (1, d)\}$ fonksiyondur.

c) $A = [1, 3]$ $B = \{y : x \in A \text{ ve } y = x\}$ $f = \{(x, x^2) : x \in A\}$ fonksiyondur.

d) $A = B = \mathbb{R}$, $f = \{(x, y) : x \in \mathbb{R} \wedge y = 2x^2 + 1\}$ fonksiyondur.

e) $A = B = \mathbb{R}$, $f = \{(x, y) : x \in \mathbb{R} \wedge y^2 = x\}$ fonksiyon değildir.

f) $A = B = \mathbb{R}$, $f = \{(x, y) : x \in \mathbb{R} \wedge x^2 + y^2 = 4\}$ fonksiyon değildir.

Eşit Fonksiyonlar : A ve B iki küme, $f: A \rightarrow B$ ve $g: A \rightarrow B$ iki fonksiyon olsunlar. $\forall x \in A$ için $f(x) = g(x)$ ise f ve g fonksiyonları eşittir denir ve $f = g$ yazılır.


Örnek // $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = x^2$
 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $g(y) = y^2$ } $f = g$ dir. (kuralı aynıdır.)

Özdeşlik Fonksiyonu : $f: A \rightarrow A$ fonksiyonu $\forall x \in A$ için $f(x) = x$ şeklinde tanımlanırsa bu fonksiyona A'nın özdeşlik fonksiyonu denir ve I_A ile gösterilir.

Örnek // $A = \{1, 2, 3\}$ kümesinin özdeşlik fonksiyonu,
 $f = \{(x, y) : x \in A \wedge y = f(x)\} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$

Sabit Fonksiyon : $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu verilsin. $\forall x \in A$ için $f(x) = b$ ($b = \text{sabit}$) ise f'ye sabit fonksiyon denir.

Örnek // $A = \{1, 2, 3\}$ $B = \{0, 1, 2\}$



$$f: A \rightarrow B, f(x) = 2$$

$$f = \{(1, 2), (2, 2), (3, 2)\}$$

Birebir Fonksiyon : A ve B iki küme ve $f: A \rightarrow B$ bir fonksiyon olsun.

A'nın farklı elemanlarının görüntüleri de farklı ise f'ye birebir fonksiyon denir. bire-bir $\equiv 1:1$

Bu tanıma göre ;

a) f 1:1 dir $\Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in A, [x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)]$

b) f 1:1 dir $\Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in A, [f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2]$

Örnek // $A = \{1, 2, 3\}$ $B = \{a, b, c, d\}$ $f = \{(1, b), (2, c), (3, d)\}$

$$f: A \rightarrow B \quad 1:1 \text{ dir.}$$

Örnek // $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = -3x$ fonksiyonu birebir midir?

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow -3x_1 = -3x_2 \quad (\text{fonksiyon tanımından})$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2 \quad (-3 \text{ ile bölerek})$$

$$f, 1:1 \text{ dir.}$$

Örten (Üzerine) Fonksiyon: $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu verilsin. B'nin her bir elemanının A'da bir karşılığı varsa (ters görüntü varsa) f fonksiyonu örten (üzerine) dir denir.

Buna göre: f örtendir $\Leftrightarrow \forall y \in B, \exists x \in A, f(x) = y$

Örnek // 1) $A = \{1, 2, 3, 4\}$ $B = \{a, b, c\}$ $f = \{(1, b), (2, a), (3, c), (4, d)\}$

f , örtendir, birebir değildir.

2) $f(x) = 7x$ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = y$ olan $x \in A$ var mıdır?

$$7x = y \quad x = \frac{y}{7} \in \mathbb{R}$$

$$f(x) = f\left(\frac{y}{7}\right) = 7 \cdot \frac{y}{7} = y \quad f \text{ örtendir.}$$

Tanım: A ve B kümeleri verildiğinde 1:1 ve örten olacak şekilde

$f: A \rightarrow B$ fonksiyonu varsa A ve B kümeleri eşit güçlüdürler denir.

Kümeler ailesinde eşit güçlü olma bağıntısının bir denklik bağıntısı

olduğunu gösterin, yansıma özelliğine sahip olduğunu gösterin.

Tanım: (Permütasyon):

A bir küme olsun. Bir $f: A \rightarrow A$ fonksiyonu bire-bir ve örten ise

f 'ye A'nın bir permütasyonu denir.

Problemler

1- Aşağıdaki fonksiyonlardan hangileri bire-birdir?

a) $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ $-\frac{1}{2} \neq \frac{1}{2}$ $f(-\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} = f(\frac{1}{2})$ bire-bir değildir.

b) $f: [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ $\forall (x_1, x_2) \in [1, 3], f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1^2 = x_2^2$ birebirdir.

c) $f: [-3, -1] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ $\forall x_1, x_2 \in [-3, -1] f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1^2 = x_2^2$ $x_1 = x_2$ birebirdir.

2- Aşağıdaki fonksiyonlardan hangileri örtendir?

a) $f: [-1, 1] \rightarrow [-1, 1], f(x) = x^2$ $\forall y \in B, f(x) = y, x \in A, y = -\frac{1}{2} = f(x) = -\frac{1}{2} = x^2$ $x = \pm \sqrt{-\frac{1}{2}}$ $x \notin [-1, 1]$ $\Rightarrow$ f örtendir.

b) $f: [-1, 1] \rightarrow [0, 1], f(x) = x^2$ $\forall y \in [0, 1] \Rightarrow f(x) = y \Rightarrow y = x^2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{y}$ $\Rightarrow$ $x \in [-1, 1]$ $\Rightarrow$ f örtendir.

c) $f: [-1, 1] \rightarrow [-1, 1], f(x) = x^5$ $\forall y \in [-1, 1] \Rightarrow f(x) = y \Rightarrow y = x^5 \Rightarrow x = \sqrt[5]{y} \in [-1, 1]$ $\Rightarrow$ f örtendir.

d) $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1], f(x) = x^5$ $\forall y \in [0, 1] \Rightarrow$ $\Rightarrow$ f örtendir. bire-birdir.

Tanım: $B \cap C \neq \emptyset$ olmak üzere $f: A \rightarrow B$ ve $g: C \rightarrow D$ fonksiyonları verilsin.


f ve g bğıntılarının bileşkesine, f ve g fonksiyonlarının bileşkesi denir.

Ve, $g \circ f$ şeklinde yazılır. Yani,


$$g \circ f = \{(x, z) : \exists y \in B \cap C \text{ için } (x, y) \in f \text{ ve } (y, z) \in g\}$$

$$g \circ f = \{(x, z) : \forall x \in f^{-1}(B \cap C) \text{ için } z = (g \circ f)(x)\}$$

$$z = (g \circ f)(x) = g(f(x))$$



Örnek // $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $B = \{1, 16, 4, 9, 25\}$ $C = \{4, 9, 25, 64\}$ $D = \{1, 7, 2, 4, 15\}$



$$f = \{(1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16), (5, 25)\}$$

$$g = \{(4, 1), (9, 2), (25, 4), (64, 7)\}$$

$$g \circ f = \{(2, 1), (3, 2), (5, 4)\}$$

Teorem: $B \cap C \neq \emptyset$ olmak üzere $f: A \rightarrow B$ ve $g: C \rightarrow D$ fonksiyonları verilsin. f ve g nin bileşkesi tanım kümesi $f^{-1}(B \cap C)$ ve değer kümesi D olan bir fonksiyondur.

İspat // $g \circ f = \{(x, z) : \forall x \in f^{-1}(B \cap C) \text{ için } z = g(f(x))\}$

① $\forall x \in f^{-1}(B \cap C)$ için $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ vardır. (Her elemanın görüntüsü vardır.)

② $\forall x_1, x_2 \in f^{-1}(B \cap C)$ için $x_1 \neq x_2$ olsun. $\Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ (f fonksiyon olduğu için)

$\Rightarrow g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$ (g fonksiyondur) $\Rightarrow (g \circ f)(x_1) \neq (g \circ f)(x_2)$

$\Rightarrow g \circ f$ fonksiyondur.

Özel Hâl: $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow C$ bir fonksiyon olsun.

$g \circ f: A \rightarrow C$ bir fonksiyondur.

Tanım: $f: A \rightarrow B$ $g: C \rightarrow D$ $h: E \rightarrow F$ fonksiyonlar ve $B \cap C \neq \emptyset$,
 $D \cap E \neq \emptyset$ iseler,

$$ho(gof) = (hog)of \quad (\text{bileşke işleminin birleşme özelliği})$$

İspat // $ho(gof)$ ve $(hog)of$ tanım kümesi $f^{-1}(B \cap C)$, ve değer kümesi de D olan bir fonksiyondur.

$$\forall x \in f^{-1}(B \cap C) \text{ için } [ho(gof)](x) = h[(gof)(x)] = h[g(f(x))] \quad \text{--- (1)}$$

$$[(hog)of](x) = [(hog)(f(x))] = h[g(f(x))] \quad \text{--- (2)}$$

$$\Rightarrow [ho(gof)](x) = [(hog)of](x)$$

$$\Rightarrow ho(gof) = (hog)of \quad (\text{fonksiyonlarda eşitlik tanımı})$$

Sonuç: Fonksiyonlarda bileşke işleminin birleşme özelliği vardır.

Teorem: $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow C$ fonksiyonları birebir ve örten iseler
 $gof: A \rightarrow C$ fonksiyonu da birebir ve örtendir.

İspat I) f ve g bire-bir iseler gof da bire-birdir.

$$f: 1:1 \text{ dir. } \forall x_1, x_2 \in A \text{ için } f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \quad (\text{hipotezden})$$

$$g: 1:1 \text{ dir. } \forall y_1, y_2 \in B \text{ için } g(y_1) = g(y_2) \Rightarrow y_1 = y_2 \quad (\text{hipotezden})$$

$$\forall x_1, x_2 \in A \text{ için } (gof)(x_1) = (gof)(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \quad ?$$

$$\forall x_1, x_2 \in A \text{ için } (gof)(x_1) = (gof)(x_2) \Rightarrow g(f(x_1)) = g(f(x_2))$$

$$\Rightarrow f(x_1) = f(x_2) \quad (g \text{ birebirdir.})$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2 \quad (f \text{ birebirdir.})$$

$$\Rightarrow (gof) \text{ birebirdir.}$$

II) f ve g örten ise gof da örtendir.

$$f: \text{örtendir.} \Rightarrow \forall y \in B \text{ için } f(x) = y \text{ olan bir } x \in A \text{ vardır.}$$

$$g: \text{örtendir.} \Rightarrow \forall v \in C \text{ için } g(u) = v \text{ olan bir } u \in B \text{ vardır.}$$

$$\forall z \in C \text{ için } (fog)(x) = z \text{ olan } x \in A \text{ vardır. ?}$$

$$\forall z \in C \text{ için } g(y) = z \text{ olan } y \in B \text{ vardır. (g örten olduğu için)}$$

$$\Rightarrow z = g(f(x)) \text{ olan } x \in A \text{ vardır. (f örten " ")}$$

$$\Rightarrow \forall z \in C, z = (gof)(x) \text{ olan } x \in A \text{ vardır.}$$

$$\Rightarrow gof \text{ örtendir.}$$

Tanım: $f: A \rightarrow B$ bir fonksiyon olsun. f bağıntısının tersi de bir fonksiyon ise bu fonksiyona f 'nin ters fonksiyonu denir. Ve f^{-1} ile gösterilir.

Örnek // $A = \{a, b, c\}$ $B = \{1, 2, 3\}$, $f = \{(a, 2), (b, 2), (c, 3)\}$
 $f^{-1} = \{(2, a), (2, b), (3, c)\}$ fonksiyon değildir.

Sonuç: $f: A \rightarrow B$, $f^{-1}: B \rightarrow A$

Teorem: $f: A \rightarrow B$ bir fonksiyon olsun. f nin tersinin de bir fonksiyon olması için gerek ve yeter şart, birebir ve örten olmasıdır.

İspat // 1) Şart gerektir. $\Rightarrow f$ nin tersi de $f^{-1}: B \rightarrow A$ bir fonksiyon olsun.

$$f = \{(x, y) : x \in A \text{ ve } y \in B \text{ ve } y = f(x)\}$$

$$f^{-1} = \{(y, x) : y \in B \text{ ve } x \in A \text{ ve } y = f(x)\}$$

$$\forall x_1, x_2 \in A \text{ için } f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$\forall x_1, x_2 \in A \text{ için } f(x_1) = f(x_2) = y \text{ olsun.}$$

$$\Rightarrow [(x_1, y) \in f \wedge (x_2, y) \in f]$$

$$\Rightarrow [(y, x_1) \in f^{-1} \wedge (y, x_2) \in f^{-1}] \text{ ters bağıntı tanımı.}$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2 \text{ } f \text{ nin tersi } f^{-1} \text{ de fonksiyondur.}$$

$$\Rightarrow f^{-1}: B \rightarrow A \text{ fonksiyondur. Bire-birdir.}$$

$$f^{-1}: B \rightarrow A \text{ örtendir. ?}$$

$$\forall x \in A \text{ için } f^{-1}(y) = x \text{ olan } y \in B \text{ vardır.}$$

$$\forall y \in B \text{ için } \exists x \in A, (y, x) \in f^{-1}$$

$$\Rightarrow (x, y) \in f \text{ (ters fonksiyon tanımı)} \Rightarrow f \text{ örtendir.}$$

2) Şart yeter $\Rightarrow f: A \rightarrow B$ 1:1 ve örten ise $f^{-1}: B \rightarrow A$ bir fonksiyondur.

$$f \text{ örten olduğundan, } \forall y \in B, y = f(x)$$

$$\Rightarrow (x, y) \in f \Rightarrow (y, x) \in f^{-1}$$

$$\Rightarrow x = f^{-1}(y)$$

Teklîgi ispatı: (Bir ve birtak) Aksini farzedelim, yani

$$y \in B \text{ için } (y, x_1) \in f^{-1} \wedge (y, x_2) \in f^{-1}$$

$$\Rightarrow [(x_1, y) \in f \wedge (x_2, y) \in f] \text{ (ters fonksiyon tanımından)}$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2 \text{ (f birebir olduđu için)}$$

Örnek,, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = 2x+1$ fonksiyonunun tersinin de bir fonksiyon olduğunu gösterin ve tersini bulun.

I) f birebirdir, $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow 2x_1 + 1 = 2x_2 + 1$

$$\Rightarrow x_1 = x_2 \text{ f birebirdir.}$$

II) f örtendir, $\forall y \in \mathbb{R}$, $f(x) = y \Rightarrow y = 2x + 1$

$$\Rightarrow x = \frac{y-1}{2} \in \mathbb{R}, f(x) = f\left(\frac{y-1}{2}\right) = y$$

$$\Rightarrow f \text{ örtendir.}$$

III) $f^{-1} = \{(y, x) : x, y \in \mathbb{R} \wedge y = f(x)\}$
 $= \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R} \wedge x = f(y)\}$

$$y = \frac{x-1}{2} \Leftrightarrow y = 2x + 1$$

$$\left(\begin{array}{l} y = e^x \\ \text{fonksiyon} \\ f \Rightarrow \end{array} \Rightarrow x = e^y \Rightarrow \begin{array}{l} y = \ln x \\ \text{ters fonk.} \\ \Rightarrow f^{-1} \end{array} \right)$$

Teorem: $f: A \rightarrow B$ birebir ve örten ise $f^{-1}: B \rightarrow A$ birebir ve örtendir. (Ödev)

Teorem: $f: A \rightarrow B$ bir fonksiyon, A'nın özdeşlik fonksiyonu I_A ve B'nin özdeşlik fonksiyonu I_B olsun.

$$f \circ I_A = I_B \circ f = f$$

İspat // $I_A: A \rightarrow A$

$$x \rightarrow I_A(x) = x$$

$$f: A \rightarrow B$$

$$x \rightarrow y = f(x)$$

$$I_B: B \rightarrow B$$

$$y \rightarrow I_B(y) = y$$

$$f \circ I_A: A \rightarrow B$$

$$I_B \circ f: A \rightarrow B$$

$$f: A \rightarrow B$$

$$\forall x \in A \text{ için } (f \circ I_A)(x) = f(I_A(x))$$

$$= f(x)$$

$$\forall x \in A \text{ için } (I_B \circ f)(x) = I_B(f(x))$$

$$= f(x)$$

$$\Rightarrow \forall x \in A \text{ için } (f \circ I_A)(x) = f(x) = (I_B \circ f)(x)$$

$$\Rightarrow (f \circ I_A)(x) = (I_B \circ f)(x)$$

$$\Rightarrow f \circ I_A = I_B \circ f$$

Teorem : $f: A \rightarrow B$ birebir ve örten ise ,

$$f^{-1} \circ f = I_A \text{ dir ve } f \circ f^{-1} = I_B \text{ dir.}$$

$f^{-1}: B \rightarrow A$ birebir ve örten bir fonksiyondur.

$$I_A: A \rightarrow A \quad f^{-1} \circ f: A \rightarrow A$$

$$I_B: B \rightarrow B \quad f \circ f^{-1}: B \rightarrow B$$

$$\forall x \in A \text{ için } \exists y \in B, y = f(x)$$

$$\forall x \in A \text{ ve } \exists y \in B \text{ için } x = f^{-1}(y)$$

$$\forall x \in A \text{ için } (f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x))$$

$$= f^{-1}(y) = x = I_A(x)$$

$$\Rightarrow \forall x \in A, (f^{-1} \circ f)(x) = I_A(x)$$

$$\Rightarrow (f^{-1} \circ f) = I_A$$

$$\forall y \in B \text{ için } (f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x) = y = I_B(y)$$

$$\Rightarrow \forall y \in B, (f \circ f^{-1})(y) = I_B(y)$$

$$\Rightarrow f \circ f^{-1} = I_B$$

Teorem : $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow A$ iki fonksiyon olsunlar.

$$g \circ f = I_A \text{ ve } f \circ g = I_B \text{ ise}$$

f ve g nin her ikisi de birebir ve örtendir. Ayrıca

$$f^{-1} = g \text{ ve } g^{-1} = f \text{ dir.}$$

İspat // 1) f , bire-birdir. ?

$$\forall x_1, x_2 \in A \text{ için } f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow g(f(x_1)) = g(f(x_2))$$

$$\Rightarrow (g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$$

$$\Rightarrow I_A(x_1) = I_A(x_2) \quad (\text{hipotezden})$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2$$

$$\Rightarrow f \text{ bire-birdir}$$

$$(Ödev) = g = \text{bire-birdir.}$$

2) f örtendir. ?

$\forall y \in B$ için $g(y) = x$ olan bir $x \in A$ vardır.

$$\Rightarrow \forall y \in B \text{ için } y = I_B(y) \text{ ve } (f \circ g) = I_B$$

$$\Rightarrow (f \circ g)(y) = I_B(y) = y$$

$$\Rightarrow f(g(y)) = y$$

$\Rightarrow f(x) = y$ ($g(y)$ yerine x yazılarak) $x \in A$ vardır ve f örtendir.

Ödev: g örtendir. ?

$$g \circ f = I_A \Rightarrow (g \circ f) \circ f^{-1} = I_A \circ f^{-1}$$

$$\Rightarrow g \circ (f \circ f^{-1}) = I_A \circ f^{-1}$$

$$\Rightarrow g \circ I_B = I_A \circ f^{-1}$$

$$\Rightarrow g = f^{-1}$$

Ödev: $f = g^{-1}$?

Teorem: $f: A \rightarrow B$ birebir ve örten bir fonksiyon ise $(f^{-1})^{-1} = f$ dir.

İspat // $f^{-1}: B \xrightarrow[\text{örten}]{1:1} A$ $B \xrightarrow{f^{-1}} A \xrightarrow{f} B$
 $f \circ f^{-1} = I_B$ $f \circ f^{-1}$

$$f^{-1} \circ f = I_A$$

$$(f^{-1})^{-1} \circ f^{-1} = I_B \quad ((f^{-1})^{-1} \circ f^{-1}) \circ f = I_B \circ f$$

$$\Rightarrow (f^{-1})^{-1} \circ (f^{-1} \circ f) = f \Rightarrow (f^{-1})^{-1} \circ I_A = f \Rightarrow (f^{-1})^{-1} = f$$

Übung:

1. Gegeben sei die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$.
a) Bestimmen Sie die Nullstellen von f .
b) Untersuchen Sie f auf Monotonie und Extrema.
c) Skizzieren Sie den Graphen von f .

Lösung:

a) Die Nullstellen von f sind die Lösungen der Gleichung $x^3 - 3x^2 + 2x = 0$.
Es gilt $x(x^2 - 3x + 2) = 0$.
Die Nullstellen sind $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ und $x_3 = 2$.

b) Die Ableitung von f ist $f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$.
Die Nullstellen von f' sind $x_1 = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$ und $x_2 = 1 + \frac{\sqrt{3}}{3}$.
Für $x < 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$ gilt $f'(x) > 0$, für $1 - \frac{\sqrt{3}}{3} < x < 1 + \frac{\sqrt{3}}{3}$ gilt $f'(x) < 0$,
für $x > 1 + \frac{\sqrt{3}}{3}$ gilt $f'(x) > 0$.
Es gibt ein lokales Maximum bei $x_1 = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$ und ein lokales Minimum bei $x_2 = 1 + \frac{\sqrt{3}}{3}$.


Übung:

2. Gegeben sei die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$.
a) Bestimmen Sie die Nullstellen von f .
b) Untersuchen Sie f auf Monotonie und Extrema.
c) Skizzieren Sie den Graphen von f .

- İŞLEM -

Tanım: A boş olmayan bir küme ve α da $A \times A$ nin boş olmayan bir alt kümesi olsun. α dan A 'ya olan bir fonksiyona A da bir ikili işlen veya A 'da bir iş işlen (A da bir işlen denir) denir.

Örnek,, A kümesi $A = \{0,1,2\}$ $\alpha = \{(0,0), (0,1), (1,2), (2,1)\}$ olsun.



f , A 'da bir işlendir.

Tanım: (Gök Değişkenli Fonksiyon) =

Boş olmayan $A_1, A_2, \dots, A_n$ kümeleri verilsin.

Tanım kümesi, $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ ve değer kümesi A olan fonksiyona n değişkenli fonksiyon denir.

Örnek,, $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x,y) \rightarrow f(x,y) = x^2 - 2xy \quad (2 \text{ değişkenli fonksiyon})$$

Örnek,, $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x,y,z) \rightarrow f(x,y,z) = \cos x + yz \quad (3 \text{ değişkenli fonksiyon})$$

Örnek,, A kümesinin $P(A)$ kuvvet kümesinde,

$$f: P(A) \times P(A) \rightarrow P(A)$$

$$(X,Y) \rightarrow f(X,Y) = X \cap Y \quad \text{Kesişim işlemi.}$$

Tanım: $\alpha \subseteq A \times A$ ve $f: \alpha \rightarrow A$ bir işlen olsun. Eğer $A \times A$ nin bir

(a,b) elemanının f altında bir görüntüsü varsa "bu işlen (a,b) de tanımlıdır" denir. Aksi halde f fonksiyonu (a,b) de tanımlı değildir denir.

Eğer f işlemi (a,b) de tanımlı ise $f(a,b)$ yerine $a \circ b$ yazılır.

Bazen f işlemi yerine $+$, $\oplus$, $\cdot$, $\odot$ sembolleri ve $a \circ b$ yerine de

$a + b$, $a \oplus b$, $a \cdot b$, $a \odot b$ şeklinde gösterilir. İşlem yerine,

0 , $*$, Δ , $\sqsupset$ sembolleri, $a \circ b$ yerine de $a 0 b$, $a * b$, $a \Delta b$, $a \sqsupset b$

sembolleri kullanılır.

Sonlu bir A kümesinde tanımlanan bir $\circ$ işlemi,

$\circ$	A'nın tüm elemanları			
	a	b		
a		c		$f(a,b) = c$

Örnek,, $A = \{0,1\}$ $P(A)$ da tanımlanan $\cap$ işleminin çizelgesini düzenlersek,
 $P(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{1,2\}\}$

$\cap$	$\emptyset$	$\{0\}$	$\{1\}$	A
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{0\}$	$\emptyset$	$\{0\}$	$\emptyset$	$\{0\}$
$\{1\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{1\}$
A	$\emptyset$	$\{0\}$	$\{1\}$	A

İşlemin Özellikleri :

1. Tanım : (Kapalılık Özelliği) :

Bir A kümesinde tanımlanan bir işlem $A \times A$ dan A 'ya bir fonksiyon ise A kümesi bu işleme göre kapalıdır. (Bu işlemin kapalılık özelliği vardır.)
 denir.

$$\alpha \subseteq A \times A \quad (\text{işlem tanımından})$$

$$\alpha = A \times A \quad (\text{kapalılık tanımından})$$

Örnek,, $A = \{a,b,c\}$ tanımlı $\circ$ işlemi tanımlanıyor.

$\circ$	a	b	c
a	c	a	b
b	a	b	c
c	b	c	a

$f: A \times A \rightarrow A$ kapalılık özelliği vardır.

$$\forall x,y \in A, x \circ y \in A$$

$*$	a	b	c
a	c	a	b
b	b	c	a
c	a	b	d

kapalılık özelliği yoktur. $d \notin A$

$$\forall x,y \in A, x * y \notin A$$

$$x=c, y=c, c \circ c = d \notin A$$

2. Tanım: (İşlemin Değişme Özelliği):

Bir A kümesinde bir $\circ$ işlemini tanımlansın. $x \circ y$ ve $y \circ x$ tanımlı olmak üzere $\forall x, y \in A$ için $x \circ y = y \circ x$ önermesi doğru ise $\circ$ işleminin değişme (komütatif) özelliği vardır denir.

Örnek,, A kümesinin $P(A)$ kuvvet kümesinde tanımlanan $\cap$ ve $\cup$ işlemlerinin değişme özellikleri vardır.

3. Tanım: (İşlemin Birleşme Özelliği):

Bir A kümesinde bir $\circ$ işlemini tanımlansın. $(x \circ y) \circ z$ ve $x \circ (y \circ z)$ tanımlı olmak üzere $\forall x, y, z \in A$ için $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$ önermesi doğru ise $\circ$ işleminin birleşme (asosyatif) özelliği vardır denir.

Örnek,, Bir A kümesinin $P(A)$ kuvvet kümesinde tanımlı $\cap$ ve birleşim işlemlerinin birleşme özellikleri vardır.

Örnek,, $\mathbb{Z}$ tam sayılar kümesinde $\circ: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$

$$(x, y) \rightarrow x \circ y = x + y - xy$$

$\circ$ işleminin değişme ve birleşme özelliklerinin olup olmadığını araştıralım.

$$\forall x, y \in \mathbb{Z}, x \circ y = x + y - xy = y + x - yx = y \circ x \quad (\text{değişme öz. vardır.})$$

$$\forall x, y, z \in \mathbb{Z}, (x \circ y) \circ z \stackrel{?}{=} x \circ (y \circ z)$$

$$x \circ y = x + y - xy \Rightarrow (x \circ y) \circ z = (x + y - xy) \circ z$$

$$= (x + y - xy) + z - (x + y - xy)z$$

$$= x + y + z - xy - xz - yz + xyz$$

$$y \circ z = y + z - yz \Rightarrow x \circ (y \circ z) = x \circ (y + z - yz)$$

$$= x + (y + z - yz) - x(y + z - yz)$$

$$= x + y + z - xy - xz - yz + xyz$$

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z) \quad (\text{birleşme öz. vardır.})$$

4. Tanım: (Birim Eleman Özelliği):

Bir A kümesinde bir $\circ$ işlemini verilsin. $\forall x \in A$ ve $\exists e \in A$ için

$x \circ e = e \circ x = x$ önermesi doğru ise e elemanına A nın $\circ$ işlemine göre

birim (etkisiz) elemanı denir.

$\forall X \in P(A)$ ve $\exists e \in P(A)$ için $X \circ e = e \circ X = X$

$$P(A) = \{ \phi, A, \dots \}$$

$$X \cap e = e \cap X = X$$

$$X \in \mathcal{P}(A) \Rightarrow X \subseteq A \Rightarrow X \cap A = X = A \cap X$$

A'nın $P(A)$ kuvvet kümesinde U işlemi,

$$\forall X \in P(A), \exists e \in P(A) \text{ i\u00e7in } X \cup e = e \cup X \Rightarrow X = \emptyset$$

Örnek $\mathbb{Z}$ de 0 işlemi $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ için $x \circ y = x + y + 2xy$ ise $\mathbb{Z}$ nin 0 işlemine göre etkisiz elemanı varsa bulun.

$$\forall x \in \mathbb{Z} \text{ ve } \exists e \in \mathbb{Z}, x \circ e = e \circ x = x$$

$$Xoe = X \Rightarrow X + e + 2Xe = X$$

$$\Rightarrow e(1+2x) = 0 \rightarrow \begin{cases} e=0 & \text{0/ma1 dır.} \\ 1+2x=0 & \text{0/ma2.} \end{cases}$$

$$X00 = X + 0 + 2X0$$

$e \circ x \stackrel{?}{=} x$ olmalıdır. $e \circ x = 0 \circ x = 0 + x - 2 \circ x = x$

Teorem: Bir A kümesi, bu kümede tanımlanan bir $\circ$ işlemine göre kapalı olsun. Eğer A kümesinin $\circ$ işlemine göre birim elemanı varsa tektir.

İspat // Aksini kabul edelim. Birim eleman tek olmasın. e_1 ve e_2 gibi

iki birim eleman olsun. $\forall x \in A$ için $x \circ e_1 = e_1 \circ x = x$ (e_1 birim eleman)

$\forall x \in A$ için $x \circ e_2 = e_2 \circ x = x$ (e_2 " ")

$$\left. \begin{aligned} &\Rightarrow e_1 o e_2 = e_2 \quad (e_1 \text{ birim eleman olduğu için}) \\ &\Rightarrow e_1 o e_2 = e_1 \quad (e_2 \text{ " " " " }) \end{aligned} \right\} \Rightarrow e_2 = e_1$$

5. Tanım: (Ters Eleman):

A kümesinde tanımlı bir $\circ$ işlemini verilsin. A nın $\circ$ işlemine göre birim elemanı e olsun. $\forall x \in A$ için $x \circ y = y \circ x = e$ önermesi doğru olacak şekilde $\exists y \in A$ varsa bu y elemanına, x 'in $\circ$ işlemine göre ters (invers) elemanı denir. Sembol olarak x^{-1} veya $-x$ ile gösterilir.

Teorem: Bir A kümesinde tanımlı bir $\circ$ işlemi veriliyor. $\circ$ işlemine göre birim eleman e olsun. ve bu işlemin birleşme özelliğinin bulunduğu

İspat,, Aksini farzedelim. Yani x 'in y_1 ve y_2 gibi iki ters elemaninin var oldugunu kabul edelim.

$$x \circ y_1 = y_1 \circ x = e \quad (y_1 \text{ ters eleman})$$

$$x \circ y_2 = y_2 \circ x = e \quad (y_2 \text{ ters eleman})$$

$$\Rightarrow (y_1 \circ x) \circ y_2 = y_1 \circ (x \circ y_2) \Rightarrow e \circ y_2 = y_1 \circ e \Rightarrow y_2 = y_1$$

Tanım: (Dış işlem):

A ve S iki küme olsun. $S \times A$ dan A ya tanımlanan fonksiyona bir dış işlem denir.

$$f: S \times A \rightarrow A$$

$$(\alpha, x) \rightarrow f(\alpha, x) = \alpha \circ x$$

Örnek,,

$$M = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\circ: \mathbb{R} \times M \rightarrow M$$

$$\left(\lambda, \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \right) \rightarrow \lambda \circ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda c & \lambda d \end{bmatrix}$$

Tanım: (Dağılma Özelliği):

Bir A kümesinde $\circ$ ve Δ işlemleri veriliyor.

a) $x \circ (y \Delta z)$ ve $(x \circ y) \Delta (x \circ z)$ tanımlı olmak üzere $\forall x, y, z \in A$ için

$x \circ (y \Delta z) = (x \circ y) \Delta (x \circ z)$ önermesi doğru ise " $\circ$ işleminin Δ işlemi üzerine soldan dağılma özelliği vardır" denir.

b) $(x \Delta y) \circ z$ ve $(x \circ z) \Delta (y \circ z)$ tanımlı olmak üzere $\forall x, y, z \in A$ için

$(x \Delta y) \circ z = (x \circ z) \Delta (y \circ z)$ önermesi doğru ise " $\circ$ işleminin Δ işlemi üzerine sağdan dağılma özelliği vardır" denir.

c) Eğer $\circ$ işleminin Δ işlemi üzerine hem sağdan hem de soldan dağılma özelliği varsa, " $\circ$ işleminin Δ işlemi üzerine dağılma özelliği vardır" denir.

Örnek,, A kümesinin $P(A)$ kuvvet kümesinde tanımlı $\cap$ ve $\cup$ işlemlerinin birbiri üzerine dağılma özellikleri vardır.

1- $\mathbb{Z}$ 'de $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, $x \oplus y = x + y - 1$, $\odot$ işleminin özelliklerini inceleyin.

2- $x, y \in \mathbb{N}$ için $x \oplus y = x + y^2$ ve $x \Delta y = x \cdot y^2$ işlemleri tanımlanıyor.

Bu işlemlerin birbiri üzerine dağılma özellikleri var mıdır?

3- $\beta = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z} \text{ ve } 5/x - y\}$ olsun. β bağıntısının $\mathbb{Z}$ den ayırdığı denklik sınıflarının kümesi (bölüm kümesi) $\mathbb{Z}/\beta$ da,

$\forall \bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{Z}/\beta$ için $\bar{x} \oplus \bar{y} = \overline{x + y}$ ve $\bar{x} \odot \bar{y} = \overline{xy}$ olduğuna göre

$\oplus$ ve $\odot$ işlemlerinin çizelgelerini düzenleyip, özelliklerini inceleyin.

4- $\mathbb{Z}$ de tanımlı $x \oplus y = 2x + y$ işleminin özelliklerini inceleyin.

5- $\mathbb{N}$ 'de tanımlı $x * y = x^2 + y^2$ işleminin özelliklerini inceleyin.

6- $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ için $x \oplus y = x^2$, $x * y = y^2$ şeklinde tanımlanıyor.

$*$ işleminin $\odot$ işlemi üzerine dağılma özelliği var mıdır?

7- $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ olmak üzere $\forall x, y \in A$ için

$x \oplus y = x + y$ nin 5 ile bölümündeki kalan,

$x \odot y = x \cdot y$ nin 5 " " " " , işlemleri veriliyor.

a) $\oplus$ ve $\odot$ işlemlerinin çizelgelerini düzenleyerek özelliklerini inceleyin.

b) $(4 \odot y) \oplus 3 = 0$ açık önermesinin doğruluk kümesini ($\mathbb{Z}$ 'de) bulun.

8- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ve $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ve $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonlar olsunlar.

$f + g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$x \mapsto (f + g)(x) = f(x) + g(x)$ olduğuna göre

$(f + g) \circ h = (f \circ h) + (g \circ h)$ olduğunu ispat edin.

9- A kümesinde tanımlı $\odot$ işlemi veriliyor. $\odot$ işlemine göre kapalılık, birleşme,

birim eleman özelliği ve a, b elemanlarının ters elemanlarının a^{-1} ve b^{-1} olduğu bilindiğine göre

a) $(a^{-1})^{-1} = a$ b) $(a \odot b)^{-1} = b^{-1} \odot a^{-1}$ olduğunu ispatlayın.

Çözümler :

1-a) $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, $x \oplus y = x + y - 1 \in \mathbb{Z}$ kapalılık öz. vardır.

b) $x \oplus y = x + y - 1 = y + x - 1 = y \oplus x$ değişme öz. vardır.

c) $\forall x, y \in \mathbb{Z}, (xoy)oz = (x+y-1)oz = (x+y-1)+z-1 = x+y+z-2$: deę. ve birli. öz.

$yoz = y+z-1 \Rightarrow xoyoz = xoy(y+z-1) = x+(y+z-1)-1 = x+y+z-2$

$\Rightarrow \forall x, y, z \in \mathbb{Z} \quad (xoy)oz = xoyoz$ birleşme öz. vardır.

d) $\forall x \in \mathbb{Z}, xoe = eox = x \quad e \in \mathbb{Z}$

$xoe = x \Rightarrow x+e-1 = x \Rightarrow e = 1$

$eox = 1ox = 1+x-1 = x \quad e = 1 \in \mathbb{Z}$

e) $\forall x \in \mathbb{Z}, xoy = yox = e$

$\Rightarrow xoy = 1 \Rightarrow x+y-1 = 1 \Rightarrow y = 2-x$

$yox = (2-x)ox = 2-x+x-1 = 1 = e \quad x^{-1} = 2-x$ ters eleman.

2- $x, y \in \mathbb{W} \quad xoy \Delta z = (xoy) \Delta (xoz)$

$y \Delta z = yz^2 \Rightarrow xoy \Delta z = xoy(yz^2)$

$xoy \Delta z = x + (yz^2)^2 = x + y^2 z^4 //$

$\left. \begin{array}{l} xoy = x+y^2 \\ xoz = x+z^2 \end{array} \right\} \Rightarrow (xoy) \Delta (xoz)$

$= (x+y^2) \Delta (x+z^2) = (x+y^2) \cdot (x+z^2)^2$

$= (x+y^2)(x^2 + 2xz^2 + z^4)$

$(xoy) \Delta (xoz) = x^3 + 2x^2z^2 + xz^4 + x^2y^2 + 2xy^2z^2 + y^2z^4 //$

$xoy \Delta z \neq (xoy) \Delta (yoz)$

3- $\mathbb{Z}/\beta = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\} \quad \bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{Z}/\beta \quad \bar{x} \oplus \bar{y} = \overline{x+y}, \quad \bar{x} \odot \bar{y} = \overline{xy}$

$\oplus$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

$\bar{0} \oplus \bar{0} = \overline{0+0} = \bar{0}$

$\bar{1} \oplus \bar{1} = \overline{1+1} = \bar{2}$

$\forall x \in \mathbb{Z}/\beta, x \oplus e = e \oplus x = x$

$e = \bar{0} \quad \bar{1}^{-1} = \bar{4} \quad \bar{4}^{-1} = \bar{1} \quad \bar{2}^{-1} = \bar{3} \quad \bar{3}^{-1} = \bar{2}$

$\odot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

$e = \bar{1}$ kapalıdır.

Deęişme öz. vardır.

$\bar{2}^{-1} = \bar{3} \quad \bar{3}^{-1} = \bar{2} \quad \bar{4}^{-1} = \bar{1}$

0'ın denklik sınıfı yutan elemandır.

4- $x \oplus y = 2x+y$

1-) $\forall x, y \in \mathbb{Z}, x \oplus y = 2x+y \in \mathbb{Z}$ kapalıdır.

2-) $\left. \begin{array}{l} xoy = 2x+y \\ yox = 2y+x \end{array} \right\} xoy \neq yox$ deęişme özellięi yok.

3-) $\forall x, y, z \in \mathbb{Z} \quad (xoy)oz = xoyoz$

$xoy = 2x+y \Rightarrow (xoy)oz = (2x+y)oz = 2(2x+y)+z = 4x+2y+z$

$$yoz = 2y+2z \Rightarrow x_o(yoz) = 2x+(2y+2z) = 2x+2y+2z$$

$$\Rightarrow x_o(yoz) \neq (xoy)oz$$

$$4-) \forall x \in Z, xoe = eox = x \Rightarrow xoe = x \Rightarrow 2x+e = x \Rightarrow x+e = 0$$

Birim eleman yoktur. Çünkü e sabit değil. O halde ters eleman da yoktur.

$$6- \forall x, y \in Z, x_o(y * z) \stackrel{?}{=} (xoy) * (xoz)$$

$$y * z = z^2 \quad x_o(y * z) = x_o(z^2) = x^2$$

$$(xoy) = x^2 \quad (xoy) * (xoz) = (x^2) * (x^2) = (x^2)^2 = x^4$$

$$(xoz) = x^2 \quad \text{Dağılıma öz. yok.}$$

$$7- A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

a)	$\oplus$	0	1	2	3	4
	0	0	1	2	3	4
	1	1	2	3	4	0
	2	2	3	4	0	1
	3	3	4	0	1	2
	4	4	0	1	2	3

$\odot$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

$$b) (4 \odot y) \oplus 3 = 0$$

$$[(4 \odot y) \oplus 3] \oplus [-3] = 0 \oplus (-3)$$

$$[(4 \odot y) \oplus (3 \oplus 2)] = 0 \oplus 2$$

$$[(4 \odot y) \oplus 0] = 2 \Rightarrow 4^{-1} \odot (4 \odot y) = 4^{-1} \odot 2$$

$$\Rightarrow 4 \odot (4 \odot y) = 4 \odot 2 \Rightarrow (4 \odot 4) \odot y = 3$$

$$\Rightarrow 1 \odot y = 3 \Rightarrow y = 3 //$$

$$8- f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(f+g) \circ h \stackrel{?}{=} (f \circ h) + (g \circ h)$$

$$[(f+g) \circ h](x) = (f+g)(h(x))$$

$$= f(h(x)) + g(h(x))$$

$$= (f \circ h)(x) + (g \circ h)(x) = [(f \circ h) + (g \circ h)](x) \Rightarrow (f+g) \circ h = (f \circ h) + (g \circ h)$$

$$9-a) (a^{-1})^{-1} \stackrel{?}{=} a \quad xoy = yox = e \quad x^{-1} = y \Rightarrow x^{-1} \circ x = e \Rightarrow x^{-1} \text{ x'in ters elementidir.}$$

$$\Rightarrow \forall a \in A \text{ için } a^{-1} \circ a = e = a \circ a^{-1} \quad (a \text{ nin ters elementı } a^{-1} \text{ dir})$$

$$\Rightarrow (a^{-1})^{-1} \circ a^{-1} = e \Rightarrow ((a^{-1})^{-1} \circ a^{-1}) \circ a = e \circ a \Rightarrow (a^{-1})^{-1} \circ (a^{-1} \circ a) = a$$

$$\Rightarrow (a^{-1})^{-1} \circ e = a \Rightarrow (a^{-1})^{-1} = a //$$

$$b) \forall a, b \in A \text{ için,}$$

$$a \circ b \in A \Rightarrow (a \circ b)^{-1} \circ (a \circ b) = e$$

$$\Rightarrow [(a \circ b)^{-1} \circ (a \circ b)] \circ b^{-1} = e \circ b^{-1}$$

$$\Rightarrow [(a \circ b)^{-1} \circ a] \circ (b \circ b^{-1}) = b^{-1}$$

$$\Rightarrow [(a \circ b)^{-1} \circ a] \circ e = b^{-1} \Rightarrow (a \circ b)^{-1} \circ a = b^{-1}$$

$$\Rightarrow [(a \circ b)^{-1} \circ a] \circ a^{-1} = b^{-1} \circ a^{-1} \Rightarrow (a \circ b)^{-1} \circ (a \circ a^{-1}) = b^{-1} \circ a^{-1}$$

$$\Rightarrow (a \circ b)^{-1} \circ e = b^{-1} \circ a^{-1} \Rightarrow (a \circ b)^{-1} = b^{-1} \circ a^{-1} //$$

MATEMATİK YAPI :

Tanım: Bir küme ve bu kümede tanımlı işlem ve bağıntılara birlikte (olarak)

bir matematik yapı (matematik sistem) denir.

A kümesinde tanımlanan $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, bağıntıları ve $0, \Delta, \dots$, işlemleri verilsin. $(A, \alpha, \beta, \gamma, \dots, 0, \Delta, \dots)$ şeklinde gösterilir.

Örnek,, 1) A kümesinde bir 0 işlemi tanımlanıyor.

$(A, 0)$ matematik yapısı bir işlenli matematik yapıdır.

2) A kümesinde $0, \equiv$ işlemleri tanımlanıyor.

$(A, 0, \equiv)$ matematik yapısı iki işlenli matematik yapıdır.

A kümesinin $P(A)$ kuvvet kümesinde tanımlanan $\cup, \cap, \subseteq$ bağıntıları tanımlıdır.

$(P(A), \cup, \cap, \subseteq)$ üç bağıntılı matematik yapıdır.

Tanım: (Yarı Grup):

Bir G kümesi ve bu kümede tanımlı bir 0 işlemi verilsin. Eğer,

1- $\forall x, y \in G$ için $xoy \in G$ (kapalılık özelliği)

2- $\forall x, y, z \in G$ için $(xoy)oz = xo(yoz)$ (birleşme özelliği)

varsa, $(G, 0)$ matematik yapısına yarı grup denir. (G kümesi 0 işlemine göre yarı gruptur)

Tanım: (Grup):

$(G, 0)$ matematik yapısı veriliyor. Eğer,

G₁, 1- G kümesi 0 işlemine göre kapalıdır. $\forall x, y \in G, xoy \in G$

G₂, 2- 0 işleminin birleşme özelliği vardır. $\forall x, y, z \in G, (xoy)oz = xo(yoz)$

G₃, 3- " birim eleman " " $\forall x \in G, xoe = eox = x$

G₄, 4- 0 işlemine göre ters eleman özelliği vardır. $\forall x \in G \wedge \exists y \in G, xoy = yox = e$

doğru ise $(G, 0)$ matematik yapısı bir gruptur. (G kümesi 0 işlemine göre bir gruptur.)

Örnek,, Q^+ $\forall x, y \in Q^+, xoy = \frac{xy}{3}$

$(Q^+, 0)$ bir gruptur.

$$1- \forall x, y \in Q^+, xoy = \frac{xy}{3} \in Q^+$$

$$2- \forall x, y, z \in Q^+, xoy = \frac{xy}{3} \Rightarrow$$

$$(xoy)oz = \frac{xy}{3}oz = \frac{xy}{3}z = \frac{xyz}{9}$$

$$yoz = \frac{yz}{3} \Rightarrow x(yoz) = \frac{x \cdot \frac{yz}{3}}{3} = \frac{xyz}{9} \quad \left. \vphantom{\frac{xyz}{9}} \right] (xoy)oz = x(yoz)$$

$$3- \forall x \in Q^+, \exists e \in Q^+, xoe = eox = x$$

$$\Rightarrow xoe = x \Rightarrow \frac{xe}{3} = x \Rightarrow e = 3$$

$$\Rightarrow eox = 3ox = \frac{3x}{3} = x \Rightarrow e = 3 \text{ birim elementidir.}$$

$$4- \forall x \in Q^+, \exists y \in Q^+, xoy = yox = e$$

$$\Rightarrow xoy = e \Rightarrow \frac{xy}{3} = 3 \Rightarrow y = \frac{9}{x} = x^{-1} \text{ ters elementidir.}$$

(Q^+, o) yapısı bir Abel grubudur.

Tanım: (G, o) bir grup olsun. o işleminin değişme özelliği varsa, (G, o) matematik yapısına değişmeli grup (Abel grubu - komütatif grup) denir.

Örnek, (Q^+, o) Abel grubudur.

$$\forall x, y \in Q^+, xoy = \frac{xy}{3} = \frac{yx}{3} = yox \text{ (değişme öz.)}$$

Teorem: (G, o) bir grup olsun.

1- G 'nin o işlemine göre bir tek birim elemanı vardır.

2- " her bir elemanın o işlemine göre bir tek ters elemanı vardır.

Teorem: Herhangi bir grupta grup işleminin sadeleştirme özelliği vardır.

1- (G, o) grup olsun.

$$x, y, z \in G \text{ için } xoz = yoz \Rightarrow x = y \text{ (soldan sadeleştirme)}$$

$$2- x, y, z \in G \text{ için } zox = zoy \Rightarrow x = y \text{ (sağdan sadeleştirme: öz.)}$$

İspat 1, $x, y, z \in G$ için $xoz = yoz$

$$\Rightarrow (xoz)oz^{-1} = (yoz)oz^{-1}$$

$$\Rightarrow x(zoz^{-1}) = y(zoz^{-1})$$

$$\Rightarrow xoe = yoe$$

$$\Rightarrow x = y$$

Teorem: $(G, \circ)$ bir grup olsun.

$a, b \in G$ olmak üzere $a \circ x = b$ denkleminin G 'de bir ve yalnız bir tek çözümü vardır.

İspat, $a \circ x = b \Rightarrow a^{-1} \circ (a \circ x) = a^{-1} \circ b$

$$\Rightarrow (a^{-1} \circ a) \circ x = a^{-1} \circ b \quad (\text{birleşme öz.})$$

$$\Rightarrow e \circ x = a^{-1} \circ b \quad (\text{ters eleman öz.})$$

$$\Rightarrow x = a^{-1} \circ b$$

Teorem: $(G, \circ)$ bir grup olsun.

1- $\forall a \in G, (a^{-1})^{-1} = a$

2- $\forall a, b \in G, (a \circ b)^{-1} = b^{-1} \circ a^{-1}$

Tanım: $(G, \circ)$ ve (H, Δ) iki grup ve $f: G \rightarrow H$ bir fonksiyon olsun.

a) $\forall x, y \in G, f(x \circ y) = f(x) \Delta f(y)$

ise f 'ye $(G, \circ)$ grubundan (H, Δ) grubuna bir grup homomorfizmi denir.

b) f ayrıca birebir ve örten ise grup homomorfizmine grup izomorfizmi denir.

c) $G = H$ ise grup izomorfizmine grup otomorfizmi denir.

$(G, \circ)$ ile (H, Δ) arasında bir grup izomorfizmi varsa bu gruplara izomorf gruplar denir. izomorf gruplardan birinde doğru olan bir önerme diğlerinde de doğrudur.

Tanım: (Sonlu Grup - Sonsuz Grup):

$(G, \circ)$ bir grup olsun. G kümesi sonlu ise gruba sonlu grup, sonsuz ise sonsuz grup denir.

Problemler:

1- $A = \{a\}$ $a \circ a = a$ ise $(A, \circ)$ yapısının Abel grubu olduğunu gösterin.

2- $(G, \circ)$ bir sonlu grup ise $\circ$ işleminin çizelgesinde her bir sırada G 'nin her bir elemanının bir ve yalnız bir kez bulunabileceğini gösterin.

3- $(G, \circ)$ değişmeli olmayan bir grup olmak üzere,

a) $a, b, c \in G, x \circ a \circ b = c \circ b$

b) $a \circ x \circ b = b \circ c$ denklemlerinin G 'deki çözümlerini bulun.

- 4- $A = \{x : x \in \mathbb{R} \wedge |x| < 1\}$ olsun. $\forall x, y \in A$ için $x \circ y = \frac{x+y}{1+y}$ ise $(A, \circ)$ yapısının bir abel grubu olduğunu gösterin.
- 5- $(G, \circ)$ ve (H, Δ) iki grup olsun. $\forall (x, y), (u, v) \in G \times H$ için $(x, y) \boxplus (u, v) = (x \circ u, y \Delta v)$ ise $(G \times H, \boxplus)$ yapısında bir grup olduğunu ispatlayın.
- 6- $(G, \circ)$ ve (H, Δ) iki grup ve $f: G \rightarrow H$ bir grup homomorfizmi olsun.
- a) G nin $\circ$ işlemine göre birim elemanı e_1 ve H 'nin Δ " " " " e_2 ise $f(e_1) = e_2$
- b) $\forall x \in G$ için $f(x^{-1}) = [f(x)]^{-1}$ olduğunu ispat edin.
- 7- $\mathbb{R}^+$, de $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $f(x) = e^x$ olsun. f nin $(\mathbb{R}, +)$ grubundan $(\mathbb{R}^+, \cdot)$ grubuna bir grup izomorfizmi olduğunu gösterin.
- 8- $G = \left\{ \frac{1+2m}{1+2n} : m, n \in \mathbb{Z} \right\}$ kümesinin $\mathbb{Q}$ daki çarpma işlemine göre bir grup olduğunu ispat edin.

Gözümler :

1- $A = \{a\}$ $a \circ a = a$

kapalılık var. $(a \circ a) \circ a = a \circ (a \circ a) = a$ $a \circ a = a \circ a = a$

birleşme var. birim eleman a dır.

$a^{-1} = ?$ $\forall x \in A, \exists y \in A \Rightarrow x \circ y = y \circ x = e$

$x = a$ $a \circ y = a$ $y = a^{-1} = a$ $(G, \circ)$ gruptur.

$a \circ a = a \circ a$ bir abel grubudur.

2-

	a	b	e	f
a	b	b		
b		a		
d			c	c

Aksini farzedelim. Yani $c \in G$ bir yatay sırada iki kez bulunsun.

$d \circ e = c \wedge d \circ f = c$

$\Rightarrow d \circ e = d \circ f$

$\Rightarrow e = f$ (grup işl. sadet. öz.)

$$6/a) e_1 \circ e_1 = e_1 \Rightarrow f(e_1 \circ e_1) = f(e_1)$$

$$\Rightarrow f(e_1) \Delta f(e_1) = f(e_1)$$

$$\Rightarrow [-f(e_1)] \Delta [f(e_1) \Delta f(e_1)] = [-f(e_1)] \Delta f(e_1)$$

$$\Rightarrow [-f(e_1) \Delta f(e_1)] \Delta f(e_1) = e_2$$

$$\Rightarrow e_2 \Delta f(e_1) = e_2$$

$$\Rightarrow f(e_1) = e_2$$

$$b) \forall x \in G, f(x^{-1}) = [f(x)]^{-1}$$

$$\forall x \in G, x \circ x^{-1} = e_1 \Rightarrow f(x \circ x^{-1}) = f(e_1)$$

$$\Rightarrow f(x) \Delta f(x^{-1}) = e_2$$

$$\Rightarrow [f(x)]^{-1} \Delta [f(x) \Delta f(x^{-1})] = [f(x)]^{-1} \Delta e_2$$

$$\Rightarrow [f(x)]^{-1} \Delta f(x) \Delta f(x^{-1}) = [f(x)]^{-1}$$

$$\Rightarrow e_2 \Delta f(x^{-1}) = [f(x)]^{-1}$$

$$\Rightarrow f(x^{-1}) = [f(x)]^{-1}$$

$$7- f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \quad f(x) = e^x \quad (\mathbb{R}, +), (\mathbb{R}^+, \cdot)$$

$$1- (\mathbb{R}, +) \text{ ve } (\mathbb{R}^+, \cdot) \text{ bir gruptur. (ödev)}$$

$$2- \forall x, y \in \mathbb{R}, f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$$

$$f(x+y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = f(x) \cdot f(y)$$

$$3- \forall x, y \in \mathbb{R}, f(x) = f(y) \Rightarrow e^x = e^y$$

$$\Rightarrow x = y \Rightarrow f: 1:1 \text{ dir.}$$

$$4- \forall y \in \mathbb{R}^+, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) = y$$

$$\Rightarrow e^x = y \quad x = \ln y \in \mathbb{R}, f \text{ örtendir.}$$

Tanım: (Alt Grup)

$(G, \circ)$ bir grup ve $H \subseteq G, H \neq \emptyset$ olsun. Eğer $(H, \circ)$ yapısı da bir grup ise bu gruba $(G, \circ)$ grubunun bir alt grubu denir.

Örnek, $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +)$ grubunun bir alt grubudur.

Ödev, $\{G, \circ\}$ bir grup olsun. e, G 'nin $\circ$ işlemine göre bir, birim elemanı olsun.

Buna göre $(\{e\}, \circ)$ yapısının bir abel grubu olduğunu ispat edin.

$(\{e\}, \circ)$ grubuna $(G, \circ)$ grubunun basit alt grubu denir.

Tanım: Bir grubun basit alt grubundan farklı bir alt grubu varsa, bu 97
alt gruba has (öz) alt grup denir.

Teorem: Bir alt grupta etkisiz (birim) eleman ve ters eleman gruptaki gibidir.

Teorem: $(G, \circ)$ bir grup ve H kümesi de G 'nin boş olmayan bir alt kümesi olsun. $(H, \circ)$ bir alt gruptur $\Leftrightarrow$

$$(\forall x, y \in H, x \circ y^{-1} \in H)$$

İspat, 1) $\Rightarrow$ (gerek şart): $(H, \circ)$ bir alt grup $\Rightarrow (H, \circ)$ yapısı bir gruptur.

$$\Rightarrow \forall x, y \in H, x \circ y^{-1} \in H$$

2) $\Leftarrow$ (yeter şart): $\forall x, y \in H, x \circ y^{-1} \in H$ olsun.

a) $x=y$ alalım. $x \circ y^{-1} = x \circ x^{-1} = e \in H$ (birim eleman öz.)

b) $x=e$ alalım. $e \circ y^{-1} = y^{-1} \in H$ (ters eleman öz.)

c) birleşme özelliği vardır.

d) $\forall x, y \in H, x, y^{-1} \in H$ (ters el. öz.)

$$\Rightarrow x, (y^{-1})^{-1} \in H$$

$$\Rightarrow x \circ (y^{-1})^{-1} \in H \Rightarrow x \circ y \in H \text{ (kapalılık öz.)}$$

$\Rightarrow (H, \circ)$ bir gruptur. $(G, \circ)$ bir alt gruptur.

Problemler:

1- Her grubun en az bir alt grubu var mıdır?

2- $(G, \circ)$ grubunun iki alt grubu $(H_1, \circ)$ ve $(H_2, \circ)$ olsun.

$(H_1 \cap H_2, \circ)$ yapısının da bir alt grubu olduğunu ispat edin.

3- $(G, \circ)$ bir grup, $(H, \circ)$ bir alt grup olsun. $XHX^{-1} = \{X \circ h \circ X^{-1} : X \in G \text{ ve } h \in H\}$
ise (XHX^{-1}) işlem yapısının da bir alt grubu olduğunu ispat edin.

Çözümler:

1- Kendisinden farklı en az bir basit alt grubu vardır.

2- a) $H_1 \cap H_2 \neq \emptyset$ (e birim elemanı ortaktır)

$$b) \forall x, y \in H_1 \cap H_2 \Rightarrow (x, y \in H_1) \wedge (x, y \in H_2)$$

$$\Rightarrow (x \circ y^{-1} \in H_1) \wedge (x \circ y^{-1} \in H_2) \quad (H_1 \text{ bir alt gruptur.})$$

$$\Rightarrow x \circ y^{-1} \in H_1 \cap H_2 \text{ (kes. tar.)}$$

$(H_1 \cap H_2, \circ)$ bir alt gruptur. (Teoremden)

$$3- \forall a, b \in XHX^{-1} \Rightarrow (a = Xoh_1oX^{-1}, X \in G \wedge h_1 \in H) \wedge (b = Xoh_2oX^{-1}, X \in G, h_2 \in H)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow aob^{-1} &= [Xoh_1oX^{-1}]o[Xoh_2oX^{-1}]^{-1} \\ &= [Xoh_1oX^{-1}]o[(X^{-1})^{-1}o(Xoh_2)^{-1}] \\ &= [Xoh_1oX^{-1}]o[Xoh_2^{-1}oX^{-1}] \\ &= [Xoh_1]o(X^{-1}oX)o(h_2^{-1}oX^{-1}) \\ &= (Xoh_1)o \circ (h_2^{-1}oX^{-1}) \\ &= Xo(h_1oh_2^{-1})oX^{-1} \end{aligned}$$

$$aob^{-1} = Xo(h_1oh_2^{-1})oX^{-1}, X \in G \wedge h_1oh_2^{-1} \in H$$

$$\Rightarrow aob^{-1} \in XHX^{-1} \Rightarrow (XHX^{-1}, \circ) \text{ normal alt gruptur.}$$

- HALKA -

H boş olmayan bir küme olsun. ve bu kümede toplama ve çarpma diye adlandırılan iki $(+)$ ve $(\cdot)$ işlemleri tanımlansın. Eğer,

H₁) $(H, +)$ bir abel grubudur

H₂) H kümesi $(\cdot)$ işlemine göre kapalıdır.

H₃) H kümesinde $(\cdot)$ işleminin birleşme özelliği vardır.

H₄) $(\cdot)$ işleminin $(+)$ işlemine göre dğılma özelliği vardır.

Önergeleri doğru ise $(H, +, \cdot)$ yapısı bir halkadır denir.

Örnek, $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ tamsayılar halkasıdır.

Tanım: $(H, +, \cdot)$ bir halka olsun. H kümesinin $(+)$ işlemine göre birim elemanına halkanın sıfırı denir. ve 0 veya e ile gösterilir.

Tanım: Halkanın $(+)$ işlemine göre bir X elemanının ters elemanı $-X$ sembolü ile gösterilir.

Teorem: $(H, +, \cdot)$ bir halka olsun. Halkanın sıfırı 0 olmak üzere $\forall X \in H$ için

$$X \cdot 0 = 0 \cdot X = 0 \text{ dir.}$$

İspat, $\forall X \in H, 0 + 0 = 0 \Rightarrow X \cdot (0 + 0) = X \cdot 0$ (her iki tarafı X ile çarparak)

$$\Rightarrow X0 + X0 = X0 \quad ((\cdot)'nin (+)' üzerine dğı. öz.)$$

$$= (-X \cdot 0) + (X0 + X0) = (-X \cdot 0) + (X \cdot 0)$$

$$\Rightarrow [(-X \cdot 0) + X \cdot 0] + X \cdot 0 = 0 \Rightarrow 0 + X \cdot 0 = 0 \Rightarrow \underline{X \cdot 0 = 0}$$

Teorem: $(H, +, \cdot)$ bir halka olsun.

1- $\forall x \in H, -(-x) = x$

2- $\forall x, y \in H, -(x+y) = (-x) + (-y)$

3- $\forall x, y \in H, x \cdot (-y) = (-x) \cdot y = -(x \cdot y)$

4- $\forall x, y \in H, (-x) \cdot (-y) = xy$

İspat// 1- $\forall x \in H, (-x) + x = 0$

$$\Rightarrow [-(-x)] + (-x) = 0$$

$$\Rightarrow -x + x = 0 \wedge (-x) + (-(-x)) = 0$$

$$\Rightarrow -(-x) = x$$

2- $\forall x, y \in H, (-x) + (x) = 0 \wedge (-y) + y = 0$

$$\Rightarrow [(-x) + x] + [(-y) + y] = 0 + 0$$

$$\Rightarrow (-x) + [x + (-y)] + y = 0$$

$$\Rightarrow [(-x) + (-y)] + (x+y) = 0$$

$$\Rightarrow -(x+y) = (-x) + (-y)$$

3- $\forall x, y \in H, y + (-y) = 0$

$$\Rightarrow x \cdot [y + (-y)] = x \cdot 0$$

$$\Rightarrow xy + x(-y) = 0$$

$$\Rightarrow -(xy) = x(-y) = (-x)y$$

4- $\forall x, y \in H, -(-xy) = (-x)(-y)$

$$= x[-(-y)] = [-(-x)] = (-x)(-y)$$

$$(-x)(-y) = xy$$

Tanım: $(H, +, \cdot)$ bir halka olsun.

1- $(\cdot)$ işlenine göre birim eleman varsa halkaya birim elemanlı halka denir.

2- $(\cdot)$ " " değişme (komütatif) özelliği varsa, halkaya değişmeli

(komütatif) halka denir.

3- $(\cdot)$ işlenine göre hem birim eleman hem de değişme özelliği varsa

halkaya birim elemanlı değişmeli halka denir.

4- $(\cdot)$ işlenine göre bir $x \in H$ nin tersi varsa x^{-1} ile gösterilir.

Tanım: $(H, +, \cdot)$ bir halka olsun.

1- Halkanın sıfırı 0 olmak üzere,

$(\exists a, b \in H, a \neq 0 \wedge b \neq 0 \wedge a \cdot b = 0)$ önermesi doğru ise a 'ya sıfırın sol böleni, b 'ye sıfırın sağ böleni denir.

2- Bir a elemanı sıfırın hem sağ hem de sol böleni ise bu a elemanına sıfırın bir böleni denir.

3- Değişmeli ve birimli bir halkada sıfırın bölenleri yoksa, halkaya tanılk bölgesi denir.

H 'nin tanılk bölgesi olması için :

$$[\forall x, y \in H, x \cdot y = 0 \Leftrightarrow (x = 0 \vee y = 0)]$$

Tanım: $(H, +, \cdot)$ ve $(T, \oplus, \odot)$ iki halka olsunlar. ve $f: H \rightarrow T$ bir fonksiyon olsun.

1- $\forall x, y \in H, f(x+y) = f(x) \oplus f(y)$ ve $f(x \cdot y) = f(x) \odot f(y)$

özellikleri sağlanıyorsa, f 'ye halka homomorfizmi denir.

2- f birebir ve örten ise halka homomorfizmine, halka izomorfizmi denir.

3- $H = T$ ise halka izomorfizmine halka otomorfizmi denir.

Problemler :

1- $x, y \in \mathbb{Z}, x \circ y = x + y - 1$ $x * y = x + y - xy$ ise $(\mathbb{Z}, 0, *)$ yapısının bir halka olup olmadığını araştırın.

2- $(A, +)$ yapısı değişmeli bir grup olsun. $\forall x, y \in A$ için $x \circ y = x$ olduğuna göre, $(A, +, \circ)$ yapısı bir halka mıdır?

3- $H = \{x: x = a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Z}\}$ olduğuna göre $\mathbb{R}$ 'de tanımlı $(+)$ ve $(\cdot)$ işlenlerine göre $(H, +, \cdot)$ yapısı bir halka mıdır?

4- $(H, +, \cdot)$ değişmeli bir halka olsun. $\forall x, y \in H$ için $x \circ y = x \cdot y + y \cdot x$ ise $(H, +, \circ)$ yapısının da değişmeli halka olduğunu ispat edin?

5- $(x, y), (u, v) \in \mathbb{Z}^2 = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ olmak üzere $(x, y) \circ (u, v) = (x + u, y + v)$ ve $(x, y) * (u, v) = (xu - yv, xv + yu)$ ise $(\mathbb{Z}^2, 0, *)$ yapısının bir halka olduğunu gösterin.

6- $H = \{A : A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$ olduğuna göre matrisler kümesinde tanımlanan $(+)$ ve $(\cdot)$ işlemlerine göre $(H, +, \cdot)$ yapısının bir halka olduğunu ispat edin. Matrisler halkasının bir birlik bölgesi olmadığını ispatlayın.

7- $(H_1, +, \cdot), (H_2, +, \cdot), (H_3, +, \cdot)$ üç halka olsun. Eğer $f: H_1 \rightarrow H_2$ ve $g: H_2 \rightarrow H_3$ halka homomorfizmi iseler $g \circ f: H_1 \rightarrow H_3$ 'de halka homomorfizmi midir?
 (izo) (izo)

Çözümler :

1- $(\mathbb{Z}, +)$ bir abel grubudur ?

$$x, y \in \mathbb{Z} \quad x + y = x + y - 1$$

• $x, y \in \mathbb{Z}, x + y \in \mathbb{Z}$ kapalılık öz. vardır.

$$\begin{aligned} \bullet \forall x, y, z \in \mathbb{Z}, (x + y) + z &= (x + y - 1) + z \\ &= (x + y - 1) + z - 1 = x + y + z - 2 \end{aligned}$$

$$x + (y + z) = x + y + z - 2$$

$$\Rightarrow (x + y) + z = x + (y + z) \text{ değişme öz. vardır.}$$

• $\forall x \in \mathbb{Z}, x + e = e + x = x \quad e = 1 \in \mathbb{Z}$ birim eleman.

• $\forall x \in \mathbb{Z}, x + y = y + x = e = 1 \quad y = -x$

$$x + y = 1 \Rightarrow x + y - 1 = 1 \Rightarrow y = \underline{2 - x} = -x \text{ ters eleman.}$$

• $\forall x, y \in \mathbb{Z}, x + y = y + x$

H₂) $\forall x, y \in \mathbb{Z}, x * y = x + y - xy \in \mathbb{Z}$ kapalılık öz. vardır.

H₃) $\forall x, y, z \in \mathbb{Z}, (x * y) * z = (x + y - xy) * z$

$$= (x + y - xy) + z - (x + y - xy) \cdot z$$

$$= x + y + z - xy - xz - yz + xyz$$

$$x * (y * z) = x * (y + z - yz)$$

$$= x + (y + z - yz) - x(y + z - yz)$$

$$= x + y + z - xy - xz - yz + xyz$$

$$(x * y) * z = x * (y * z) \text{ (birl. öz. vardır)}$$

H₄) $\forall x, y, z \in H, x * (y + z) \stackrel{?}{=} (x * y) + (x * z)$

$$(x + y) * z \stackrel{?}{=} (x + z) + (y * z)$$

$$6- H = \{A: A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, a, b, c, d \in \mathbb{R}\} \quad (H, +, \cdot)$$

$H_1)$ $(H, +)$ bir abel grubudur.

$$1) A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \Rightarrow A+B = \begin{pmatrix} a+a_1 & b+b_1 \\ c+c_1 & d+d_1 \end{pmatrix} \in H$$

$$2) A+B = B+A$$

$$3) (A+B)+C = A+(B+C)$$

$$4) e=? \quad \forall A \in H \wedge \exists e \in H \quad e+A = A+e = A$$

$$e = 0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in H$$

$$5) -A = \begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix}$$

$$H_2) \quad \forall A, B \in H, \quad A \cdot B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa_1+bc_1 & ab_1+bd_1 \\ ca_1+dc_1 & cb_1+dd_1 \end{pmatrix} \in H$$

$$H_3) \quad \forall A, B, C \in H, \quad (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$

$$H_4) \quad \forall A, B, C \in H, \quad A(B+C) = AB+AC, \quad (A+B)C = AC+BC$$

$$\forall A \in H, \quad \exists e \in H, \quad A \cdot e = e \cdot A = 1$$

7- $(H_1, +, \cdot), (H_2, +, \cdot), (H_3, +, \cdot)$ üç halka,

$f: H_1 \rightarrow H_2 \quad g: H_2 \rightarrow H_3$ halka izomorfizmi iseler

$g \circ f: H_1 \rightarrow H_3$ de halka izomorfizmidir ?

ispat 1// $\forall x, y \in H_1 \quad (g \circ f)(x+y) = g[f(x+y)]$ bileşke tanımı

$$= g[f(x)+f(y)]$$

$$= g(f(x)) + g(f(y))$$

$$= (g \circ f)(x) + (g \circ f)(y)$$

iki özellikten.
gof bir halka
homomorfizmidir.

2// $(g \circ f)(x \cdot y) = g[f(x \cdot y)]$ bileşke tanımı

$$= g[f(x) \cdot f(y)] \quad f \text{ halka izom. old. için}$$

$$= g(f(x)) \cdot g(f(y)) \quad g \quad " \quad " \quad "$$

$$= (g \circ f)(x) \cdot (g \circ f)(y) \quad \text{bileşke tanımı}$$

3// gof, 1:1 ve örtendir. gof bir halka izomorfizmidir.

Tanım: (Cisim)

Birimli ve değişimli bir $(F, +, \cdot)$ halkasında halkanın sıfırı hariç

F'nin her elemanının çarpma işlemine göre tersi varsa halkaya cisim denir.

Buna göre $(F, +, \cdot)$ yapısının cisim olabilmesi için :

C₁) $(F, +)$ Abel grubu olmalıdır.

C₂) $(F \setminus \{0\}, \cdot)$ Abel grubudur.

C₃) $\cdot$ işleminin $+$ işlemi üzerine dağılma özelliği vardır.

Örnek // $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ yapısı bir cisimdir. Bu cisme rasyonel sayılar cismi denir.

$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ " " " " " " reel " " " " .

Tanım: (Vektör Uzayı) :

$(V, \oplus)$ yapısı bir abel grubu, $(F, +, \cdot)$ yapısı bir cisim olsun.

$$\begin{aligned} \odot : F \times V &\rightarrow V \\ (a, \alpha) &\rightarrow (a \odot \alpha) \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} \odot : F \times V &\rightarrow V \\ (a, \alpha) &\rightarrow (a \odot \alpha) \end{aligned}} \right\} \text{Dış işlemi veriliyor.}$$

$$\begin{aligned} \oplus : V \times V &\rightarrow V \\ (x, y) &\rightarrow (x \oplus y) \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} \oplus : V \times V &\rightarrow V \\ (x, y) &\rightarrow (x \oplus y) \end{aligned}} \right\} \text{İç işlem}$$

Eğer,

$$V_1) \forall a \in F \wedge \forall \alpha \in V, a \odot \alpha \in V \quad (\text{kapalılık})$$

$$V_2) \forall a \in F \wedge \forall \alpha, \beta \in V, a \odot (\alpha \oplus \beta) = (a \odot \alpha) \oplus (a \odot \beta) \quad (\text{soldan dağılma})$$

$$V_3) \forall a, b \in F \wedge \forall \alpha \in V, (a+b) \odot \alpha = (a \odot \alpha) \oplus (b \odot \alpha) \quad (\text{sağdan dağılma})$$

$$V_4) \forall a, b \in F \wedge \forall \alpha \in V, (a \cdot b) \odot \alpha = a \odot (b \odot \alpha) = b \odot (a \odot \alpha) \quad (\text{birleşme})$$

$$V_5) \forall \alpha \in V \wedge 1 \in F, 1 \odot \alpha = \alpha \quad (\text{birim elemanı})$$

önergeleri doğru ise $(V, \oplus)$ yapısı $(F, +, \cdot)$ cismi üzerinde bir vektör uzayıdır denir.

$$[(V, \oplus), (F, +, \cdot), \odot] \text{ yapısı bir vektör uzayıdır.}]$$

Tanım: (Cebir) :

$((V, \oplus), (F, +, \cdot), \odot)$ bir vektör uzayı olsun. V kümesinde,

$$\otimes : V \times V \rightarrow V$$

$(u, v) \rightarrow (u \otimes v)$ işlemi aşağıdaki özellikleri sağlıyorsa V kümesi

$(F, +, \cdot)$ cismi üzerinde bir cebirdir denir.

$$C_{e1}) \forall a \in F \wedge \forall u, v \in V, (a \odot u) \otimes v = a \odot (u \otimes v)$$

$$ce_2) \forall u, v, w \in V, (u \otimes v) \otimes w = u \otimes (v \otimes w)$$

$$ce_3) \forall u, v, w \in V, u \otimes (v \oplus w) = u$$

$(V, \oplus) (F, +, \cdot), \otimes, \otimes)$ yapısı bir cebirdir.

Doğal Sayılar :

Teorem : Bir kümeler ailesinde tanımlanan "eşit güçlü", dmsa bağıntısı bir denklik bağıntısıdır.

İspat // A kümeler ailesi verilsin. β A da bir bağıntı ; eşit güçlü dmsa bağıntısı

$A, B \in \mathcal{A}$ $(A, B) \in \beta \Rightarrow A$ kümesi B kümesi ile eşit güçlüdür.

1- $\forall A \in \mathcal{A}, I_A: A \xrightarrow{1:1} A$

$x \longrightarrow I_A(x) = x \Rightarrow (A, A) \in \beta$ (yansıma)

2- $A, B \in \mathcal{A}, (A, B) \in \beta \Rightarrow \exists f, f: A \xrightarrow{1:1} B \Rightarrow (B, A) \in \beta$ (simetriktir.)

3- $A, B, C \in \mathcal{A}, [(A, B) \in \beta \wedge (B, C) \in \beta] \Rightarrow$

$\Rightarrow [(\exists f, f: A \xrightarrow{1:1} B) \wedge (\exists g, g: B \xrightarrow{1:1} C)]$

$\Rightarrow (g \circ f: A \xrightarrow{1:1} C) \Rightarrow (A, C) \in \beta$ (geçişme özelliği)

Problemler :

1- $A = \{a, b\}$ $B = \{x, y, z\}$ olsun. B kümesinin A kümesine eşit güçlü olan tüm alt kümelerini bulun.

2- A boş olmayan bir küme olsun. A ile $A \times \{a\}$ kümesinin eşit güçlü olduğunu ispat edin.

3- A, B, C, D kümeler olsun. $A \cap C = \emptyset$ ve $B \cap D = \emptyset$ olmak üzere $A \cup B$ ve $C \cup D$ ise $(A \cup C) \cup (B \cup D)$ olduğunu ispat edin.

4- A, B, C, D kümeler olsun. $A \cup B \cap C \cup D$ ise $(A \cup C) \cup (B \cup D)$ olduğunu ispat edin.

Çözümler :

1- $\{x, y\}, \{y, z\}, \{x, z\}$

2- $f: A \xrightarrow{1:1} B$

$x \longrightarrow f(x) = (x, a)$

i) $\forall x_1, x_2 \in A, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

$\forall x_1, x_2 \in A, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow (x_1, a) = (x_2, a) \Rightarrow x_1 = x_2$ dir.

$\Rightarrow f, 1:1$ dir.

21) $\forall y \in A \times \{a\} \Rightarrow (x_1, a) \in A \times \{a\}$ $f(x)=y, x \in A$ f , örtendir.

$$3- (A \cap C) = \emptyset \wedge B \cap D = \emptyset, (A \cup B \cap C \cup D) \Rightarrow [(A \cup C) \cup (B \cup D)]$$

$$(A \cup B \cap C \cup D) \Rightarrow \left[\left(\exists f : A \xrightarrow{1:1} B \right) \wedge \left(\exists g : C \xrightarrow{1:1} D \right) \right]$$

$$x \xrightarrow{\text{örten}} f(x) \quad x \xrightarrow{\text{örten}} g(x)$$

$$F : A \cup C \xrightarrow{1:1} B \cup D$$

$$x \xrightarrow{\text{örten}} F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A \text{ ise} \\ g(x), & x \in C \text{ ise} \end{cases}$$

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \xrightarrow{\text{örten}} f(x) = \begin{cases} 2x, & x > -1 \\ x^2, & x \leq -1 \end{cases} = \begin{cases} 2x, & x \in (-1, \infty) \\ x^2, & x \in (-\infty, -1] \end{cases}$$

$$4- (A \cup B \cap C \cup D) \Rightarrow \left[\left(\exists f : A \xrightarrow{1:1} B \right) \wedge \left(\exists g : C \xrightarrow{1:1} D \right) \right]$$

$$(A \times C) \cup (B \times D) \quad x \xrightarrow{\text{örten}} f(x) \quad x \xrightarrow{\text{örten}} g(x)$$

$$F : A \times C \rightarrow B \times D$$

$$(x, y) \xrightarrow{\text{örten}} F(x, y)$$

$$i) \forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in A \times C, F(x_1, y_1) = F(x_2, y_2)$$

$$\Rightarrow (f(x_1), g(y_1)) = (f(x_2), g(y_2))$$

$$\Rightarrow [f(x_1) = f(x_2) \wedge g(y_1) = g(y_2)] \quad (\text{sıralı ikili eşitliği tanımından})$$

$$\Rightarrow (x_1 = x_2 \wedge y_1 = y_2) \quad f, g \text{ 1:1 dir.}$$

$$\Rightarrow (x_1, y_1) = (x_2, y_2) \quad \text{ikililerin eşitliğinden.}$$

$$\Rightarrow F \text{ 1:1 dir.}$$

$$ii) (F \text{ örtendir ?})$$

Tanım : (sonlu küme, sonsuz küme)

En az bir öz alt kümesine eşit güçlü olan kümeye sonsuz küme denir.

Sonsuz olmayan kümeye de sonlu küme denir.

$$f : A \xrightarrow{1:1} A_1 \subset A \quad A \text{ sonsuz kümedir.}$$

$$f : A \xrightarrow{1:1} A$$

Örnek // Bir $\overline{AB}$ doğru parçasının belirttiği (bu doğru parçası üzerindeki noktaların) kümesi sonsuz kümedir.



İspat // $C \in \overline{AB} \wedge D \notin \overline{AB}$

$$f: \overline{AB} \longrightarrow \overline{AD}$$

$$X \longrightarrow f(X) = Y, \overline{XY} \parallel BD$$

$$\forall X_1, X_2 \in \overline{AB}, X_1 \neq X_2 \Rightarrow f(X_1) \neq f(X_2)$$

$$\Rightarrow Y_1 \neq Y_2 \quad 1:1 \text{ dir. ve örtendir.}$$




$$g: \overline{AD} \longrightarrow \overline{AC}$$

$$Y \longrightarrow g(Y) = Z, \overline{YZ} \parallel \overline{CD}$$

$$g \circ f: \overline{AB} \longrightarrow \overline{CD}$$

$$X \longrightarrow (g \circ f)(X) = Z \quad \overline{CD} \subset \overline{AB}$$

$\overline{AB}$ sonsuz kümedir.



Teorem: Boş küme sonlu kümedir.

İspat // Boş kümenin hiçbir özalt kümesi yoktur, sonludur.

Teorem: $\{a\} = A$ kümesi sonludur.

İspat // A'nın boş kümeden farklı bir özalt kümesi yoktur. A bir özalt kümesine eşit güçlü olamaz. A sonludur.

Teorem: A ve B iki küme ve $A \subseteq B$ olsun. A sonsuz küme ise B'de sonsuzdur.

İspat // A sonsuz küme $\Rightarrow \exists f: A \xrightarrow{1:1 \text{ örten}} A_1 \subset A \Rightarrow f: A \longrightarrow f(A) \subset A$

$A \subseteq B$ B de sonsuzdur.

$$\exists g: B \xrightarrow{1:1 \text{ örten}} B_1 \subset B \quad g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A \text{ ise} \\ x, & x \in B \setminus A \text{ ise} \end{cases} \Rightarrow 1:1 \text{ ve örtendir.}$$

$$f(A) = g(A) \quad \text{ve} \quad g(A) \subseteq g(B)$$

$$f(A) = g(A) \neq \emptyset$$

$$g(B) = g(A \cup (B \setminus A)) \quad g(A) \cup g(B \setminus A) = f(A) \cup B \setminus A$$


$$X \in B \setminus A, \quad g(X) = X \quad \text{I} B \setminus A \quad g(B \setminus A) = ?$$

$$I_C: C \longrightarrow C$$

$$X \longrightarrow I_C(X) = X \rightarrow I_C(C) = C$$

$$g(B) = f(A) \cup (B \setminus A) \subseteq g(B) \cup (B \setminus A), \quad g(B) \subset B$$

Sonuç olarak, $g: B \xrightarrow{1:1 \text{ örten}} g(B) \subseteq B$ o halde B sonsuzdur.



Teorem: A ve B iki küme ve $A \subseteq B$ olsun. B sonlu ise A'da sonludur.

İspat// $A \subseteq B$ olsun.

A sonsuz $\Rightarrow B$ de sonsuzdur. ($P \Rightarrow Q \equiv Q' \Rightarrow P'$)
 $\underbrace{A}_{P} \Rightarrow Q$ (B sonlu ise A da sonludur.)

Sonuç: A ve B iki küme ve $A \subseteq B$ olsun.

1- A sonlu ise B'de sonludur. (Doğru olmayabilir.)

2- B sonsuz ise A'da sonsuzdur. (Doğru olmayabilir.)

Teorem: En az biri sonlu olan iki kümenin kesişimi de sonludur.

İspat// A ve B iki küme ve A sonlu olsun. $A \cap B$ de sonludur.

$A \cap B \subseteq A$ ve A sonlu olduğundan $A \cap B$ de sonludur.

Teorem: A ve B iki küme ve A sonlu ise $A \setminus B$ de sonludur.

İspat// $A \setminus B \equiv A \cap B' \subseteq A$ ve A sonlu olduğuna göre,

$A \cap B'$ de, yani $A \setminus B$ de sonludur.

Teorem: A bir küme ve $a \in A$ ise, A sonsuz küme ise $A \setminus \{a\}$ da sonsuzdur.

(Sonsuz bir kümeden sonlu sayıda elemanın atılmasıyla elde edilen kümeye de sonsuzdur denir.)

Doğal Sayılar Kümesi

A kümeler ailesinde eşit güçlü olma bağıntısına göre elde edilen denklik sınıflarını düşünelim. $x \in A$ nin denklik sınıfı:

$$\bar{x} = \{y : y \sim x\}, \quad \emptyset \text{ denklik sınıfı}; \quad \bar{\emptyset} = 0 = \{y : y \sim \emptyset\} \quad \emptyset = 0$$

$\{0\}$ kümesi sonludur. (Çünkü tek elemanı olan kümeler eşit güçlüdür.)

$$\{\bar{0}\} = 1 = \{y : y \sim \{0\}\}$$

$\{\bar{0}, \bar{1}\}$ kümesi sonludur.

$$\Rightarrow \{\bar{0}, \bar{1}\} = 2 = \{y : y \sim \{0, 1\}\}$$

$\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$ kümesi sonludur.

$$\Rightarrow \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\} = 3 = \{y : y \sim \{0, 1, 2\}\}$$

(Devamı, S: 195'te)

$a, b \in \mathbb{N}$ olmak üzere $x+a=b$ denkleminin doğal sayılar kümesinde her zaman çözümü olmayabilir. $a \leq b$ ise $\mathbb{N}$ de çözümü vardır.

Tanım : $(a,b), (c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ olsun. Eğer $a+d=b+c$ ise bu ikililere denktirler denir ve $(a,b) \sim (c,d)$ yazılır.

$$(a,b) \sim (c,d) \Rightarrow a+d=b+c$$

Örnek // 1) $(3,2), (4,3)$ ikilileri denk midir?

$$3+3 \stackrel{?}{=} 2+4 \Rightarrow 6=6 \quad (3,2) \sim (4,3)$$

2) $(3,2), (4,5)$

$$3+5=8 \quad 2+4=6 \quad 8 \neq 6 \quad (3,2) \not\sim (4,5)$$

Teorem : $(a,b), (c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ olsun. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ de tanımlı

$$(a,b) \sim (c,d) \Leftrightarrow a+d=b+c$$

bağıntısı bir denklik bağıntısıdır.

İspat // **i-** $\forall (a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ için

$$a+b=b+a \Rightarrow (a,b) \sim (a,b) \quad \text{yansıma öz. var.} //$$

ii- $\forall (a,b), (c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ için

$$(a,b) \sim (c,d) \Rightarrow a+d=b+c \Rightarrow b+c=a+d \Rightarrow c+b=d+a \\ \Rightarrow (c,d) \sim (a,b) \quad \text{simetri öz. var.} //$$

iii- $\forall (a,b), (c,d), (e,f) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ için

$$[(a,b) \sim (c,d) \wedge (c,d) \sim (e,f)] \Rightarrow [a+d=b+c \wedge c+f=d+e] \quad \text{bağıntı tanım}$$

$$\Rightarrow (a+d)+(c+f)=(b+c)+(d+e) \quad \text{taraf tarafa toplayarak}$$

$$\Rightarrow (a+f)+(c+d)=(b+e)+(c+d) \quad (+) \text{ işleminin değiş. ve birl. öz.}$$

$$\Rightarrow (a+f)=(b+e) \quad (+) \text{ işl. } \mathbb{N} \text{ de sadel. öz.}$$

$$\Rightarrow (a,b) \sim (e,f) \quad \text{geçişme öz. var.} //$$

Bu bağıntı $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ de denklik bağıntısıdır.

" $\sim$ " denklik bağıntısına göre (a,b) elemanının denklik sınıfını $\overline{(a,b)}$ ile gösterelim.

$$\overline{(a,b)} = \{(x,y) : (x,y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge (x,y) \sim (a,b)\}$$

Örnek,, ① $(\overline{0}, \overline{0}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge (x, y) \sim (0, 0)\}$

$$(x, y) \sim (0, 0) \Rightarrow x + 0 = y + 0 \Rightarrow x = y$$

$$(\overline{0}, \overline{0}) = \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), \dots, (a, a), \dots\}$$

② $(\overline{1}, \overline{0}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge (x, y) \sim (1, 0)\}$

$$(x, y) \sim (1, 0) \Rightarrow x + 0 = y + 1 \Rightarrow x = y + 1$$

$$(\overline{1}, \overline{0}) = \{(1, 0), (2, 1), (3, 2), \dots, (a+1, a), \dots\}$$

③ $(\overline{2}, \overline{4}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge (x, y) \sim (2, 4)\}$

$$(x, y) \sim (2, 4) \Rightarrow x + 4 = y + 2 \Rightarrow x + 2 = y$$

$$(\overline{2}, \overline{4}) = \{(0, 2), (1, 3), (2, 4), \dots, (a, a+2), \dots\}$$

Tanım : $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ olmak üzere $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ de tanımlanan " $\sim$ " denklik bağıntısına

göre elde edilen $(\overline{a}, \overline{b})$ denklik sınıflarından herbirine bir tamsayı denir.

Bu sayıların kümesine de tamsayılar kümesi denir ve $\mathbb{Z}$ ile gösterilir.

Örnek,, $(\overline{0}, \overline{0}), (\overline{3}, \overline{2}), (\overline{0}, \overline{4}), (\overline{4}, \overline{3}), (\overline{1}, \overline{0})$ denklik sınıflarının herbiri bir tamsayı göstermektedir.

Eşitlik :

$$(\overline{a}, \overline{b}), (\overline{c}, \overline{d}) \in \mathbb{Z} \text{ olmak üzere } (\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{c}, \overline{d}) \Leftrightarrow (a, b) \sim (c, d)$$

$$\Leftrightarrow a + d = b + c$$

Örnek,, $(\overline{1}, \overline{2}), (\overline{3}, \overline{4})$ tamsayıları eşitmidirler?

$$1 + 4 = 2 + 3 \Rightarrow (\overline{1}, \overline{2}) = (\overline{3}, \overline{4})$$

Tanım : (Toplama işlemi) :

$$+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$$

$$[(\overline{a}, \overline{b}), (\overline{c}, \overline{d})] \longrightarrow (\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{c}, \overline{d}) = (\overline{a+c}, \overline{b+d})$$

Tanım : (Çarpma işlemi) :

$$\cdot : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$$

$$[(\overline{a}, \overline{b}), (\overline{c}, \overline{d})] \longrightarrow (\overline{a}, \overline{b}) (\overline{c}, \overline{d}) = (\overline{ac+bd}, \overline{ad+bc})$$

Teorem : $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ matematik yapısı birimli ve değişimli bir halkadır.

İspat,, 1) $(\mathbb{Z}, +)$ yapısı bir abel grubudur.

$$\forall (\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Z} \text{ için } (\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{x}, \overline{y}) = (\overline{x}, \overline{y}) + (\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{a}, \overline{b}), \exists (\overline{x}, \overline{y}) \in \mathbb{Z}$$

$$(\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{x}, \overline{y}) = (\overline{a}, \overline{b}) \Rightarrow (\overline{a+x}, \overline{b+y}) = (\overline{a}, \overline{b}) \quad + \text{ iş. tanımı}$$

$$\Rightarrow (a+x, b+y) \sim (a, b) \quad \text{eşitlik tanımı}$$

$$\Rightarrow (a+x)+b = (b+y)+a \quad \text{denklik tanımı}$$

$$\Rightarrow x=y \quad \text{deg, bir, sad öz.}$$

$$\Rightarrow e = (\overline{x}, \overline{x}) \in \mathbb{Z} \quad \text{birim eleman vardır.}$$

(b) Ters eleman :

$$\forall (\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Z}, \exists (\overline{u}, \overline{v}) \in \mathbb{Z}, (\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{u}, \overline{v}) = (\overline{u}, \overline{v}) + (\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{x}, \overline{x})$$

$$(\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{u}, \overline{v}) = (\overline{x}, \overline{x}) \Rightarrow (\overline{a+u}, \overline{b+v}) = (\overline{x}, \overline{x})$$

$$\Rightarrow (a+u, b+v) \sim (x, x)$$

$$\Rightarrow (a+u)+x = (b+v)+x$$

$$\Rightarrow (u+a) = (v+b)$$

$$\Rightarrow (u, v) \sim (b, a)$$

$$\Rightarrow (\overline{u}, \overline{v}) = (\overline{b}, \overline{a})$$

$$\Rightarrow (\overline{u}, \overline{v}) = -(\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{b}, \overline{a})$$

2) Çarpma işlemi : birim eleman

$$\forall (\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Z}, (\overline{a}, \overline{b}) \cdot (\overline{x}, \overline{y}) = (\overline{x}, \overline{y}) \cdot (\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{a}, \overline{b}) \text{ olacak şekilde } (\overline{x}, \overline{y}) \in \mathbb{Z}$$

var mıdır?

$$(\overline{a}, \overline{b}) \neq (\overline{x}, \overline{x}) \text{ olsun. } \Rightarrow (\overline{a}, \overline{b}) \not\sim (\overline{x}, \overline{x}) \Rightarrow a+x \neq b+x \Rightarrow a \neq b$$

$$\Rightarrow (a < b \vee b < a)$$

i- $b < a$ olsun. $\Rightarrow (\overline{a}, \overline{b}) \cdot (\overline{x}, \overline{y}) = (\overline{a}, \overline{b})$

$$\Rightarrow (\overline{ax+by}, \overline{ay+bx}) = (\overline{a}, \overline{b})$$

$$\Rightarrow (ax+by, ay+bx) \sim (a, b)$$

$$\Rightarrow (ax+by)+b = (ay+bx)+a$$

$$\Rightarrow ax-bx = ay-by + a-b$$

$$\Rightarrow (a-b)x = (a-b)(y+1)$$

$$\Rightarrow x = y+1$$

$$\Rightarrow e = (\overline{x}, \overline{y}) = (\overline{y+1}, \overline{y})$$

ii- $a < b \Rightarrow e = (\overline{y+1}, \overline{y})$ dir.

$$(\overline{a,b})[(\overline{c,d}) + (\overline{e,f})] \stackrel{?}{=} (\overline{a,b})(\overline{c,d}) + (\overline{a,b})(\overline{e,f}) \quad \bullet \text{nin} + \text{üz. sol. de\u011fer. \u00f6z.}$$

$$[(\overline{a,b}) + (\overline{c,d})] \cdot (\overline{e,f}) \stackrel{?}{=} (\overline{a,b})(\overline{e,f}) + (\overline{c,d}) + (\overline{e,f}) \quad \bullet \text{nin} + \text{üz sa\u011f. de\u011fer. \u00f6z.}$$

Teorem : $\forall (\overline{a,b}), (\overline{c,d}), (\overline{x,y}) \in \mathbb{Z}$

i - $(\overline{a,b}) + (\overline{x,y}) = (\overline{c,d}) + (\overline{x,y}) \Leftrightarrow (\overline{a,b}) = (\overline{c,d}) \quad \mathbb{Z} \text{ de } + \text{ i\u015f. sad. \u00f6z.}$

ii - $x \neq y$ i\u015fin $(\overline{a,b}) \cdot (\overline{x,y}) = (\overline{c,d}) \cdot (\overline{x,y}) \Leftrightarrow (\overline{a,b}) = (\overline{c,d})$

iii - $(\overline{a,b}) = (\overline{c,d}) \Rightarrow (\overline{a,b})(\overline{x,y}) = (\overline{c,d})(\overline{x,y})$

ispat 1// $(\overline{a,b}) + (\overline{x,y}) = (\overline{c,d}) + (\overline{x,y})$

$$\Leftrightarrow (\overline{a+x, b+y}) = (\overline{c+x, d+y}) \quad \text{esitlik tanımı}$$

$$\Leftrightarrow (a+x, b+y) \sim (c+x, d+y) \quad \text{denklik tanımı}$$

$$\Leftrightarrow (a+x) + (d+y) = (b+y) + (c+x) \quad \text{denklik tanımı}$$

$$\Leftrightarrow (a+d) + (x+y) = (b+c) + (x+y) \quad + \text{ i\u015f. birli. de\u011fer. \u00f6z.}$$

$$\Leftrightarrow a+d = b+c \quad (+) \text{ i\u015f. sadele\u015ft. \u00f6z.}$$

$$\Leftrightarrow (a,b) \sim (c,d) \quad \text{denklik esitlik tanımı.}$$

$$\Leftrightarrow (\overline{a,b}) = (\overline{c,d}) \quad \text{esitlik tanımı.}$$

2// $x \neq y \Rightarrow$ i - $x > y$ $\vee$ ii - $y > x$ o\u011fal

i - $x > y$ olsun.

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}, x = y + k \quad \mathbb{N} \text{ de esitsizlik tanımı.}$$

$$\Leftrightarrow (\overline{x,y}) = (\overline{y+k, y})$$

$$\Leftrightarrow (\overline{a,b}) \cdot (\overline{x,y}) = (\overline{c,d}) \cdot (\overline{x,y})$$

$$\Leftrightarrow (\overline{a,b}) \cdot (\overline{y+k, y}) = (\overline{c,d}) \cdot (\overline{y+k, y})$$

$$\Leftrightarrow [\overline{a(y+k) + by}, \overline{ay + b(y+k)}] = [\overline{c(y+k) + dy}, \overline{cy + d(y+k)}]$$

$$\Leftrightarrow [a(y+k) + by, ay + b(y+k)] \sim [c(y+k) + dy, cy + d(y+k)] \quad \text{esitlik tanımı.}$$

$$\Leftrightarrow [ay + ak + by] + [cy + dy + dk] = [ay + by + bk] + [cy + ck + dy]$$

$$\Leftrightarrow (a+d)k = (b+c)k$$

$$\Leftrightarrow a+d = b+c$$

$$\Leftrightarrow (a,b) \sim (c,d)$$

$$\Leftrightarrow (\overline{a,b}) = (\overline{c,d})$$

Teorem: $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ halkası bir tanımlı bölgedir.

İspat// $\forall (\overline{x}, \overline{y}) \in \mathbb{Z}, (\overline{x}, \overline{y}) \cdot (\overline{a}, \overline{a}) = (\overline{x}a + \overline{y}a, \overline{x}a + \overline{y}a) = (\overline{a}, \overline{a})$

$\Rightarrow (\overline{x}, \overline{y}) (\overline{a}, \overline{a}) = (\overline{a}, \overline{a}) \quad (\overline{x} \cdot 0 = 0)$

$\forall (\overline{x}, \overline{y}), (\overline{u}, \overline{v}) \in \mathbb{Z}, (\overline{x}, \overline{y}) \cdot (\overline{u}, \overline{v}) = (\overline{a}, \overline{a}) \stackrel{?}{\Rightarrow} [(\overline{x}, \overline{y}) = (\overline{a}, \overline{a})] \vee [(\overline{u}, \overline{v}) = (\overline{a}, \overline{a})]$

Kabul edelim ki, $(\overline{x}, \overline{y}) \neq (\overline{a}, \overline{a})$ olsun. (ödev)

Problemler:

$(\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{b}, \overline{a}) = ? \quad (\overline{a}, \overline{a-1}) + (\overline{a}, \overline{a-2}) = ?$ önermelerinin doğru olması için ? yerine ne yazılmalı?

için ? yerine ne yazılmalı?

$a, b, x, r \in \mathbb{N}, (\overline{a+x}, \overline{x}) = (\overline{a+1}, \overline{1}), (\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{r}, \overline{r}) = (\overline{a}, \overline{b})$

$(\overline{a}, \overline{b}) (\overline{r}, \overline{r}) = (\overline{r}, \overline{r})$

Teorem: $(\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Z}$ olsun $\forall x \in \mathbb{N}$ ve bir $k \in \mathbb{N}$ için

1- $(\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{x+k}, \overline{x}) \Leftrightarrow a = b+k$

2- $(\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{x}, \overline{x}) \Leftrightarrow a = b$

3- $(\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{x}, \overline{x+k}) \Leftrightarrow b = a+k$

} önermelerinden sadece birisi doğrudur.

İspat// 1- $(\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{x+k}, \overline{x}) \Leftrightarrow (\overline{a}, \overline{b}) \sim (\overline{x+k}, \overline{x})$ (Eşitlik $\Leftrightarrow$ denklik tanımı)

$\Rightarrow a+x = b+(x+k)$ denklik tanımı

$\Rightarrow a = b+k$ tam sayılarda (+) işl. sad. öz.

2- $(\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{x}, \overline{x}) \Leftrightarrow (\overline{a}, \overline{b}) \sim (\overline{x}, \overline{x})$

$\Rightarrow a+x = b+x$

$\Rightarrow a = b$

$(\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{x}, \overline{x+k}) \Rightarrow (\overline{a}, \overline{b}) \sim (\overline{x}, \overline{x+k})$

$\Rightarrow a+(x+k) = b+x$

$\Rightarrow a+k = b$

• $a, b \in \mathbb{N}$ veriliyor. $\Rightarrow a > b, a = b, a < b$ ancak birisi doğrudur.

$a > b \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}, a = b+k$

$a = b \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} \quad a = b$

$a < b \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} \quad b = a+k$ den sadece birisi doğrudur.

$\Rightarrow 1, 2, 3$ den sadece birisi doğrudur.

Sonuçlar: $(a,b) \in \mathbb{Z}$ olsun.

1- $a > b$ ise $(\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{b+k}, \overline{b}) = (\overline{k}, \overline{0}) = (\overline{a-b}, \overline{0})$

$$\Rightarrow (\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{a-b}, \overline{0})$$

2- $a = b$ ise $(\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{0}, \overline{0}) = (\overline{a}, \overline{a})$

3- $a < b$ ise $(\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{0}, \overline{b-a})$ ile gösterilebilir.

Teorem: $\mathbb{Z}^* = \{ (\overline{a}, \overline{b}) : (\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Z} \wedge a \geq b \}$ olsun. $(\mathbb{Z}^*, +, \cdot)$ matematik yapısı $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ matematik yapısına izomorftur.

İspat: $f: \mathbb{Z}^* \rightarrow \mathbb{N}$ $(\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Z}^* \Rightarrow (\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Z} \wedge a \geq b$

$$(\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{a-b}, \overline{0}) = (\overline{k}, \overline{0}), k \in \mathbb{N}$$

$$(\overline{k}, \overline{0}) \rightarrow f(\overline{k}, \overline{0}) = k \text{ olsun}$$

$$f(x) = k$$

I) $\forall (\overline{a}, \overline{0}), (\overline{b}, \overline{0}) \in \mathbb{Z}^*$ için

$$(\overline{a}, \overline{0}) \neq (\overline{b}, \overline{0}) \Rightarrow (a, 0) \neq (b, 0)$$

$$\Rightarrow a+0 \neq 0+b \Rightarrow a \neq b$$

$$\Rightarrow f(\overline{a}, \overline{0}) \neq f(\overline{b}, \overline{0}) \Rightarrow f \text{ 1:1 dir.}$$

II) $\forall y \in \mathbb{N}$ için $\exists x \in \mathbb{Z}^*, f(x) = y, x = (\overline{y}, \overline{0}) \in \mathbb{Z}^*$ f örten dir.

III) $\forall (\overline{a}, \overline{0}), (\overline{b}, \overline{0}) \in \mathbb{Z}^*, f[(\overline{a}, \overline{0}) + (\overline{b}, \overline{0})] \stackrel{?}{=} f[(\overline{a}, \overline{0})] + f[(\overline{b}, \overline{0})]$

$$f[(\overline{a}, \overline{0}) + (\overline{b}, \overline{0})] = f[(\overline{a+b}, \overline{0+0})] \quad \mathbb{Z} \text{ de } (+) \text{ işl. tanımı}$$

$$= f[(\overline{a+b}, \overline{0})]$$

$$= a+b \quad \text{fonksiyon tanımı.}$$

$$= f[(\overline{a}, \overline{0})] + f[(\overline{b}, \overline{0})]$$

IV) $f[(\overline{a}, \overline{0}) \cdot (\overline{b}, \overline{0})] = f[(\overline{ab}, \overline{0+0})]$

$$= f[(\overline{ab}, \overline{0})] = ab$$

$$= f[(\overline{a}, \overline{0})] \cdot f[(\overline{b}, \overline{0})]$$

$$\mathbb{Z}^* \sim \mathbb{N}$$

$(\overline{x}, \overline{0}) = x$
tam sayı doğal sayı

$(\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{a-b}, \overline{0}) = a-b$
 $a > b$

$$(1, 0) = (\overline{r+1}, \overline{r}) = 1 \quad (0, 0) = 0$$

Tanım: a) $(\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Z}$ olsun. $a > b$ ise $(\overline{a}, \overline{b})$ tamsayısına pozitif tamsayı denir ve $(\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{a-b}, \overline{0}) = a-b$

b) $a = b$ ise $(\overline{a}, \overline{b})$ tamsayısına sıfır denir ve $(\overline{a}, \overline{b}) = 0$

c) $b > a$ ise $(\overline{a}, \overline{b})$ tamsayısına negatif tamsayı denir. $(\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{0}, \overline{b-a}) = -(b-a)$ şeklindedir. Buna göre pozitif tamsayıların kümesini $\mathbb{Z}^+$, negatif tamsayıların kümesini $\mathbb{Z}^-$ ile gösteririz.

$$\mathbb{N} = \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}, \quad \mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{Z}^- = \mathbb{Z}^+ \cup \{0\} \cup \mathbb{Z}^-$$

$$(\overline{x}, \overline{0}) = x, \quad (\overline{0}, \overline{y}) = -y$$

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$$

Tanım: (Çıkarma işlemi):

$x, y \in \mathbb{Z}$ olsun. $x + (-y)$ tamsayısına x ve y tamsayılarının farkı (x ten y nin farkı) denir ve $x-y$ ile gösterilir. $x-y = x + (-y)$
Farkı bulmak için yapılan işleme çıkarma işlemi denir.

Teorem: $\forall x, y, z \in \mathbb{Z}$ için,

a- $x-y = x + (-1)y$

b- $z(x-y) = (zx) - (zy)$

c- $(x-y)z = (xz) - (yz)$

} (1) nin (-) üz. dağı. öz.

İspat: a) $x = (\overline{a}, \overline{b}), y = (\overline{c}, \overline{d}) \Rightarrow -y = (\overline{d}, \overline{c}) \Rightarrow x + (-y) = (\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{d}, \overline{c})$
 $= (\overline{a+d}, \overline{b+c})$

$$x + (-1)y = (\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{0}, \overline{1}) \cdot (\overline{c}, \overline{d})$$

$$= (\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{0 \cdot c + 1 \cdot d}, \overline{0 \cdot d + 1 \cdot c}) = (\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{d}, \overline{c}) = (\overline{a+d}, \overline{b+c})$$

$$\Rightarrow x + (-y) = x + (-1)y$$

b) $z(x-y) = z[x + (-1)y] = zx + z(-1)y = zx + (-1)(zy) = (zx) - (zy)$

Problemler:

1- $(-3) + (-2) = (-5)$

2- $(-x)(-y) = xy$

3- $\forall x \in \mathbb{Z}, x = -x \Rightarrow x = 0$

4- $x^2 = (-x)^2$

5- $x - (-x) = 2x$ Önermelerinin doğruluğunu ispat ediniz.

$$1- (-3)+(-2) = (\overline{0,3}) + (\overline{0,2}) = (\overline{0+0}, \overline{3+2}) = (\overline{0,5}) = -5$$

$$2- (-x)(-y) = (-1)x(-1)y = (-1)(-1)(xy) = xy$$

$$(-1)(-1) \stackrel{?}{=} 1$$

$$(-1)(-1) = (\overline{0,1})(\overline{0,1}) = (\overline{0+0+1.1}, \overline{0.1+1.0}) = (\overline{1,0}) = 1 //$$

$$3- x = -x \Rightarrow x = (-1)x \Rightarrow x = (\overline{0,1})x \Rightarrow (\overline{a,b}) = (\overline{0,1})(\overline{a,b}) \quad x = (\overline{a,b}) //$$

$$\Rightarrow (\overline{a,b}) = (\overline{0+a+1.b}, \overline{0b+1.a}) \Rightarrow (\overline{a,b}) = (\overline{b,a})$$

$$\Rightarrow (\overline{a,b}) \cup (\overline{b,a}) \Rightarrow a+a = b+b \Rightarrow 2a = 2b \Rightarrow a = b$$

$$\Rightarrow x = (\overline{a,a}) = (\overline{0,0}) = 0 \Rightarrow x = 0$$

Tanım: $a, b \in \mathbb{Z}$, $a = (\overline{m,n})$, $b = (\overline{u,v})$ olsun.

$$1^0) a < b \Leftrightarrow m+v < n+u \text{ veya } b > a$$

" $a = b$ veya $a < b$ " önermesi kısaca $a \leq b$ yazılır.

$$2^0) a \leq b \Leftrightarrow m+v \leq n+u$$

Teorem: $a, b \in \mathbb{Z}$ olsun. $a < b$ olması için gerek ve yeter şart $a+x=b$

olacak şekilde bir pozitif x tamsayısının bulunmasıdır.

$$\underline{a+x=b \Leftrightarrow a < b}$$

İspat // $a = (\overline{m,n})$, $b = (\overline{u,v})$ olsun.

$$a < b \Leftrightarrow m+v < n+u \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, (m+v)+k = n+u$$

$$\Leftrightarrow (m+k)+v = n+u \Leftrightarrow (m+k, n) \cup (u, v) \Leftrightarrow (\overline{m+k, n}) = (\overline{u, v})$$

$$\Leftrightarrow (\overline{m,n}) + (\overline{k,0}) = (\overline{u,v}) \Leftrightarrow a+x=b \quad x \in \mathbb{Z}^+$$

Teorem: $a, b, c, d, x \in \mathbb{Z}$ olsun.

$$a- a < b \Leftrightarrow a+c < b+c$$

$$b- (a < b \wedge c < d) \Rightarrow a+c < b+d$$

$$c- x > 0 \text{ için } ax < bx \Leftrightarrow a < b$$

$$d- x < 0 \text{ için } ax < bx \Leftrightarrow a > b$$

İspat // $a = (\overline{m,n})$, $b = (\overline{u,v})$, $c = (\overline{r,s})$, $d = (\overline{t,w})$, $x = (\overline{y,z})$ olsun

$$a) a < b \Leftrightarrow (\overline{m,n}) < (\overline{u,v}) \Leftrightarrow m+v < n+u$$

$$\Leftrightarrow (m+v)+(r+s) < (n+u)+(r+s)$$

$$\Leftrightarrow (m+r)+(v+s) < (n+s)+(u+r)$$

$$\Leftrightarrow (m+r, n+s) < (u+r, v+s) \Leftrightarrow (m, n) + (r, s) < (u, v) + (r, s)$$

$$\Leftrightarrow a+c < b+c$$

Teorem: $\mathbb{Z}$ tamsayılar kümesinde tanımlanan " $\leq$ " bağıntısı bir sıralama bağıntısıdır.

$\mathbb{Z}$ kümesi bu bağıntıya göre tam sıralıdır.

Problemler:

1- $x \in \mathbb{Z}$ ve $y \in \mathbb{Z}^+$ ise $x-y < x+y$ olduğunu ispat edin.

2- $s, t \in \mathbb{N}$ olsun. $-1 < (s, t) < 1$ ise $s=t$ olduğunu ispat edin.

3- 0 ile 1 arasında hiçbir tamsayının bulunmadığını ispat edin.

Gözüm // 2- $-1 < (s, t) < 1 \Rightarrow [-1 < (s, t) \wedge (s, t) < 1]$

$$\Rightarrow [(0, 1) < (s, t) \wedge (s, t) < (1, 0)]$$

$$\Rightarrow (0+t < 1+s) \wedge (s+0 < t+1)$$

$$\Rightarrow [t < s+1 \wedge s < t+1]$$

$$\Rightarrow t+1 \leq s+1 \wedge s+1 \leq t+1$$

$$\Rightarrow (t \leq s \wedge s \leq t)$$

$$\Rightarrow s=t$$

3- Aksini kabul edelim. Yani 0 ile 1 arasında bir tamsayı varsa

$$\Rightarrow 0 < (s, t) < 1 \wedge (s, t) \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow 0 < (s, t) \wedge (s, t) < 1$$

$$\Rightarrow (0, 0) < (s, t) \wedge (s, t) < (1, 0)$$

$$\Rightarrow 0+t < 0+s \wedge s+0 < t+1$$

$$\Rightarrow t < s \wedge s < t+1$$

$$\Rightarrow t < s \wedge s+1 \leq t+1$$

$$\Rightarrow t < s \wedge s \leq t \text{ gelişkidir.}$$

$\Rightarrow$ kabulümüz yanlıştır.

Tanım: (Mutlak Değer):

$$x \in \mathbb{Z} \text{ olsun. } |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \text{ ise} \\ -x, & x < 0 \text{ ise} \end{cases}$$

şeklinde tanımlanan $|x|$ doğal

sayısına x 'in mutlak değeri denir.

Teorem: (Mutlak Değerin Özellikleri): $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ için

a- $|x| = |-x|$

b- $|x|^2 = |x^2| = x^2$

c- $x \leq |x| \wedge -x \leq |x| \wedge |-x| \leq x \leq |x|$

d- $|x| \leq y \Leftrightarrow x \leq y \vee -x \leq y$

e- $|x| \geq y \Leftrightarrow x \geq y \vee -x \geq y$

f- $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$

g- $|x| - |y| \leq |x + y|$

h- $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Üçgen eşitsizliği)

i- $|x| - |y| \leq |x - y|$

k- $|x - y| \leq |x| + |y|$

İspat // a) $|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x \leq 0 \end{cases} \quad |-x| = \begin{cases} -x, & -x \geq 0 \\ -(-x), & -x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} -x, & x \leq 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$

$\Rightarrow |x| = |-x|$

b) $|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x \leq 0 \end{cases} \quad |x|^2 = |x| \cdot |x| =$

1° $x > 0 \Rightarrow |x|^2 = x \cdot x = x^2$

2° $x < 0 \Rightarrow |x|^2 = (-x)(-x) = x^2 \quad \left. \begin{array}{l} 1^\circ \\ 2^\circ \end{array} \right\} |x|^2 = x^2 = |x^2|$

f) $|xy| = |x| \cdot |y|$

$x \geq 0 \Rightarrow |x| = x$ ve $x < 0 \Rightarrow |x| = -x$

$x > 0, y > 0 \Rightarrow |xy| = xy = |x| \cdot |y|$

$x > 0, y < 0 \Rightarrow |xy| = -(xy) = x(-y) = |x| \cdot |y|$

$x < 0, y > 0 \Rightarrow |xy| = -(xy) = (-x)y = |x| \cdot |y|$

$x < 0, y < 0 \Rightarrow |xy| = xy = (-x)(-y) = |x| \cdot |y| \Rightarrow \forall x, y \in \mathbb{Z}, |xy| = |x| \cdot |y| //$

g) $|x| - |y| \leq |x + y|$

$(x > 0, y > 0) \Rightarrow |x| - |y| = x - y < x + y \leq |x + y|$

$(x > 0, y < 0) \Rightarrow |x| - |y| = x + y \leq |x + y|$

$(x < 0, y > 0) \Rightarrow |x| - |y| = -x - y = -(x + y) \leq |x + y|$

$(x < 0, y < 0) \Rightarrow |x| - |y| = -x + y < |x + y|$

$|x| - |y| \leq |x + y|$

(Devamı s: 212 de)

Teorem: $a, b \in \mathbb{Z}$ ve $b \neq 0$ olsun. a sayısı b sayısına kalanlı olarak bölünebilir.

119

Bu bölme işleminde bölüm ve kalan tektir.

İspat, $a = bq + r \wedge 0 \leq r < |b|$

1° Varlığın İspatı :

a) $a = 0$ ise $0 = b \cdot 0 + 0 \quad q = r = 0$

b) $a \neq 0$ ise, $\{a - bx : x \in \mathbb{Z}\} = A$ olsun.

i- $b < 0$ ise $b \leq -1 \Rightarrow b|a| \leq -|a|$ her iki tarafı $|a|$ ile çarparak

$$\Rightarrow b|a| \leq -|a| \leq a$$

$$\Rightarrow b|a| \leq a$$

$$\Rightarrow a - b|a| \geq 0 \wedge a - b|a| \in A$$

ii- $b > 0$ ise $b \geq 1 \Rightarrow b(-|a|) \leq -|a|$

$$\Rightarrow b(-|a|) \leq -|a| \leq a$$

$$\Rightarrow b(-|a|) \leq a$$

$$\Rightarrow a - b(-|a|) \geq 0 \wedge a - b(-|a|) \in A$$

Sonuç: A 'nın negatif olmayan elemanları da vardır.

$\Rightarrow r = a - bq$ olan pozitif sayıların kümesinin bir en küçük r elemanı vardır. ($\Rightarrow a = bq + r \wedge r \geq 0$ dir.)

Ayrıca $r < |b| \Rightarrow$ Aksini kabul edelim. Yani $r \geq |b|$ olsun.

$$\Rightarrow r - |b| \geq 0 \Rightarrow r - |b| = \begin{cases} r - b, & b > 0 \\ r + b, & b < 0 \end{cases} = \begin{cases} a - bq - b, & b > 0 \\ a - bq + b, & b < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} a - b(q+1), & b > 0 \\ a - b(q-1), & b < 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow r - |b| \leq r \Rightarrow \begin{cases} a - b(q+1) \leq r, & b > 0 \\ a - b(q-1) \leq r, & b < 0 \end{cases} \text{ gelişkidir. Yani kabulümüz yanlıştır.}$$

$r \geq |b|$ yanlıştır. $\Rightarrow r < |b|$ dir. $\Rightarrow a = bq + r \wedge r < |b|$ vardır.

2° Tekliğin İspatı :

Aksini farzedelim yani $(a = bq_1 + r_1 \wedge 0 \leq r_1 < |b|) \wedge$

$$(a = bq_2 + r_2 \wedge 0 \leq r_2 < |b|)$$

$$\Rightarrow bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2$$

$$\Rightarrow b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1 \Rightarrow b \mid r_1 - r_2$$

$$\Rightarrow |b| \mid r_1 - r_2$$

$$\Rightarrow |b| \mid |r_1 - r_2| \wedge |r_1 - r_2| < |b|$$

$$\Rightarrow |r_1 - r_2| = 0$$

$$\Rightarrow r_1 - r_2 = 0 \Rightarrow r_1 = r_2$$

$$\Rightarrow b(q_1 - q_2) = 0 \quad b \neq 0 \text{ dir. (hipotezden)}$$

$$\Rightarrow q_1 = q_2 \wedge r_1 = r_2 \text{ önermesi doğrudur.}$$

Bir kalanlı bölme işleminde bölüm ve kalan tektir.

Teorem: $a, b, m \in \mathbb{Z}^+$ olsun. a nın b 'ye bölümünde (kalanlı), bölüm q ve kalan r ise ma nın mb ye bölümünde, bölüm q ve kalan mr dir.

İspat // $a = bq + r \wedge 0 \leq r < |b| \Rightarrow ma = (mb)q + mr \wedge m \cdot 0 \leq mr < m|b|$
 $\Rightarrow ma = (mb)q + mr \wedge 0 \leq mr < |mb|$

Teorem: $a, b, m \in \mathbb{Z}^+$ olsun. ma nın mb ye bölümünde bölüm q ve kalan mr ise a 'nın b 'ye bölümünde bölüm q ve kalan r dir. (Bir önceki teoremin tersidir.)

İspat // $ma = (mb)q + mr \wedge 0 \leq mr < |mb|$
 $\Rightarrow ma = m(bq + r) \wedge m \cdot 0 \leq mr < m|b|$
 $\Rightarrow a = bq + r \wedge 0 \leq r < |b|$

Teorem: $a, b, m \in \mathbb{Z}$ ve $m \neq 0$ olsun.

$(a = mq + r, 0 \leq r < |m|) \wedge (b = mq' + r', 0 \leq r' < |m|)$ olmak üzere
 $m \mid a - b \Leftrightarrow r = r'$

İspat // $m \mid a - b \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{Z}, a - b = mt$ (bölünebilme tanımından)

$$\Leftrightarrow a = b + mt$$

$$\Leftrightarrow a = mq' + r' + mt \quad (b \text{ yerine değeri yazılarak})$$

$$\Leftrightarrow a = m(q' + t) + r' \wedge 0 \leq r' < |m| \quad (\text{paranteze alarak})$$

$$\Leftrightarrow (a = m(q' + t) + r' \wedge 0 \leq r' < |m|) \wedge (a = mq + r \wedge 0 \leq r < |m|)$$

$$\Leftrightarrow r = r'$$

- 1- Ardışık iki çift sayıdan birinin dört ile bölünebileceğini gösterin.
- 2- a) " " sayının çarpımının 2 ile bölünebileceğini " .
b) " " " küpleri farkının 2 eksikinin 6 ile bölünebileceğini " .
- 3- İki basamaklı bir sayı ve bunun basamaklarının ters yazılmasıyla elde edilen sayının toplamının 11 ile bölünebileceğini gösterin.
- 4- Altı basamaklı bir sayının birler ve binler, onlar ve onbinler, yüzler ve yüzbinler basamaklarındaki rakamlar aynı ise bu sayının, 7, 11 ve 13 ile bölünebileceğini gösterin.
- 5- $a, b, c \in \mathbb{Z}$ olsun. $3/a+1 \wedge 3/b+1 \wedge 3/c+1$ ise
a) $3/a+b+c$ b) $3/a^2+b^2+c^2$ c) $3/a^2-b^2$ önermelerinin doğru olduğunu ispat edin.
- 6- a doğal sayısı tek ise bu doğal sayının karesinin $8n+1$ şeklinde yazılabileceğini gösterin.
- 7- -2378 sayısının 23 ile bölümünden elde edilen bölüm ve kalan nedir?
- 8- a tamsayısının b tamsayısına bölümünde bölüm 9 ve kalan r ise $atk, a-kb, k \in \mathbb{Z}$ tamsayılarının b ye bölümünde bölüm ve kalanı bulunuz?
- 9- a ve b tamsayılarının bir d tamsayısına bölümünde elde edilen kalanlar, r ve r' ise $ab-rr'$ tamsayısının d ye bölündüğünü gösterin?
- 10- Bir tamsayının karesinin birler basamağında 0, 1, 4, 5, 6, 9 rakamlarından başka rakamın bulunmayacağını gösterin?

Çözümler :

1- $k \in \mathbb{Z} \quad a=2k \quad b=2k+2=2(k+1)$

• k tek $\Rightarrow k=2r+1 \Rightarrow 2k+2=2(2r+1+1)=4(r+1) \Rightarrow 4/2k+2, r \in \mathbb{Z}$

• k çift $\Rightarrow k=2s \wedge s \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow 2k=4s \Rightarrow 4/2k \Rightarrow 4/a \vee 4/b$

3-
$$\left. \begin{aligned} x &= (ab)_{10} = 10a+b \\ y &= (ba)_{10} = 10b+a \end{aligned} \right\} x+y = 11a+11b = 11(a+b) = 11/x+y \quad (\text{bölünebilme tanımı})$$

$$\begin{aligned}
 4- (abcabc)_{10} &= 10^3a + 10^2b + 10^1c + 10^0a + 10^0b + c \\
 &= c(1+10^3) + 10b(1+10^3) + 100a(1+10^3) \\
 &= (1+10^3)(c+10b+100a) \\
 &= (7 \cdot 11 \cdot 13)(c+10b+100a) \\
 &\Rightarrow (7/x \wedge 11/x \wedge 13/x)
 \end{aligned}$$

$$5- 3/a+1 \quad 3/b+1 \quad 3/c+1$$

$$\Rightarrow (\exists r \in \mathbb{Z}, a+1=3r) \wedge (\exists t \in \mathbb{Z}, b+1=3t) \wedge (\exists s \in \mathbb{Z}, c+1=3s)$$

$$\Rightarrow a=3r-1 \wedge b=3t-1 \wedge c=3s-1$$

$$\begin{aligned}
 a- 3/a+b+c, \quad a+b+c &= (3r-1) + (3t-1) + (3s-1) \\
 &= 3(r+t+s)-3 \\
 &= 3(r+t+s-1) \Rightarrow 3/a+b+c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b- 3/a^2+b^2+c^2, \quad a^2+b^2+c^2 &= (3r-1)^2 + (3t-1)^2 + (3s-1)^2 \\
 &= 9r^2 - 6r + 1 + 9t^2 - 6t + 1 + 9s^2 - 6s + 1 \\
 &= 3(3r^2 - 2r + 3t^2 - 2t + 3s^2 - 2s + 1) \\
 &\Rightarrow 3/a^2+b^2+c^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 c- 3/a^2-b^2, \quad a^2-b^2 &= (3r-1)^2 - (3t-1)^2 \\
 &= (9r^2 - 6r + 1) - (9t^2 - 6t + 1) \\
 &= 9r^2 - 9t^2 - 6r + 6t \\
 &= 3(3r^2 - 3t^2 - 2r + 2t) \Rightarrow 3/a^2-b^2
 \end{aligned}$$

$$6- a \text{ tek} \Rightarrow a=2k+1 \wedge k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow a^2 = (2k+1)^2 \Rightarrow a^2 = 4k^2 + 4k + 1 \Rightarrow a^2 = 4k(k+1) + 1$$

$$i- k \text{ tek} \Rightarrow k=2r+1 \wedge r \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow a^2 = 4(2r+1)(2r+1+1) + 1$$

$$\Rightarrow a^2 = 8(2r+1)(r+1) + 1$$

$$\Rightarrow a^2 = 8n+1 \quad n = (2r+1)(r+1)$$

$$ii- k \text{ çift} \Rightarrow k=2s \wedge s \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow a^2 = 8s(2s+1) + 1$$

$$\Rightarrow a^2 = 8n+1 \quad n = s(2s+1)$$

$$7- -2378 = 23q + r \wedge 0 \leq r < |23|$$

123

$$\begin{array}{r|l} -2378 & 23 \\ \pm 23 & -104 \\ \hline 0-78 & \\ \pm 92 & \\ \hline +14 & \end{array}$$

$$-2378 = 23(-104) + 14$$

$\downarrow$ bölüm $\downarrow$ kalan

$$8- a = bq + r \wedge 0 \leq r < |b|$$

$$\bullet \Rightarrow a + kb = bq + r + kb \wedge 0 \leq r < |b|$$

$$\Rightarrow a + kb = b(q+k) + r \wedge 0 \leq r < |b|$$

$\downarrow$
 $q+k = \text{bölüm}$ $r = \text{kalan}$

$$\bullet \Rightarrow a - kb = bq + r - kb \wedge 0 \leq r < |b|$$

$$\Rightarrow a - kb = b(q-k) + r \wedge 0 \leq r < |b|$$

$\downarrow$
 $q-k = \text{bölüm}$ $r = \text{kalan}$

$$9- (a = dq_1 + r, 0 \leq r < |b|) \wedge (b = dq_2 + r', 0 \leq r' < |b|)$$

$$\Rightarrow ab - rr' = (dq_1 + r)(dq_2 + r') - rr'$$

$$\Rightarrow ab - rr' = d^2q_1q_2 + dq_1r' + dq_2r + rr' - rr'$$

$$\Rightarrow ab - rr' = d(dq_1q_2 + q_1r' + q_2r)$$

$$\Rightarrow d \mid ab - rr'$$

- Bir Tamsayının Bölenleri -

Herhangi bir a tamsayısı verilsin. Eğer $a=0$ ise 0'dan farklı her tamsayı a 'nın bölenidir. Eğer $a \neq 0$ ise $-1, +1, -a, +a$ tamsayıları a 'nın bölenleridir. a 'nın bu bölenlerden başka bölenleri varsa, $-(a-1), \dots, -3, -2, 2, 3, \dots, (a-1)$ sayılarının a 'yı bölenleri araştırılır.

Örnek, 8 sayısının bölenleri kümesini bulunuz?

$\{-8, -7, \dots, -2, -1, 1, 2, \dots, 7, 8\}$ kümesinin alt kümesidir. Bu da,

$\{-8, -4, -2, -1, 1, 2, 4, 8\}$ kümesidir ve sembolik olarak $\{B(a)\}$ ile gösterilir.

$$\{B(8)\} = \{-8, -4, -2, -1, 1, 2, 4, 8\}$$

- Tamsayıların Ortak Bölenleri -

Tanım: Sıfırdan farklı a ve b tamsayılarının her ikisini de bölen x tamsayılarına a ve b tamsayılarının ortak bölenleri denir.

a ve b tamsayılarının ortak bölenlerinin kümesi sembolik olarak,
 $\{OB(a,b)\}$ ile gösterilir.

$$\{OB(a,b)\} = \{x : x/a \wedge x/b\} = \{x : x \in \{B(a)\} \wedge x \in \{B(b)\}\} \\ \Rightarrow \{OB(a,b)\} = \{B(a)\} \cap \{B(b)\}$$

Örnek,, $\{B(8)\} = \{-8, -4, -2, -1, 1, 2, 4, 8\}$

$$\{B(6)\} = \{-6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 6\}$$

$$\{OB(6,8)\} = \{-2, -1, 1, 2\} = \{B(8)\} \cap \{B(6)\}$$

Teorem: $a, b \in \mathbb{Z}$ $b \neq 0$ olsun. $b/a \Rightarrow \{OB(a,b)\} = \{B(b)\}$

İspat,, $b/a \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Z}, a = bq$

$$\forall x \in \{B(b)\} \Rightarrow x/b \Rightarrow \exists r \in \mathbb{Z}, b = rx$$

$$\Rightarrow a = rxq = x(rq) \Rightarrow x/a \Rightarrow x \in \{B(a)\}$$

$$\forall x \in \{B(b)\} \Rightarrow x \in \{B(a)\}$$

$$\Rightarrow \{B(b)\} \subseteq \{B(a)\}$$

$$\Rightarrow \{OB(a,b)\} = \{B(b)\} \cap \{B(a)\} = \{B(b)\}$$

$$\Rightarrow \{OB(a,b)\} = \{B(b)\}$$

Örnek,, 6 ve 24 sayılarının OB kümesini bulunuz.

$$6/24 \quad \{OB(6,24)\} = \{B(6)\} = \{-6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 6\}$$

Teorem: $a, b \in \mathbb{Z}$ ve $b \neq 0$ olsun. $a = bq + r$ $\wedge$ $0 \leq r < |b|$ ise

$$\{OB(a,b)\} = \{OB(b,r)\}$$

İspat,, $\forall x \in \{OB(a,b)\} \Leftrightarrow (x/a \wedge x/b)$

$$\Leftrightarrow (x/a - bq \wedge x/b)$$

$$\Leftrightarrow (x/r \wedge x/b)$$

$$\Leftrightarrow x \in \{OB(r,b)\} \Rightarrow x \in \{OB(b,r)\}$$

$$\Leftrightarrow \{OB(a,b)\} \subseteq \{OB(b,r)\}$$

$$\Leftrightarrow \{OB(b,r)\} \subseteq \{OB(a,b)\}$$

$$\Rightarrow \{OB(a,b)\} = \{OB(b,r)\}$$

Örnek,, 28 ve 36'nın OB'ini bulunuz.

$$i - 36 = 28 \cdot 1 + 8 \quad \{OB(28, 36)\} = \{OB(28, 8)\}$$

$$ii - 28 = 8 \cdot 3 + 4 \quad \{OB(28, 8)\} = \{OB(8, 4)\}$$

$$iii - 4/8 \quad \{OB(8, 4)\} = \{B(4)\} = \{-4, -2, -1, 1, 2, 4\}$$

$$\text{Sonuç,,} \quad \{OB(36, 28)\} = \{B(4)\} = \{-4, -2, -1, 1, 2, 4\}$$

Tanım: Sıfırdan farklı $a_1, a_2, \dots, a_n$ tamsayılarının herbirini tam olarak bölen bir X tamsayısına bu sayıların bir ortak böleni denir. $a_1, a_2, \dots, a_n$ tamsayılarının ortak bölenlerinin kümesi,

$\{OB(a_1, a_2, \dots, a_n)\}$ şeklinde gösterilir. ve

$$\{OB(a_1, a_2, \dots, a_n)\} = \{B(a_1)\} \cap \{B(a_2)\} \cap \dots \cap \{B(a_n)\} \quad \text{kümesidir.}$$

Tanım: (Tamsayıların ortak bölenlerinin en büyüğü) :

En az biri sıfırdan farklı iki tamsayı a ve b olsunlar. a ve b nin ortak bölenleri kümesinin en büyük elemanına a ve b tamsayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü denir. ve $OBEB(a, b)$ ile gösterilir.

Örnek,, $\{OB(28, 36)\} = \{-4, -2, -1, 1, 2, 4\}$

$$OBEB(28, 36) = 4$$

Teorem: (Öklid Algoritması) :

En az biri sıfırdan farklı iki tamsayı a ve b olsun. $OBEB(a, b) = r_n$ olacak şekilde bir tek r_n pozitif tamsayısı vardır. Bu r_n sayısı a ve b sayılarının lineer toplamı olarak yazılabilir. (yani, a ve b verildiğinde m ve n tamsayıları vardır ki $r_n = ma + nb$ yazılabilir.)

İspat,, $OBEB$ tanımından dolayı $OBEB(a, b) = OBEB(|a|, |b|)$

$$1^o) \quad a = b \quad \text{olsun.} \quad OBEB(a, b) = a = b$$

$$2^o) \quad a \neq b \quad \wedge \quad b \neq 0 \quad \text{olsun.} \Rightarrow a = bq + r \quad 0 \leq r < b \quad \text{iki durum vardır ;}$$

$$I - a) \quad r = 0 \Rightarrow a = bq \Rightarrow b/a \Rightarrow OBEB(a, b) = b$$

$$b) \quad r \neq 0 \Rightarrow \{OB(a, b)\} = \{OB(b, r)\} \Rightarrow OBEB(a, b) = OBEB(b, r)$$

$$II - b \text{ yi } r \text{ ye kalanlı olarak bölelim. } b = rq_1 + r_1 \quad \wedge \quad 0 \leq r_1 < r$$

$$a) \quad r_1 = 0 \Rightarrow b = rq_1 \Rightarrow OB(b, r) = \{B(r)\} \Rightarrow OBEB(b, r) = r$$

$$b - r_1 \neq 0 \text{ ise } OB(b, r_1) = OB(r_1, r_1)$$

III - r_1 'yi r_1 'e kalanlı olarak bölelim. $\Rightarrow r = r_1 \cdot q_2 + r_2 \wedge 0 \leq r_2 < r_1$

$$a) r_2 = 0 \Rightarrow r = r_1 \cdot q_2 \Rightarrow \{OB(r, r_1)\} = \{B(r_1)\} \Rightarrow OBEB(r, r_1) = r_1$$

$$\Rightarrow OBEB(a, b) = OBEB(b, r) = OBEB(r, r_1) = r_1$$

$$b) r_2 \neq 0 \Rightarrow \{OB(r, r_1)\} = \{OB(r_1, r_2)\}$$

IV - r_1 'i r_2 'ye kalanlı olarak bölelim. $\Rightarrow r_1 = r_2 \cdot q_3 + r_3 \wedge 0 \leq r_3 < r_2$

$$a) r_3 = 0 \Rightarrow r_1 = r_2 \cdot q_3 \Rightarrow r_2 / r_1 \Rightarrow \{OB(r_1, r_2)\} = \{B(r_2)\} \Rightarrow OBEB(r_1, r_2) = r_2$$

$$\Rightarrow OBEB(a, b) = r_2$$

$$b) r_3 \neq 0 \Rightarrow \{OB(r_1, r_2)\} = \{OB(r_2, r_3)\}$$

$$\begin{array}{c} \vdots \\ r_{n-2} = r_{n-1} \cdot q_n + r_n \quad \text{ve} \quad r_n = 0 \Rightarrow OBEB(a, b) = OBEB(b, r) = OBEB(r, r_1) \dots \end{array}$$

$$\dots = OBEB(r_{n-2}, r_{n-1}) = r_n = OBEB(r_{n-1}, r_n)$$

$$r_{n-1} = r_n \cdot q_n + 0$$

$$\Rightarrow \underline{OBEB(a, b) = r_n}$$

a ve b r_n 'in lineer toplamı olarak yazılır ?

$$r_n = r_{n-2} - r_{n-1} \cdot q_n$$

$$r_{n-3} = r_{n-2} \cdot q_{n-1} + r_{n-1} \Rightarrow r_{n-1} = r_{n-3} - r_{n-2} \cdot q_{n-1}$$

$$r_n = r_{n-2} - (r_{n-3} + r_{n-2} \cdot q_{n-1}) \cdot q_n$$

$$r_n = r_{n-2} (1 + q_{n-1} \cdot q_n) - r_{n-3} \cdot q_n$$

$$r_{n-4} = r_{n-3} \cdot q_{n-2} + r_{n-2} \Rightarrow r_{n-2} = r_{n-4} - r_{n-3} \cdot q_{n-2}$$

$$\Rightarrow \underline{r_n = m \cdot a + n \cdot b}$$

Örnek // -118 ve 26 sayılarının OBEB'ini bulun ve OBEB'i bu sayıların

öklid algoritmalarını bulun.

$$OBEB(-118, 26) = r_n \quad r_n = m(-118) + n(26)$$

$$OBEB(-118, 26) = OBEB(118, 26)$$

$$I - 118 = 26 \cdot 4 + 14 \quad \wedge \quad 0 < 14 < 26$$

$$II - 26 = 14 \cdot 1 + 12 \quad \wedge \quad 0 < 12 < 14$$

$$III - 14 = 12 \cdot 1 + 2 \quad \wedge \quad 0 < 2 < 12$$

$$IV - 12 = 2 \cdot 6 + 0 \quad OBEB(-118, 26) = 2 = r_n$$

$$2 - 2 = 14 - 12 \Rightarrow 2 = 14 - (26 - 14)$$

$$12 = 26 - 14 \Rightarrow 2 = 14 - 26 + 14$$

$$\Rightarrow 2 = 2 \cdot 14 - 26$$

$$14 = 118 - 26 \cdot 4$$

$$2 = 2 \cdot (118 - 26 \cdot 4) - 26$$

$$2 = 2 \cdot 118 - 8 \cdot 26 - 26$$

$$2 = 2 \cdot 118 - 9 \cdot 26$$

$$2 = m(-118) + n(26) \quad 2 = (-2)(-118) + (-9)(26) \quad m = -2 \quad n = -9$$

Sonuçlar: $\{OB(a,b)\} = \{B(r_n)\} \Rightarrow \forall x \in \{OB(a,b)\} \Rightarrow (x/a, x/b)$
 $\Rightarrow x \in \{B(r_n)\} \Rightarrow x/r_n$

Bir d sayısının a ve b nin OBEB'i olduğunu göstermek için,

$$1^o \quad d/a \wedge d/b$$

$$2^o \quad \exists c \in \mathbb{Z} \text{ için } c/a \wedge c/b \Rightarrow c/d$$

Örnek 5517 ve 2421 sayılarının OBEB'ini bulun ve bu sayıların lineer toplamı olarak yazın.

$$5517 = 2421 \cdot 2 + 675$$

$$2421 = 675 \cdot 3 + 396$$

$$675 = 396 \cdot 1 + 279$$

$$396 = 279 \cdot 1 + 117$$

$$279 = 117 \cdot 2 + 45$$

$$117 = 45 \cdot 2 + 27$$

$$45 = 27 \cdot 1 + 18$$

$$27 = 18 \cdot 1 + 9$$

$$18 = 9 \cdot 2 + 0$$

$$OBEB(5517, 2421) = 9$$

$$9 = m(5517) + n(2421) \quad m = ? \quad n = ?$$

en soldan en sağa

$$9 = \underbrace{(-104)}_m (5517) + \underbrace{(133)}_n (2421)$$

Teorem: En az biri sıfırdan farklı iki tamsayı a ve b olsun.

$$\underline{OBEB(a,b) = OBEB(b,a)}$$

ispat,, $\{OB(a,b)\} = \{B(a)\} \cap \{B(b)\} = \{B(b)\} \cap \{B(a)\} = \{OB(b,a)\}$

$$\Rightarrow OBEB(a,b) = OBEB(b,a)$$

Teorem: En az biri sıfırdan farklı iki tamsayı a ve b olsun. $m \in \mathbb{Z}^+$ ise

$$\underline{OBEB(ma,mb) = m OBEB(a,b)}$$

ispat,, $a > b \Rightarrow a = bq + r \wedge 0 < r < |b|$

$$ma = (mb)q + mr \wedge 0 < mr < |mb|$$

$$b = r_1q_1 + r_2 \wedge 0 < r_2 < r_1$$

$$r_1 = r_2q_2 + r_3 \wedge 0 < r_3 < r_2$$

$$\vdots$$
$$r_{n-2} = r_{n-1}q_{n-1} + r_n \wedge 0 < r_n < r_{n-1}$$

$$r_{n-1} = r_n q_{n+1} + 0 \quad OBEB(a,b) = r_n$$

$$mb = (mr)q + mr_1 \wedge 0 < mr_1 < mr$$

$$mr = (mr_1)q_2 + mr_2 \wedge 0 < mr_2 < mr_1$$

$$\vdots$$
$$mr_{n-2} = (mr_{n-1})q_{n-1} + mr_n \wedge 0 < mr_n < mr_{n-1}$$

$$mr_{n-1} = (mr_n)q_{n+1} + 0 \quad OBEB(ma,mb) = mr_n = m OBEB(a,b)$$

Sonuçlar:

1- $OBEB(a,b) = 1$ ise $OBEB(ma,mb) = m$

2- $b/a \Rightarrow OBEB(a,b) = |b|$

3- $a \neq 0 \Rightarrow OBEB(a,a) = |a|$

4- $OBEB(a,1) = 1$

Teorem: En az biri sıfırdan farklı iki tamsayı a ve b olsun. $m \in \mathbb{Z}^+$ olmak

üzere, m/a ve m/b ise $OBEB(a:m, b:m) = [OBEB(a,b)] : m$

ispat,, m/a ve m/b olduğundan $(a:m)m = a \wedge [(b:m)m] = b$

$$\Rightarrow OBEB[(a:m)m, (b:m)m] = m OBEB(a:m, b:m) = OBEB(a,b)$$

$$\Rightarrow OBEB(a:m, b:m) = [OBEB(a,b)] : m$$

Sonuç: $\text{OBEB}(a,b)=d$ ise $\text{OBEB}(a:d, b:d)=1$

İspat, $\text{OBEB}(a,b)=1 \Rightarrow$

$$(a:d)=u \wedge (b:d)=v \Rightarrow a=du \wedge b=dv$$

$$\text{OBEB}(a:d, b:d)=k \Rightarrow \text{OBEB}(u,v)=k \Rightarrow \exists m,n \in \mathbb{Z}, u=km \wedge v=kn$$

$$\Rightarrow a=dkm \wedge b=dkn \Rightarrow a=(dk)m \wedge b=(dk)n$$

$$\Rightarrow (dk)/m \wedge (dk)/n \Rightarrow dk \in \{\text{OB}(a,b)\}$$

$$\Rightarrow dk \in \{\text{OB}(a,b)\} \wedge \text{OBEB}(a,b)=d$$

$$\Rightarrow dk/d \Rightarrow k=1 \Rightarrow \text{OBEB}(u,v)=\text{OBEB}(a:d, b:d)=1 //$$

Tanım: En az biri sıfırdan farklı $a_1, a_2, \dots, a_n$ tamsayıları verilsin.

Bu sayıların ortak bölenleri kümesinin en büyük elemanına ortak bölenlerinin en büyüğü denir. Ve sembolik olarak $\text{OBEB}(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ ile gösterilir.

Teorem: En az biri sıfırdan farklı $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ tamsayıları verilsin.

$$\text{OBEB}(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) = \text{OBEB}[\text{OBEB}(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n] \text{ dir.}$$

$$n=3 \Rightarrow \text{OBEB}(a_1, a_2, a_3) = \text{OBEB}[\text{OBEB}(a_1, a_2), a_3]$$

İspat, $\text{OBEB}(a_1, a_2, \dots, a_n) = d_1$ ve $\text{OBEB}[\text{OBEB}(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n] = d_2$ olsun.

$$(1^0) \text{OBEB}(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) = d_1 \text{ olsun. } i=1, 2, \dots, n \text{ için}$$

$$\Rightarrow d_1/a_i \Rightarrow i=1, 2, \dots, n-1 \text{ için } d_1/a_i \wedge d_1/a_n \Rightarrow d_1/d_2$$

$$(2^0) \text{OBEB}[\text{OBEB}(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n] = d_2 \text{ olsun.}$$

$$\Rightarrow [d_2/\text{OBEB}(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}) \wedge d_2/a_n] \quad i=1, 2, \dots, n-1 \text{ için } d_2/a_i \wedge d_2/a_n$$

$$\Rightarrow i=1, 2, \dots, n \text{ için } d_2/a_i$$

$$\Rightarrow d_2/d_1 \Rightarrow (d_1/d_2 \wedge d_2/d_1) \Rightarrow d_1 = d_2$$

Teorem: En az biri sıfırdan farklı $a_1, a_2, \dots, a_n$ sayıların OBEB'i bu sayıların lineer toplamı olarak yazılabilir.

$$\text{Yani } \text{OBEB}(a_1, a_2, \dots, a_n) = d \text{ ise } d = a_1 t_1 + a_2 t_2 + \dots + a_n t_n, \\ t_1, t_2, \dots, t_n \in \mathbb{Z}$$

Tanım: (Aralarında Asal veya Rölatif Asal Sayılar):

En az biri sıfırdan farklı a, b tamsayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü 1 ise ($\text{OBEB}(a, b) = 1$) a ve b sayıları aralarında (relatif) asaldır.

Örnek, $\text{OBEB}(16, 15) = 1$ olduğundan 15 ve 16 aralarında asaldır.

Eğer a ve b aralarında asal ise ($\text{OBEB}(a, b) = 1$) bu durum,

$(a, b) = 1$ şeklinde sembolik olarak gösterilir.

Örnek, $(16, -15) = 1$

Teorem: En az biri sıfırdan farklı a ve b tamsayılarının relatif asal olması için gerek ve yeter şart $1 = ma + nb$ olacak şekilde $m, n \in \mathbb{Z}$ sayılarının bulunmasıdır.

İspat, 1- Gerek şart: $\Rightarrow (a, b) = 1$ (a ve b aralarında relatif asal ise)

$$\Rightarrow \text{OBEB}(a, b) = 1$$

$$\Rightarrow \exists m, n \in \mathbb{Z}, 1 = ma + nb$$

2- Yeter şart $\Leftarrow$: $1 = ma + nb$ $m, n \in \mathbb{Z}$ $\text{OBEB}(a, b) = d$ olsun.

$$\Rightarrow \exists k, t \in \mathbb{Z}, a = kd \wedge b = td$$

$$\Rightarrow (d/a \wedge d/b)$$

$$\Rightarrow 1 = mkd + ntd$$

$$\Rightarrow (mk + nt)d = 1$$

$$\Rightarrow d/1 \Rightarrow d = 1 \quad \text{OBEB}(a, b) = 1 \Rightarrow (a, b) = 1$$

$$(a, b) = 1 \Leftrightarrow 1 = ma + nb \quad m, n \in \mathbb{Z}$$

Teorem: $a, b, c \in \mathbb{Z}$ olsun. $(a, c) = 1 \wedge (b, c) = 1 \Rightarrow (ab, c) = 1$

İspat, $(a, c) = 1 \wedge (b, c) = 1 \Rightarrow (\exists m, n \in \mathbb{Z}, 1 = ma + nc) \wedge (\exists u, v \in \mathbb{Z}, 1 = ub + vc)$

$$\Rightarrow 1 = (ma + nc)(ub + vc)$$

$$\Rightarrow 1 = maub + mavc + ncub + vnc^2$$

$$\Rightarrow 1 = \underbrace{(mu)}_k (ab) + \underbrace{(mav + nub + vnc)}_r c$$

$$\Rightarrow 1 = k(ab) + r.c \quad k, r \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow (ab, c) = 1$$

Teorem: $a, b, c \in \mathbb{Z}$ olsun. $a/bc \wedge (a, b) = 1 \Rightarrow a/c$

İspat, $(a, b) = 1 \Rightarrow \exists m, n \in \mathbb{Z}, 1 = ma + nb$

$$\Rightarrow c = mac + nb c$$

$$a/bc \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, bc = ka$$

$$\Rightarrow c = mac + nka$$

$$\Rightarrow c = (mc + nk) a \Rightarrow a/c$$

Teorem: $a, b, n \in \mathbb{Z}$ olsun. $[a/n \wedge b/n \wedge (a, b) = 1] \Rightarrow ab/n$

İspat, $a/n \wedge b/n \wedge (a, b) = 1 \Rightarrow \exists x \in \mathbb{Z}, n = ax \wedge b/n \wedge (a, b) = 1$

$$\Rightarrow \exists x \in \mathbb{Z}, n = ax \wedge \exists y \in \mathbb{Z}, n = by \wedge (a, b) = 1$$

$$\Rightarrow ax = by \wedge (a, b) = 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b/ax \wedge (a, b) = 1 \Rightarrow b/x \\ a/by \wedge (a, b) = 1 \Rightarrow a/y \end{cases}$$

$$\Rightarrow b/x \Rightarrow \exists r \in \mathbb{Z}, x = br \Rightarrow n = ax = abr \Rightarrow n = (ab)r \Rightarrow ab/n$$

Tanım: $a_1, a_2, \dots, a_n$ tamsayılarının OBEB'i 1 ise bu sayılara aralarında asaldırlar (relatifler) denir.

Örnek, $\text{OBEB}(15, 20, 22) = \text{OBEB}[\text{OBEB}(15, 20), 22] = \text{OBEB}(5, 22) = 1$

$$\text{OBEB}(5, 8, 11) = 1$$

Teorem: $i = 1, 2, \dots, n$ için $a, b_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ve $(a, b_i) = 1$ ise $(a, \prod_{i=1}^n b_i) = 1$

İspat, induksiyon (tümevarım) metodu ile yapılacaktır.

$(a, \prod_{i=1}^n b_i) = 1$ önermesini doğrulayan i sayılarının kümesi D olsun.

1° $n = 1$ için $a, b_1 \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \wedge (a, b_1) = 1 \Rightarrow (a, b_1) = (a, \prod_{i=1}^1 b_i) = 1 \Rightarrow 1 \in D$

2° $n = k \in D$ olsun. $i = 1, 2, \dots, k$ için $a, b_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \wedge (a, b_i) = 1 \Rightarrow$
 $\Rightarrow (a, \prod_{i=1}^k b_i) = 1$ olsun

3° $n = k + 1$ için $i = 1, 2, \dots, k, k + 1$ için $a, b_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \wedge (a, b_i) = 1 \Rightarrow$
 $\Rightarrow (a, \prod_{i=1}^{k+1} b_i) = [a, (\prod_{i=1}^k b_i) b_{k+1}] \Rightarrow [(a, b_{k+1}) = 1 \wedge (a, \prod_{i=1}^k b_i) = 1]$
 $\Rightarrow [a, (\prod_{i=1}^k b_i) b_{k+1}] = 1 \Rightarrow (a, \prod_{i=1}^{k+1} b_i) = 1, k + 1 \in D$

Problemler :

- 1- 1062 ve 425 sayılarının aralarında asal olduklarını gösterin.
- 2- $\text{OBEB}(16, 24, 20) = ?$
- 3- $\text{OBEB}(108, -64) = d$ ve $d = 108x - 64y$ ise $d = ?$ $x = ?$ $y = ?$ $d, x, y \in \mathbb{Z}$
- 4- Üç arsanın alanları 1260 m^2 , 1760 m^2 , 2772 m^2 dir. Bu arsalar olabildiğince büyük alanda eşit parçalara bölünerek parsellenmiştir. Bir parselin alanı kaç m^2 dir ve her bir arsa kaç parseldir?
- 5- $a, b \in \mathbb{Z}$ ve $(a, b) = 1$ ise $(a+1, ab) = 1$ olduğunu ispat edin.
- 6- İki sayının OBEB'ini bulmak için yapılan işlemler sonucunda sırasıyla 8, 2, 7 bölümleri elde ediliyor. Bu sayıların OBEB'i 12 ise sayıları bulun.
- 7- $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ veriliyor. $\forall x, y \in A$, $x \circ y = \text{OBEB}(x, y)$ olan bir işlem tanımlanıyor. O işleminin çizelgesini (tablo) düzenleyerek, özelliklerini inceleyin.
- 8- $\text{OBEB}(a, b, c) = d$ ise d^2/ab , d^2/ac , d^2/bc önermelerinin doğruluk değeri?
- 9- $a \in \mathbb{Z}^+$ olsun. $(a, a+1) = 1$, $(a, 2a+1) = 1$, $(a+1, 2a+1) = 1$ " " " ?
- 10- $n, a, b \in \mathbb{Z}^+$ olsun. $(a, b) = 1$ ise $(a^n, b) = 1$ olduğunu ispat edin?
- 11- $a, n, b \in \mathbb{Z}^+$ olsun. $\text{OBEB}(a, b) = d \Rightarrow \text{OBEB}(a^n, b^n) = d^n$ olduğunu göst.
- 12- $b/c \wedge (a, c) = 1$ ise $(a, b) = 1$ olduğunu ispat edin?

Çözümler :

- 1- $1062 = 425 \cdot 2 + 212$ $\text{OBEB}(1062, 425) = 1$
 $425 = 212 \cdot 2 + 1$
 $212 = 1 \cdot 212 + 0$
- 2- $\text{OBEB}(16, 24, 20) = [\text{OBEB}(16, 24), 20] = \text{OBEB}[\text{OBEB}(16, 24), 20]$
 $= \text{OBEB}(8, 20) = 4$
- 4- $\text{OBEB}(1260, 1760, 1772)$
 $\text{OBEB}(1260, 1760) = 20$ $\text{OBEB}(20, 1772) = 4 \text{ m}^2$ $1260 : 4 = 315 \text{ parsel}$
 $1760 = 1260 \cdot 1 + 500$ $1772 = 20 \cdot 138 + 12$ $1760 : 4 = 440 "$
 $1260 = 500 \cdot 2 + 260$ $20 = 12 \cdot 1 + 8$ $2772 : 4 = 695 "$
 $500 = 260 \cdot 1 + 240$ $12 = 8 \cdot 1 + 4$
 $260 = 240 \cdot 1 + 20$ $8 = 4 \cdot 2 + 0$
 $240 = 20 \cdot 12 + 0$

6- $a = b \cdot 8 + r_1$ $b = r_1 \cdot 2 + r_2$ $r_1 = r_2 \cdot 7 + r_3$ $\wedge$ $r_3 = 0$

$\text{OBEB}(a,b) = 12 = r_2$ $r_1 = r_2 \cdot 7 = 84$

$b = 2 \cdot 84 + 12 = 180$ $a = 180 \cdot 8 + 84 = 1524$

7-

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3
4	1	2	1	4	1	2	1	4	1	2	1	4
5	1	1	1	1	5	1	1	1	1	5	1	1
6	1	2	3	2	1	6	1	2	3	2	1	6
7	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1
8	1	2	1	4	1	2	1	8	1	2	1	4
9	1	1	3	1	1	3	1	1	9	1	1	3
10	1	2	1	2	5	2	1	2	1	10	1	2
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1
12	1	2	3	4	1	6	1	4	3	2	1	12

$xoy = \text{OBEB}(x,y)$

$\forall x \in A, \exists e \in A \quad xoe = eox$

birim yok
kapalılık var
birleşme var
ters eleman yok
deşleşme var.

8- $\text{OBEB}(a,b,c) = d$ ise d^2/ab ?

$\text{OBEB}(a,b,c) = d \Rightarrow (d/a \wedge d/b \wedge d/c)$

$\Rightarrow \exists k,r,t \in \mathbb{Z}, (a=kd \wedge b=rd \wedge c=td)$

$\Rightarrow ab = (kd)(rd) = krd^2 \Rightarrow ab = (kr)d^2$

$\Rightarrow d^2/ab$

9- $a \in \mathbb{Z}^+$ $(a, a+1) = 1$

$a+1 = a \cdot 1 + 1$

$a = 1 \cdot a + 0 \quad \text{OBEB}(a+1, a) = 1 \Rightarrow (a+1, a) = 1$

Bir Tamsayının Katları

Tanım: $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ve $n \in \mathbb{Z}$ olmak üzere na tamsayısına a 'nın n katı denir.

a 'nın tüm katlarının kümesi $\{k(a)\}$ ile gösterilecektir.

$\{k(a)\} = \{\dots, -na, \dots, -2a, -a, 0, a, 2a, \dots, na, \dots\}$

Örnek $2, 3$ ve -3 sayılarının katları kümesinin bazı elemanlarını yazalım.

$\{k(2)\} = \{\dots, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots\}$

$\{k(3)\} = \{\dots, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\}$

$\{k(-3)\} = \{\dots, 9, 6, 3, 0, -3, -6, -9, \dots\}$

$\{k(3)\} = \{k(-3)\}$

Sonuç $\{k(a)\} = \{k(-a)\}$

6- $a = b \cdot 8 + r_1$ $b = r_1 \cdot 2 + r_2$ $r_1 = r_2 \cdot 7 + r_3$ $\wedge$ $r_3 = 0$

$\text{OBEB}(a,b) = 12 = r_2$ $r_1 = r_2 \cdot 7 = 84$

$b = 2 \cdot 84 + 12 = 180$ $a = 180 \cdot 8 + 84 = 1524$

7-

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3
4	1	2	1	4	1	2	1	4	1	2	1	4
5	1	1	1	1	5	1	1	1	1	5	1	1
6	1	2	3	2	1	6	1	2	3	2	1	6
7	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1
8	1	2	1	4	1	2	1	8	1	2	1	4
9	1	1	3	1	1	3	1	1	9	1	1	3
10	1	2	1	2	5	2	1	2	1	10	1	2
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	2	3	4	1	6	1	4	3	2	1	12

$xoy = \text{OBEB}(x,y)$

$\forall x \in A, \exists e \in A \quad xoe = eox$

birim yok
kapalılık var
birleşme var
ters eleman yok
değişme var.

8- $\text{OBEB}(a,b,c) = d$ ise $d^2 | ab$?

$\text{OBEB}(a,b,c) = d \Rightarrow (d|a \wedge d|b \wedge d|c)$

$\Rightarrow \exists k,r,t \in \mathbb{Z}, (a=kd \wedge b=rd \wedge c=td)$

$\Rightarrow ab = (kd)(rd) = krd^2 \Rightarrow ab = (kr)d^2$

$\Rightarrow d^2 | ab$

9- $a \in \mathbb{Z}^+$ $(a, a+1) = 1$

$a+1 = a \cdot 1 + 1$

$a = 1 \cdot a + 0 \quad \text{OBEB}(a+1, a) = 1 \Rightarrow (a+1, a) = 1$

Bir Tamsayının Katları

Tanım: $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ve $n \in \mathbb{Z}$ olmak üzere na tamsayısına a 'nın n katı denir.

a 'nın tüm katlarının kümesi $\{k(a)\}$ ile gösterilecektir.

$\{k(a)\} = \{\dots, -na, \dots, -2a, -a, 0, a, 2a, \dots, na, \dots\}$

Örnek, 2, 3 ve -3 sayılarının katları kümesinin bazı elemanlarını yazalım.

$\{k(2)\} = \{\dots, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots\}$

$\{k(3)\} = \{\dots, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\}$

$\{k(3)\} = \{k(-3)\}$

$\{k(-3)\} = \{\dots, 9, 6, 3, 0, -3, -6, -9, \dots\}$

Sonuç, $\{k(a)\} = \{k(-a)\}$

Tanım: (Tamsayıların Ortak Katları):

Her ikisi de sıfırdan farklı iki a ve b tamsayılarının her ikisinin de katı olan tamsayıya bu iki sayının bir ortak katı denir. a ve b tamsayılarının ortak katlarının kümesi $\{OK(a,b)\}$ ile gösterilir.

$$\begin{aligned}\{OK(a,b)\} &= \{x : x \text{ a'nın bir katıdır ve } x \text{ b'nin bir katıdır}\} \\ &= \{x : x \in \{K(a)\} \wedge x \in \{K(b)\} = \{K(a)\} \cap \{K(b)\}\end{aligned}$$

Örnek: $+2$ ve 3 sayılarının $OK = ?$

$$\begin{aligned}\{OK(-2,3)\} &= \{K(-2)\} \cap \{K(3)\} \\ &= \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots\} \cap \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\} \\ &= \{\dots, -12, -6, 0, 6, 12, \dots\}\end{aligned}$$

Teorem: $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ olsun. $OBEB(a,b) = d$ ise $\{OK(a,b)\} = \{K[(a,b):d]\}$

İspat: 1°- $x \in \{OK(a,b)\} \Rightarrow (a/x \wedge b/x)$ O.k. tanımı. bölünebilirlik öz.

$$\Rightarrow \exists m, n \in \mathbb{Z}, x = ma \wedge x = nb$$

$$\Rightarrow ma = nb$$

$$OBEB(a,b) = d \Rightarrow (d/a \wedge d/b)$$

$$\Rightarrow \exists r, s \in \mathbb{Z}, a = rd \wedge b = sd \wedge (r,s) = 1$$

$$a = mrd = b = nsd \wedge (r,s) = 1$$

$$mr = ns \wedge (r,s) = 1 \Rightarrow (r/ns \wedge (r,s) = 1) \vee (s/mr \wedge (r,s) = 1)$$

$$\Rightarrow r/n \vee s/m$$

$$\exists t \in \mathbb{Z}, m = st$$

$$x = ma = mrd = nb = nsd$$

$$b:d = s \quad r = a:d$$

$$x = (a:d) std = (a:d) b \cdot t = [(ab):d] t \Rightarrow x \in \{K[(ab):d]\}$$

$$\Rightarrow \{OK(a,b)\} \subseteq \{K[(ab):d]\}$$

$$2^\circ - y \in \{K[(ab):d]\} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, y = k[(ab):d] = a(\overbrace{b:d})^n k = b(\overbrace{a:d})^m k$$

$$\Rightarrow \exists m, n \in \mathbb{Z}, y = a(nk) = b(mk)$$

$$\Rightarrow y \in \{OK(a,b)\}$$

$$\Rightarrow \{K[(ab):d]\} \subseteq \{OK(a,b)\}$$

$$\Rightarrow \{OK(a,b)\} = \{K[(ab):d]\}$$

ispat,, $\{OK(-18, 24)\} = \{k[(ab):d]\} = \{k(-72)\}$
 $OKEB(-18, 24) = 6 \quad [(ab):d] = \frac{-18 \cdot 24}{6} = -72 //$

Tanım: Herbiri sıfırdan farklı $a_1, a_2, \dots, a_n$ tamsayıları verildiğinde bu sayıların herbirinin katı olan tamsayıya bu sayıların ortak katı denir ve sembolik olarak bu sayıların ortak katları kümesi

$$\{OK(a_1, a_2, \dots, a_n)\} \text{ gösterilir.}$$

Teorem: Sıfırdan farklı a, b tamsayılarının pozitif ortak katlarının kümesinin bir en küçük elemanı vardır.

ispat,, $|a \cdot b|$ a ve b nin bir ortak katıdır (pozitif).

a ve b nin pozitif ortak katlarının kümesi, doğal sayılar kümesinin bir alt kümesidir.

Tanım: Sıfırdan farklı a, b tamsayılarının pozitif ortak katları kümesinin en küçük elemanına bu sayıların ortak katlarının en küçüğü denir. Sembolik olarak $OKEK(a, b)$ ile gösterilir.

Sonuç,, $OKEK(a, b) = OKEK(a, -b) = OKEK(-a, b) = OKEK(-a, -b)$

Teorem: a, b sıfırdan farklı iki tamsayı olsun. $OKEK(a, b) = k$ ise

$$\{OK(a, b)\} = \{K(k)\}$$

ispat,, 1- $\forall x \in \{K(k)\} \Rightarrow \exists r \in \mathbb{Z}, x = kr$

Ayrıca hipotezden, $OKEK(a, b) = k \Rightarrow (a/k \wedge b/k)$

$$\Rightarrow \exists p, q \in \mathbb{Z}, k = pa \wedge k = qb$$

$$\Rightarrow \exists r, p, q \in \mathbb{Z}, x = kr \wedge k = pa \wedge k = qb$$

$$\Rightarrow x = kr = par \wedge x = kr = qbr$$

$$\Rightarrow x = a(pr) \wedge x = b(qr)$$

$$\Rightarrow x \in \{OK(a, b)\}$$

$$\Rightarrow \{K(k)\} \subseteq \{OK(a, b)\}$$

$$2- \forall x \in \{OK(a, b)\} \stackrel{?}{\Rightarrow} x \in \{K(k)\} \stackrel{?}{\Rightarrow} k/x$$

Aksini farzedelim: $k \nmid x \wedge x \in \{OK(a, b)\} \wedge OKEK(a, b) = k$

$$\Rightarrow x = kq + r \wedge 0 \leq r < k \Rightarrow (a/x \wedge b/x) \wedge (a/k \wedge b/k) \wedge r = x - kq$$

$$\Rightarrow (a/r \wedge b/r) \wedge 0 \leq r < k$$

$$\Rightarrow r \in \{OK(a,b)\} \wedge 0 \leq r < k$$

Kabulümüz yanlıştır. $r=0$ dir. Yani k/x tir. (x, k 'nin bir katıdır.)

$$x \in \{k(k)\} \Rightarrow \{OK(a,b)\} \subseteq \{k(k)\}$$

$$\Rightarrow \{OK(a,b)\} = \{k(k)\}$$

Teorem, Pozitif bir k tamsayısının iki a, b tamsayılarının OKEK 'i olması için gerek ve yeter şart, $(k:a)$ ve $(k:b)$ tamsayılarının aralarında asal olmasıdır.

$$OKEK(a,b) = k \Leftrightarrow [(k:a), (k:b)] = 1$$

İspat, $1^\circ \Rightarrow : OKEK(a,b) = k \Rightarrow \exists p, q \in \mathbb{Z}, k = pa \wedge k = qb$

Ayrıca : $OBEB[(k:a), (k:b)] = OBEB(p,q) = d$

$$\Rightarrow \exists r, s \in \mathbb{Z}, p = rd \wedge q = sd \wedge (r,s) = 1$$

$$\Rightarrow k = pa = a(rd) \wedge k = qb = b(sd)$$

$$\Rightarrow k = (ar)d \wedge k = (bs)d$$

$$\Rightarrow [(k:d) = ar \wedge (k:d) = bs]$$

$$\Rightarrow (k:d) \text{ } a \text{ ve } b \text{ nin bir ortak katıdır.}$$

$$\Rightarrow (k:d) \in \{OK(a,b)\} \wedge OKEK(a,b) = k$$

$$\Rightarrow k \leq (k:d) \Rightarrow d=1 \text{ olmalıdır.}$$

$$\Rightarrow OBEB[(k:a), (k:b)] = 1$$

$$\Rightarrow [(k:a), (k:b)] = 1$$

Benzer şekilde yeter şart ispatlanabilir. Sonuç olarak,

$$OKEK(a,b) = 1 \Leftrightarrow [(k:a), (k:b)] = 1$$

Teorem, Her ikisi de sıfırdan farklı a, b tamsayıları için

$$OKEK(a,b) \cdot OBEB(a,b) = |ab|$$

İspat, $OBEB(a,b) = d \Rightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z}, a = ud \wedge b = vd \wedge (u,v) = 1$

$$\Rightarrow (av = uvd \wedge bu = uvd)$$

$$\Rightarrow [(\underbrace{uv}_k d) : a], [(\underbrace{uv}_k d) : b] = (v, u) = 1$$

$$\Rightarrow \text{OKEK}(a,b) = k = |uvd|$$

$$\Rightarrow |ab| = |ud \cdot vd| = |uvd \cdot d| = |uvd| \cdot d$$

$$\Rightarrow |ab| = \text{OKEK}(a,b) \cdot \text{OBEB}(a,b)$$

Sonuçlar :

1- $(a,b)=1$ ise $\text{OBEB}(a,b)=1 \Rightarrow |ab| = \text{OKEK}(a,b)$

2- $m \in \mathbb{Z}$, $\text{OKEK}(ma, mb) = ?$

$$|ma \cdot mb| = \text{OKEK}(ma, mb) \cdot \text{OBEB}(ma, mb)$$

$$|ab| = \text{OKEK}(a,b) \cdot \text{OBEB}(a,b)$$

$$|m|^2 |ab| = \text{OKEK}(ma, mb)$$

$$\text{OBEB}(ma, mb) = \text{OBEB}(|ma|, |mb|)$$

$$= \text{OBEB}(|m||a|, |m||b|)$$

$$= |m| \text{OBEB}(|a|, |b|)$$

$$= |m| \text{OBEB}(a,b)$$

$$|m|^2 |ab| = \text{OKEK}(ma, mb) = |m| \text{OBEB}(a,b)$$

$$\Rightarrow |m| |ab| = \text{OKEK}(ma, mb) = \text{OBEB}(a,b)$$

$$\Rightarrow |m| \text{OKEK}(a,b) \text{OBEB}(a,b) = \text{OKEK}(ma, mb) \text{OBEB}(a,b)$$

$$\Rightarrow \text{OKEK}(ma, mb) = |m| \text{OKEK}(a,b)$$

3- a/b ise $\text{OKEK}(a,b) = |b|$

4- $\text{OKEK}(a,a) = |a|$

5- $\text{OKEK}(a,1) = |a|$

Tanım : Sıfırdan farklı $a_1, a_2, \dots, a_n$ sayılarının pozitif ortak katları kümesinin en küçük elemanına bu sayıların OKEK 'i denir. Ve $\text{OKEK}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ile gösterilir.

Teorem: Herbiri sıfırdan farklı $a_1, a_2, \dots, a_n$ sayıları verilsin.

$$\text{OKEK}(a_1, a_2, \dots, a_n) = \text{OKEK}[\text{OKEK}(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n]$$

Problemler :

1 - 118 ve -26 sayılarının OKEK 'ini bulun ?

2 - 6, 8, 9, 12 sayılarının herbiriyle bölündüğünde 4 kalanını veren en küçük pozitif tam sayıyı bulun?

3- 3,11,13 sayılarının 1000 000 dan küçük kaç tane ortak katı vardır?

4- Bir fıçıda tahmini olarak 23 ile 65 lt arasında sirke vardır.

Bu sirkeyi 2lt'lik, 3lt'lik ve 4lt'lik kaplara tamamen boşaltmak mümkün olduğuna göre, fıçıda en az ve en çok kaç lt sirke olabilir?

5- 12 ve 18 ile bölünen 20 ile 100 arasındaki sayıların kümesi nedir?

6- $a \in \mathbb{Z}^+$ ise $\text{OKEK}(a, 2a+1) = ?$

7- $\text{OKEK}(24, 18, 52) = ?$

8- $a, b \in \mathbb{Z}^+$ olsun. $ab = 51840$ ve $\text{OKEK}(a, b) = 2160$ olacak şekilde $a = ?$ $b = ?$

Çözümler:

1- $\text{OKEK}(118, -26) = ?$

$$\text{OKEK}(a, b) \cdot \text{OBEB}(a, b) = |ab|$$

$$\text{OBEB}(118, -26) = \text{OBEB}(118, 26) = 2$$

$$\text{OKEK}(118, -26) \cdot 2 = |118 \cdot (-26)|$$

$$\Rightarrow \text{OKEK}(118, -26) = 118 \cdot 13 //$$

2- $\text{OKEK}(6, 8, 9, 12) = \text{OKEK}[(6, 8, 9), 12]$

$$\Rightarrow \text{OKEK}(\text{OKEK}(6, 8), 9) =$$

$$\text{OKEK}(6, 8) = \text{OBEB}(6, 8) = 6 \cdot 8$$

$$8 = 6 \cdot 1 + 2$$

$$6 = 2 \cdot 3 + 0$$

$$\text{OBEB}(6, 8) = 2$$

$$\text{OKEK}(6, 8) = 24$$

$$\Rightarrow \text{OKEK}(24, 9) = 72$$

$$24 = 9 \cdot 2 + 6$$

$$9 = 6 \cdot 1 + 3$$

$$6 = 3 \cdot 2 + 0$$

$$\text{OKEK}(24, 9) = 72$$

$$\Rightarrow \text{OKEK}(72, 12) = 72$$

$$72 + 4 = 76 //$$

3- $\text{OKEK}(3, 11, 13) = 3 \cdot 11 \cdot 13 = 33 \cdot 13 = 429$

$$\{\text{OK}(a, b)\} = \{K(k)\} \quad 1.000.000 : 429 = 2333 + \text{kalan}$$

4- $\text{OKEK}(2, 3, 4) = 12$

$$\{\text{OK}(2, 3, 4)\} = \{K(12)\} = \{12, 24, 36, 48, 60, 72, \dots\}$$

$$24 \leq x \leq 60 \quad \text{en az 24 lt, en çok 60 lt.}$$

6- $a \in \mathbb{Z}^+$ $\text{OKEK}(a, 2a+1) = a(2a+1)$ $(a, 2a+1) = 1 \Rightarrow \text{OKEK}(a, 2a+1) = 2a^2 + a //$

8- $\text{OKEK}(a, b) \cdot \text{OBEB}(a, b) = |ab|$

$$2160 \cdot \text{OBEB}(a, b) = 51840 \quad \text{OBEB}(a, b) = 24$$

$$\text{OBEB}(a,b)=d \Rightarrow (d/a \wedge d/b)$$

$$\Rightarrow \exists u,v \in \mathbb{Z}, a=ud \wedge b=vd \wedge (u,v)=1$$

$$\Rightarrow ab=(uvd).d$$

$$ab=uv.d^2$$

$$51840 = u.v(24)^2 \Rightarrow u.v=90 \wedge (u,v)=1$$

u	v	a=ud	b=vd		
1	90	1.24	24.90	a=24 b=24.90=2164	1
2	45	2.24	24.45	a=48 b=980	2
5	18	5.24	24.18	a=120 b=---	3
9	10	9.24	24.10	a=216 b=240	4

- Asal Sayılar -

Tanım: $-1, 0, 1$ den farklı bir p tamsayısının $-p, -1, 1$ ve p den başka böleni yoksa bu sayıya asal sayı denir. Asal olmayan ve $-1, 0, 1$ den farklı olan tamsayıya bileşik sayı denir.

Örnek, $2, -3, 5, -11, 41, -97, 8191$ asal sayılardır.

Teorem: p bir asal sayı ve q herhangi bir tamsayı olsun.

$p/q \vee (p,q)=1$ önermesi doğrudur.

İspat, p asal $\Rightarrow \text{OBEB}(p,q)=1 \vee \text{OBEB}(p,q)=|p|$

$$\Rightarrow (p,q)=1 \vee p/q$$

Teorem: $a,b \in \mathbb{Z}^+$ ve p asal olsun.

$$p/ab \Rightarrow (p/a \vee p/b)$$

İspat, 1° Eğer p/a ise teorem doğrudur.

$$2^\circ p \nmid a \text{ ise } \Rightarrow [(p,a)=1 \wedge p/ab] \Rightarrow p/b$$

Teorem: $a_1, a_2, \dots, a_n$ tamsayılar ve p bir asal sayı olsun. $n \in \mathbb{N}$ olmak üzere

$$p/\prod_{i=1}^n a_i \Rightarrow \exists a_i, p/a_i$$

İspat, Tümevarımla yapılacaktır,

$$1^\circ n=1, p/\prod_{i=1}^1 a_i = p/a_1$$

$2^\circ n=k$ için önerme doğru olsun.

$$p/\prod_{i=1}^k a_i \Rightarrow \exists a_i, p/a_i \text{ olsun.}$$

$$3^\circ n=k+1, p/\prod_{i=1}^{k+1} a_i \Rightarrow p/(\prod_{i=1}^k a_i) \cdot a_{k+1} \Rightarrow p/(\prod_{i=1}^k a_i) \vee p/a_{k+1}$$

$$\Rightarrow (\exists a_i, p/a_i) \vee p/a_{k+1} \Rightarrow \exists a_i, p/a_i$$

Teorem: (Aritmatik'in Temel Teoremi):

1'den büyük her tamsayı ya asaldır, ya da bu tamsayı, sıra önemli olmamak üzere asal sayıların çarpımı olarak tek türlü yazılır.

İspat // 1°) Varlığın ispatı: Tümevarımla yapılacak.

Teoremin şartlarını sağlayan tamsayıların kümesi D olsun.

$$1^0) \quad 2, 1'den \text{ büyük en küçük tamsayı} \Rightarrow 2 \in D$$

$$2^0) \quad 2 \leq k < a \text{ olmak üzere } k \in D \text{ olsun.}$$

$$3^0) \quad k+1=a \text{ için } \begin{cases} a \text{ asal ise } a \in D \\ a \text{ asal değilse } a = uv, u, v \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\Rightarrow (u < a \wedge v < a) \Rightarrow \begin{cases} u, v \text{ asal ise } u, v \in D \\ u, v \text{ asal değilse} \end{cases}$$

$$\Rightarrow u = p_1.p_2 \dots p_r \quad \wedge \quad v = q_1.q_2 \dots q_r \quad \text{asal sayıların çarpımı olarak yazılabilir.}$$

$$\Rightarrow a = uv = p_1.p_2 \dots p_r.q_1.q_2 \dots q_r \Rightarrow a \in D$$

2°) Tekliliğin ispatı: Aksini farzedelim. a tamsayısı asal sayıların çarpımı olarak iki türlü yazıldığını farzedelim.

$$a = p_1.p_2 \dots p_n \quad a = q_1.q_2 \dots q_r$$

$$\Rightarrow p_1.p_2 \dots p_n = q_1.q_2 \dots q_r \Rightarrow p_i/q_1.q_2 \dots q_r$$

$$\Rightarrow \exists q_i (i=1,2,\dots,n) \quad n/q_i$$

$$\Rightarrow p_1 = q_i \quad \wedge \quad p_2 = q_j \quad \wedge \dots \wedge p_n = q_k$$

Sonuç // 1°) $a = p_1.p_2 \dots p_n$

b sayısı için α tane çarpan p 'ye eşit

β tane " q 'ya eşit

λ " " t 'ye eşit olsun.

$$b = p^\alpha . q^\beta \dots t^\lambda : b'nin asal çarpanlara ayrılış biçimi.$$

2°) 1'den büyük her tamsayının en az bir asal böleni vardır.

3°) p asal sayısı bir a tamsayısının bir kuvvetini bölerse, a'yı da böler.

$$p/a^n \Rightarrow p/a =$$

$$p/a.a \dots a \Rightarrow p/a$$

Teorem: Pozitif bir tamsayının 1'den farklı bölenlerinin en küçüğü asal sayıdır.

İspat, a pozitif bir sayı olsun. a asal ise $\{1, a\}$ pozitif bölenleri

kümesidir. 1'den farklı olanı a 'dır ve asaldır.

a asal değilse $1 < p < q < \dots < a$

p asal ise teorem doğrudur.

p asal değilse $1 < p < p$ teorem doğrudur.

Teorem: Pozitif bir a bileşik sayısı verilsin. $k^2 \leq a$ olacak şekilde en büyük pozitif tamsayı k olsun. a 'nın k 'ya eşit veya k 'dan küçük olan en az bir asal böleni vardır.

İspat, a 'nın en az bir asal böleni vardır. Asal bölenlerin en küçüğü p olsun.

$\Rightarrow a = p a_1$ şeklinde yazılabilir. $\Rightarrow p < a_1$

Ayrıca $p < k$ kabul edelim ki, $k < p$ olsun.

$\Rightarrow (k < p \wedge p < a_1) \Rightarrow (k < p \wedge k < a_1) \Rightarrow (k+1 \leq p \wedge k+1 \leq a_1)$

$\Rightarrow (k+1)^2 \leq p a_1 \Rightarrow (k+1)^2 \leq a$ kabulümüz $k < p$ yanlıştır. $\Rightarrow p \leq k$ dir.

Soru, a asal mıdır? $k^2 \leq a < (k+1)^2$ veya $k^2 < a \leq (k+1)^2$ olacak şekilde pozitif k tamsayısı bulunur. k ya eşit veya küçük olan asal sayılar içinde a 'yı böleni varsa a bileşik sayı, yoksa a asal.

Örnek, 359 sayısının asal olup olmadığını araştırın.

$$359 \Rightarrow 18^2 \leq 359 < 19^2 \quad k=18$$

$\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17\}$ 359 asal sayıdır.

Örnek, $371 \Rightarrow 19^2 < 371 < 20^2$ $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$ 7 ile bölünür. asal değil.

Teorem: Pozitif asal sayıların kümesi sonsuz ve sayılabilir bir kümedir.

I - Pozitif asal sayılar kümesi, sonsuzdur? Aksini farzedelim. Yani pozitif asal sayılar kümesi, sonlu olsun. $\{2, 3, 5, 7, \dots, p\} = A$ olsun.

$a = (2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot p) + 1$ alalım.

a sayısı A nın elemanları ile bölündüğünde 1 kalanını verir. $a \notin A$

a asal $\Rightarrow A$ kümesi için tanım yanlıştır.

a asal değil $\Rightarrow a$ nın en az bir asal böleni vardır.

$\Rightarrow A$ 'nın tanımı yanlışdır $\Rightarrow A$ kümesi sonsuzdur.

II- Pozitif asal sayıların kümesi sayılabilir ve sonsuzdur.

Problemler :

- 1- 179, 539, 267, 781, 859, 937, 2287 sayılarının hangileri asaldır?
- 2- $B = \{x : x \text{ asal sayı ve } -10 < x < 30\}$ kümesinin elemanlarını yazın.
- 3- " $\forall n \in \mathbb{Z}^+, n^2 - n + 41$ asal sayıdır." önermesinin doğruluk değeri nedir?
- 4- $6n-1$ şeklinde yazılabilen asal sayıların kümesinin sonsuz olduğunu ispat edin.
- 5- 3 den büyük her asal sayının $6k+1$ veya $6k-1$ şeklinde yazılabileceğini göst.
- 6- 4 veya 4 ten büyük her çift sayının iki asal sayının toplamı olarak yazıldığı bilindiğine göre, 7'den büyük her tek doğal sayının 3 asal sayının toplamı olarak yazıldığını gösterin.

Çözümler :

1- $539 \Rightarrow 23^2 < 539 < 24^2 \quad \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$

$2287 \Rightarrow 47^2 < 2287 < 48^2$

$A = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47\}$

2- $\{-7, -5, -3, -2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}$

3- " $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ için $n^2 - n + 41$ asaldır."

$n=1, \quad 1^2 - 1 + 41 = 41$

$n=4, \quad 4^2 - 4 + 41 = 51$

5 61

20 421

41 41^2

4- $\{p_1, p_2, \dots, p_t\} = A \quad p_1 < p_2 < p_3 < \dots < p_t$

$$u = 6(p_1 p_2 \dots p_n) - 1 \quad A \text{ sonsuzdur.}$$

6- n tek ve $n > 7 \Rightarrow (n-3 > 4 \wedge n-3 \text{ çift}) \Rightarrow \exists p, q \text{ asal}, n-3 = p+q$

$n \in \mathbb{N} \Rightarrow n = 3 + p + q$

(Her tamsayı ya asaldır veya asal sayıların çarpımı olarak, sıra önemli olmamak üzere, asal sayıların çarpımı olarak, tek türlü olarak yazılır.)

Örnek,, 60 sayısının pozitif böleneri nedir?

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

1°) $2^0, 2^1, 2^2$ 60'in birer pozitif böleneridir.
1, 2, 4

2°) 3.1, 3.2, 3.4 'de 60 'in pozitif böleneridir.

3°) 5.1, 5.2, 5.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4 60 'in pozitif böleneridir.

$$\{B(60)\}^+ = \{1, 2, 4, 3, 6, 12, 5, 10, 20, 15, 30, 60\}$$

Bir a tamsayısının pozitif böleneri kümesinin eleman sayısını

$V(a)$ ile sembolik olarak gösterelim.

Teorem: Bir a^+ tamsayısının pozitif asal çarpanlarının kuvvetlerine göre yazılış biçimini $a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\alpha_r}$ olduğuna göre

$$V(a) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \dots (\alpha_r + 1) = \prod_{i=1}^r (\alpha_i + 1)$$

İspat,, a 'nın bir pozitif böleneri u olsun. $a = uv$ şeklinde bir v pozitif böleneri vardır.

$$u = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\beta_r} \text{ yazılabilir. } a = uv \text{ olduğundan}$$

$$\Rightarrow p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\alpha_r} = p_1^{\beta_1} \cdot p_1^{\beta_1} \cdot \dots \cdot p_r^{\beta_r} \Rightarrow p_1^{\alpha_1 - \beta_1} \cdot p_2^{\alpha_2 - \beta_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\alpha_r - \beta_r}$$

$$u = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\beta_r} \text{ ifadesinde } a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\alpha_r}$$

β_1 yerine $0, 1, 2, \dots, \alpha_1$ sayılarını verelim.

$\Rightarrow \alpha_1 + 1$ tane çarpan (bölener) bulunur.

β_2 yerine $0, 1, 2, \dots, \alpha_2$ sayılarını verelim.

$\Rightarrow \alpha_2 + 1$ tane çarpan (bölener) bulunur.

=====

β_r yerine $0, 1, 2, \dots, \alpha_r$ sayılarını verelim.

$\Rightarrow \alpha_r + 1$ tane çarpan (bölener) bulunur.

$$V(a) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \dots (\alpha_r + 1)$$

Örnek,, 1400 sayısının pozitif ^{asal} bölenleri kaç tanedir?

$$1400 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^1$$

$$P_1 = 2, \alpha_1 = 3; P_2 = 5, \alpha_2 = 2; P_3 = 7, \alpha_3 = 1$$

$$V(1400) = (3+1)(2+1)(1+1) = 24 \text{ tane}$$

Pozitif bölenleri $\Rightarrow$

$$1-) 2^0 = 1, 2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8 \quad 1400 \text{ ün pozitif bölenleridir}$$

$$2-) 5^0 = 1, 5^1 = 5, 5^2 = 25 \quad " \quad "$$

$$3-) 5 \cdot 2, 5 \cdot 4, 5 \cdot 8, 25 \cdot 2, 25 \cdot 4, 25 \cdot 8 \quad " \quad "$$

$$4-) 7 \cdot 1 = 7, 7 \cdot 2, 7 \cdot 4, 7 \cdot 8, 7 \cdot 5, 7 \cdot 25, 7 \cdot 5 \cdot 2, 7 \cdot 5 \cdot 4, 7 \cdot 5 \cdot 8, 7 \cdot 25 \cdot 2, 7 \cdot 25 \cdot 4, \\ 7 \cdot 25 \cdot 8, 1400 \text{ ün pozitif bölenleridir.}$$

Teorem: Pozitif bir a tamsayısının pozitif bölenlerinin sayısı $V(a)$ ise

a 'nın pozitif bölenlerinin çarpımı,

$$a^{1/2} V(a) \text{ dir.}$$

İspat,, a 'nın pozitif bir böleni u olsun. $a = u \cdot v$ şeklinde yazılabilir.

v 'de pozitif bir bölen dir. a 'nın pozitif bölenlerinin kümesi,

$$A = \{1, a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a\}$$

$$1 < a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_{n-2} < a_{n-1} < a$$

$$u=1 \Rightarrow v=a \Rightarrow a = 1 \cdot a = a \cdot 1$$

$$u=a_1 \Rightarrow v=a_{n-1} \Rightarrow a = a_1 \cdot a_{n-1} = a_{n-1} \cdot a_1$$

$$u=a_2 \Rightarrow v=a_{n-2} \Rightarrow a = a_2 \cdot a_{n-2} = a_{n-2} \cdot a_2$$

$$a^{V(a)} = (1 \cdot a)(a_1 \cdot a_{n-1})(a_2 \cdot a_{n-2}) \dots (a_{n-2} \cdot a_2)(a_{n-1} \cdot a_1)(a \cdot 1)$$

$$\Rightarrow a^{V(a)} = (1 \cdot a_1 \cdot a_2 \dots a_{n-2} \cdot a_{n-1} \cdot a)^2$$

$$\Rightarrow a^{1/2 V(a)} = (1 \cdot a_1 \cdot a_2 \dots a_{n-2} \cdot a_{n-1} \cdot a)$$

Örnek,, 60 'ın pozitif bölenlerinin çarpımı nedir?

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^1$$

$$V(60) = 3 \cdot 2 \cdot 2 = 12 \text{ tane}$$

$$60^{1/2 V(60)} = 60^6 = 46656000000$$

$$\sigma(a) = \frac{p_1^{\alpha_1+1}-1}{p_1-1} \cdot \frac{p_2^{\alpha_2+1}-1}{p_2-1} \cdots \frac{p_r^{\alpha_r+1}-1}{p_r-1}$$

yani $a = uv \wedge (u, v) = 1$ olsun. u 'nun pozitif bölenleri,

 $1, u_1, u_2, \dots, u$

v 'nin pozitif bölenleri, $1, v_1, v_2, \dots, v$

Eğer d/a ise $d = v_i v_i$ şeklinde yazılabilir.

1- $1.1, 1.11, 1.111, \dots, 1.1$ da a 'nın böleneridir.

2- $V_{1,1}, V_{1,01}, V_{1,02}, \dots, V_{1,0}$ " " "

3- $V_2.1, V_2.U_1, V_2.U_2, \dots, V_2.U$ " " "

$V_1, W_1, V_2, \dots, V_n$ " " "

$$\sigma(\phi) = 1 \cdot 1 + 1 \cdot u_1 + 1 \cdot u_2 + \dots + 1 \cdot u + v_1 \cdot 1 + v_1 \cdot u_1 + \dots + v_2 \cdot u + v_2 \cdot 1 + v_2 \cdot u_1 + \dots + v_2 \cdot u \\ \dots + v \cdot 1 + v \cdot u_1 + \dots + u \cdot v$$

$$= \sigma(u) + v_1 \cdot \sigma(u) + v_2 \sigma(u) + \dots + v \sigma(u)$$

$$= \sigma(u) (1 + v_1 + v_2 + \dots + v)$$

$$= \sigma(u) \sigma(v)$$

$$\Rightarrow [a = u \cdot v \wedge (u, v) = 1] \Rightarrow \sigma(a) = \sigma(u) \cdot \sigma(v)$$

$$\Rightarrow a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r} \Rightarrow \sigma(a) = \sigma(p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r})$$

$$\Rightarrow \sigma(2) = \sigma(p_1^{\alpha_1}) \sigma(p_2^{\alpha_2}) \dots \sigma(p_r^{\alpha_r})$$

p^2 nin pozitif bölenleri (p asal)

$$\rho^0 = 1, \rho^1 = \rho, \rho^2, \rho^3, \dots, \rho^\alpha$$

$$\Rightarrow \sigma(p^\alpha) = 1 + p + p^2 + p^3 + \dots + p^\alpha$$

$$p.\sigma(p^\alpha) = p + p^2 + p^3 + p^4 + \dots + p^\alpha + p^{\alpha+1}$$

$$\sigma(p^\alpha)(p-1) = p^{\alpha+1} - 1 \Rightarrow \sigma(p^\alpha) = \frac{p^{\alpha+1} - 1}{p-1}$$

$$\Rightarrow \sigma(a) = \frac{p_1^{\alpha_1+1}-1}{p_1-1} \cdot \frac{p_2^{\alpha_2+1}-1}{p_2-1} \cdots \frac{p_r^{\alpha_r+1}-1}{p_r-1}$$

a 'nın pozitif bölenleridir.

Örnek, 120 sayısının pozitif bölenleri toplamı nedir?

$$120 = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^1$$

$$\sigma(a) = \frac{p_1^{\alpha_1+1}-1}{p_1-1} \cdot \frac{p_2^{\alpha_2+1}-1}{p_2-1} \cdots \frac{p_r^{\alpha_r+1}-1}{p_r-1}$$

$$\left. \begin{array}{l} p_1=2 \quad \alpha_1=3 \\ p_2=3 \quad \alpha_2=1 \\ p_3=5 \quad \alpha_3=1 \end{array} \right\} \sigma(120) = \frac{2^{3+1}-1}{2-1} \cdot \frac{3^{1+1}-1}{3-1} \cdot \frac{5^{1+1}-1}{5-1} = \frac{2^4-1}{1} \cdot \frac{3^2-1}{2} \cdot \frac{5^2-1}{4}$$

$$= 15 \cdot 4 \cdot 6 = 360$$

Tanım: (Mükemmel - Perfect - Yetkin Sayı) :

$a \in \mathbb{Z}$ olsun. $\sigma(a) = 2a$ ise a sayısına mükemmel (yetkin) sayı denir.

Örnek, 28 sayısı yetkin midir?

$$28 = 2^2 \cdot 7$$

$$\sigma(28) = \frac{2^{2+1}-1}{2-1} \cdot \frac{7^{1+1}-1}{7-1} = 7 \cdot 8 = 56 = 2 \cdot 28 \text{ yetkindir.}$$

Teorem: $p \in \mathbb{Z}^+$ olsun. $2^p - 1$ asal sayı ise $2^{p-1}(2^p - 1)$ şeklinde yazılan her tamsayı yetkindir.

İspat, $a = 2^{p-1}(2^p - 1)$ olsun. $2^p - 1 = n$ olsun.

$$a = 2^{p-1} \cdot n \Rightarrow \sigma(a) = \sigma(2^{p-1}) \sigma(n) = \frac{2^p - 1}{2 - 1} (1 + n)$$

$$\Rightarrow \sigma(a) = (2^p - 1) 2^p = 2 \cdot \underbrace{2^{p-1}(2^p - 1)}_a \Rightarrow \sigma(a) = 2a = 2|a|$$

Örnek, $p=5$, $2^p - 1 = 2^5 - 1 = 31$ asaldır.

496 sayısı, $496 = 31 \cdot 16 = 2^4 \cdot 31 = 2^{5-1} \cdot (2^5 - 1)$ yetkindir.

Tanım: (Çok Katlı Yetkin Sayı) :

$a, k \in \mathbb{Z}^+$ olsun. $\sigma(a) = (k+1)a$ ise a sayısına k . dereceden yetkin sayı denir. (k . sınıftan yetkin sayı denir.) k : çok katlı yetkin sayının sınıfı denir.

Örnek, 120 sayısı kaçinci sınıftan yetkin sayıdır?

$$\sigma(120) = 360 = 3 \cdot 120 \quad k+1=3 \quad k=2$$

2. dereceden(sınıftan) yetkin sayıdır.

1 - 540 sayısının pozitif bölenlerinin sayısını, çarpımını, toplamını, kümesini ?

2 - 680, 1275, 1321 sayılarının pozitif bölenlerinin toplamını ?

3 - 8128 sayısı yetkin sayı mıdır ?

Çözümler :

$$1 - 540 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^1$$

$$\nu(540) = (2+1)(3+1)(1+1) = 3 \cdot 4 \cdot 2 = 24 \text{ tane böleni var.}$$

$$540^{1/2 \nu(24)} = 540^{12} \text{ çarpımı}$$

$$\sigma(540) = \frac{2^{2+1}-1}{2-1} \cdot \frac{3^{3+1}-1}{3-1} \cdot \frac{5^{1+1}-1}{5-1} = 7 \cdot 40 \cdot 6 = 1680 \text{ toplamı}$$

$$2^0 \cdot 2^1 \cdot 2^2 \quad 1, 4, 4 \quad 3^1, 3^2, 3^3, 5^1 \quad 3, 7, 27, 5$$

$$3 \cdot 1, 3 \cdot 2, 3 \cdot 4, 3^2 \cdot 1, 3^2 \cdot 2, 3^2 \cdot 4, 3^3 \cdot 1, 3^3 \cdot 2, 3^3 \cdot 4, 5 \cdot 1, 5 \cdot 2, 5 \cdot 4, 5 \cdot 3, 5 \cdot 3^2, 5 \cdot 3^3$$

$$5 \cdot 3 \cdot 2, 5 \cdot 3 \cdot 4, 5 \cdot 9, 5 \cdot 9 \cdot 2, 5 \cdot 9 \cdot 4, 5 \cdot 27, 5 \cdot 27 \cdot 2, 5 \cdot 27 \cdot 4$$

$$\{1, 2, 4, 3, 9, 27, 5, 6, 12, 18, 36, 54, 108, 10, 20, 15, 45, 135, 30, 60, 90, 180, 270\}$$

$$3 - 8128 = 2^6 \cdot 127$$

$$\sigma(8128) = \frac{2^7-1}{2-1} \cdot \frac{127^2-1}{127-1} = 127 \cdot \frac{127^2-1}{126} = 2 \cdot 8128 \text{ yetkin sayıdır.}$$

- MODÜLER ARİTMETİK -

Tanım : $m \in \mathbb{Z}^+$ olsun. $x, y \in \mathbb{Z}$ için $x-y$ sayısı m sayısına bölünüyorsa x sayısı y sayısına m modülüne göre denktir denir. Ye

$$x \equiv y \pmod{m} \Leftrightarrow m \mid x-y$$

şeklinde gösterilir. $u, v \in \mathbb{Z}$ olmak üzere u ve v tam sayılarının m modülüne göre denk olmadığı

$$u \not\equiv v \pmod{m} \text{ şeklinde gösterilir.}$$

$$\text{Örnek,, } 5 \mid 13-3 \Rightarrow 13 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$\text{Örnek,, } 7 \mid -12-2 \Rightarrow -12 \equiv 2 \pmod{7}$$

1. Teorem : $x, y \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z}^+$ olsun. $x \equiv y \pmod{m} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}$ için $x = y + mk$ olmasıdır.

$$\Rightarrow \text{kabul edelim ki, } x \equiv y \pmod{m} \text{ olsun}$$

$$\Rightarrow m \mid x-y$$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \text{ vardır ki } x-y = mk \text{ dir. } \Rightarrow x = y + mk$$

$\Leftarrow$: kabul edelim ki $\exists k \in \mathbb{Z}$ için $X = y + mk$ olsun.

$$\Rightarrow X - y = mk \text{ dir.}$$

$$\Rightarrow m \mid X - y$$

$$\Rightarrow X \equiv y \pmod{m}$$

2. Teorem: $X, y \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}^+$ olsun. $X \equiv y \pmod{m}$ olması için X ile y 'nin m ile bölünmesinden elde edilen kalanların eşit olması gerekir ve yeter.

İspat // $\Rightarrow$ kabul edelim ki $X = y \pmod{m}$ olsun.

$$X = mp + r, \quad 0 \leq r < m \text{ dir.} \quad \text{--- (1)}$$

$$y = mq + s, \quad 0 \leq s < m \text{ vardır.}$$

$$r \stackrel{?}{=} s \quad X \equiv y \pmod{m} \Rightarrow m \mid X - y$$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, X - y = mk$$

$$\Rightarrow X = y + mk$$

$$\Rightarrow X = mq + s + mk$$

$$\Rightarrow X = m(q+k) + s \quad \text{--- (2)}$$

① ve ② den dolayı $r = s$ dir.

$$\Leftarrow : X = mp + r, \quad 0 \leq r < m$$

$$y = mq + s, \quad 0 \leq s < m \quad \text{kabul edelim ki } r = s \text{ olsun.}$$

$$X = mp + r \Rightarrow r = X - mp \quad \left. \begin{array}{l} X - mp = y - mq \\ X - y = mp - mq = m(p - q) \end{array} \right\}$$

$$y = mq + s \Rightarrow s = y - mq$$

$$m \mid X - y \Rightarrow X \equiv y \pmod{m}$$

3. Teorem: $X, y, z, w, u, v \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere

$X \equiv y \pmod{m}$ ve $z \equiv w \pmod{m}$ ise aşağıdaki önermeler doğrudur.

a) $X + u \equiv y + u \pmod{m}$

b) $Xu \equiv yu \pmod{m}$

c) $X + z \equiv y + w \pmod{m}$

d) $X - z \equiv y - w \pmod{m}$

e) $Xz \equiv yw \pmod{m}$

f) $uX + vZ \equiv uy + vw \pmod{m}$ dir.

ispat// a- $x \equiv y \pmod{m} \Rightarrow m \mid x-y$ (mod tanımı)

$$\Rightarrow x-y = mk, \exists k \in \mathbb{Z} \text{ (hipotezden)}$$

$$\Rightarrow x = y + mk \text{ (x'i çeverek)}$$

$$\Rightarrow x+u = y+mk+u \text{ (her iki tarafa u ekleyerek)}$$

$$\Rightarrow (x+u) = (y+u) + mk \text{ (+nın değişme öz.)}$$

$$\Rightarrow x+u \equiv y+u \pmod{m} \text{ (mod tanımı)}$$

b- $xu \equiv yu \pmod{m} \Rightarrow m \mid x-y$

$$\Rightarrow x = y + mk$$

$$\Rightarrow xu = (y + mk)u$$

$$\Rightarrow xu = yu + mku$$

$$\Rightarrow xu \equiv yu \pmod{m}$$

4. Teorem: $x, y \in \mathbb{Z}$ ve $m, n \in \mathbb{Z}^+$ olsun.

$$x \equiv y \pmod{m} \Rightarrow x^n \equiv y^n \pmod{m} \text{ dir.}$$

ispat// Tümevarımla yapılacaktır.

5. Teorem: $x, y, z \in \mathbb{Z}$ ve $m \in \mathbb{Z}^+$ olsun.

$$zx \equiv zy \pmod{m}, \text{OBEB}(z, m) = d \text{ ve } m = dm' \text{ ise,}$$

$$x \equiv y \pmod{m'} \text{ olur.}$$

ispat// $zx = zy \pmod{m}$ $\text{OBEB}(z, m) = d$ ve $m = dm'$ olsun.

$$\text{OBEB}(z, m) = d \Rightarrow d \mid z \text{ dir.}$$

$$z = dz' \text{ olacak şekilde } \exists z' \in \mathbb{Z} \text{ vardır.}$$

$$zx = zy \pmod{m} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \text{ için } zx = zy + mk \text{ dir.}$$

$$\Rightarrow dz'x = dz'y + dm'k$$

$$\Rightarrow d'z'x = d'(z'y + m'k)$$

$$\Rightarrow z'x = z'y + m'k$$

$$\Rightarrow z'(x-y) = m'k \quad [\text{Ödev}(m', z') = 1]$$

$$\Rightarrow m' \mid x-y \Rightarrow x \equiv y \pmod{m'} \text{ dir.}$$

6. Teorem: $x \equiv y \pmod{m}$ ve $d \mid m$ ise $x \equiv y \pmod{d}$ dir.

ispat// $x \equiv y \pmod{m} \Rightarrow m \mid x-y$ $d \mid m \Rightarrow$ genişletme öz.-den $d \mid x-y$ dir.

$$\Rightarrow x \equiv y \pmod{d} \text{ dir.}$$

Örnek, $47 \equiv (-1) \pmod{12}$ ise

$$3/12 \text{ ve } 4/12 \Rightarrow 47 \equiv (-1) \pmod{3}$$

$$47 \equiv (-1) \pmod{4}$$

7. Teorem: $x, y \in \mathbb{Z}$, $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}^+$ ve $\text{OKEK}(m_1, m_2) = m$ olsun.

$$x \equiv y \pmod{m} \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{m_1} \text{ ve } x \equiv y \pmod{m_2} \text{ dir.}$$

İspat, $\Rightarrow$ $\text{OKEK}(m_1, m_2) = m$, $x \equiv y \pmod{m}$ olsun.

$$m/m_1 \text{ ve } m/m_2$$

$$6. \text{ teoremden dolayı, } x \equiv y \pmod{m_1}, x \equiv y \pmod{m_2}$$

$$\Leftarrow x \equiv y \pmod{m_1} \text{ ve } x \equiv y \pmod{m_2} \text{ olsun.}$$

$$\begin{aligned} \text{OKEK}(m_1, m_2) = m \quad \left. \begin{array}{l} x \equiv y \pmod{m_1} \Rightarrow m_1 | x-y \\ x \equiv y \pmod{m_2} \Rightarrow m_2 | x-y \end{array} \right\} \text{OKEK}(m_1, m_2) = m \text{ olduğundan,} \\ m | x-y \Rightarrow x \equiv y \pmod{m} \end{aligned}$$

Örnek, $32 \equiv 104 \pmod{8}$ $\wedge$ $32 \equiv 104 \pmod{12}$ ve $\text{OKEK}(8, 12) = 24$ ise

$$32 \equiv 104 \pmod{24} \text{ önermesi de doğrudur.}$$

Teorem: (Genelleştirme) $m_i - (i=1, 2, \dots, n) \in \mathbb{Z}^+$ $(m_i, m_j) = 1$ olsun

$$x \equiv y \pmod{m_i} \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{m_1, m_2, \dots, m_n}$$

Sonuç, Pozitif bir m tamsayısının asal sayıların kuvvetlerine göre yazılış

$$\text{biçimi, } m = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\alpha_r} \text{ olsun.}$$

$$x \equiv y \pmod{m} \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{p_i^{\alpha_i}}$$

Örnek, $425 \equiv 5 \pmod{60}$ $\wedge$ $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$

$$\Rightarrow 425 \equiv 5 \pmod{2^2} \wedge 425 \equiv 5 \pmod{3} \wedge 425 \equiv 5 \pmod{5}$$

Teorem: $x, y \in \mathbb{Z}$ ve $m \in \mathbb{Z}^+$ ve $x \equiv y \pmod{m}$ olsun.

$$[(x:d)=u \text{ ve } (y:d)=v \text{ ve } (m:d)=n] \Rightarrow u \equiv v \pmod{n}$$

İspat, a) $(x:d)=u \wedge (y:d)=v \wedge (m:d)=n \Rightarrow x=ud \wedge y=vd \wedge m=nd$

$$b) x \equiv y \pmod{m} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, x=y+km$$

$$\Rightarrow ud=vd=k(nd) \Rightarrow ud=(v+kn)d \Rightarrow u=v+kn \Rightarrow u \equiv v \pmod{n}$$

Örnek, $28 \equiv 12 \pmod{8} \Rightarrow 7 \cdot 4 \equiv 3 \cdot 4 \pmod{2 \cdot 4} \Rightarrow 7 \equiv 3 \pmod{2}$

- 1- 3^{100} ün 5 modülüne göre denk olduğu en küçük pozitif tamsayı nedir?
- 2- $\sum_{i=1}^5 i \equiv x \pmod{7}$ ise $x = ?$ (en küçük $x \in \mathbb{Z}^+$)
- 3- $23^{2n+1} + 1 \equiv x \pmod{24}$ bağıntısını sağlayan en küçük pozitif $x = ?$
- 4- $3^{2n} + 7 \equiv 0 \pmod{8}$
- 5- $a, b \in \mathbb{Z}^+$, $a < m$ 1 $b < m$ olsun. $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow a = b$ old. isp.?
- 6- $a, b \in \mathbb{Z}^+$ ve m asal olsun. $(a+b)^m \equiv a^m + b^m \pmod{m}$ old. isp.?

Çözümler :

$$1- \quad 3^{100} \equiv x \pmod{5} \quad 3^2 \equiv 2 \pmod{5}$$

$$3 \equiv 3 \pmod{5} \quad 3^4 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$3^2 \equiv 4 \pmod{5} \quad (3^4)^{25} \equiv 3^{100} \equiv 1^{25} \pmod{5} \Rightarrow 3^{100} \equiv 1 \pmod{5} //$$

$$2- \quad \sum_{i=1}^5 x \pmod{7} \equiv \frac{5 \cdot 6}{2} \equiv 15$$

$$15 \equiv 1 \pmod{7} \quad x = 1 //$$

$$3- \quad 23 \equiv -1 \pmod{24} \quad x \equiv y \pmod{m} \Rightarrow x^n \equiv y^n \pmod{m}$$

$$\Rightarrow 23^2 \equiv (-1)^2 \pmod{24}$$

$$\Rightarrow 23^2 \equiv 1 \pmod{24}$$

$$\Rightarrow (23^2)^n \equiv 23^{2n} \equiv 1^n \pmod{24}$$

$$\Rightarrow 23^{2n} \equiv 1 \pmod{24}$$

$$\Rightarrow 23^{2n} \cdot 23 \equiv 1 \cdot 23 \pmod{24} \equiv 23^{2n+1} \equiv 23 \pmod{24}$$

$$+ 1 \equiv 1 \pmod{24}$$

$$23^{2n+1} + 1 \equiv 0 \pmod{24}$$

$$4- \quad 3^{2n} + 7 \equiv 0 \pmod{8}$$

$$\Rightarrow 3 \equiv 3 \pmod{8}$$

$$\Rightarrow 3^2 \equiv 1 \pmod{8}$$

$$\Rightarrow (3^2)^n \equiv 1^n \pmod{8}$$

$$\Rightarrow 3^{2n} \equiv 1 \pmod{8} \Rightarrow 7 \equiv 7 \pmod{8}$$

$$+ 3^{2n} \equiv 1 \pmod{8}$$

$$3^{2n} + 7 \equiv 0 \pmod{8}$$

5- $a, b \in \mathbb{Z}^+$, $a < m \wedge b < m \Rightarrow a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow a \stackrel{?}{=} b$

$$a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow m \mid a-b \wedge a-b < mn \Rightarrow a > b$$

$$\Rightarrow a-b=0 \Rightarrow a=b$$

6- $a, b \in \mathbb{Z}^+$, m asal $\Rightarrow (a+b)^m \equiv a^m + b^m \pmod{m}$

$$(a+b)^m = \sum_{i=0}^m \binom{m}{i} a^{m-i} \cdot b^i = \binom{m}{0} a^m b^0 + \binom{m}{1} a^{m-1} b^1 + \binom{m}{2} a^{m-2} b^2 + \dots + \binom{m}{m-2} a^{m-(m-2)} b^{m-2} + \binom{m}{m-1} a^{m-(m-1)} b^{m-1} + \binom{m}{m} a^{m-m} b^m$$

$$(a+b)^m = a^m + m a^{m-1} b + m(m-1) a^{m-2} b^2 + \dots + \frac{m(m-1)}{2} a^2 b^{m-2} + m a \cdot b^{m-1} + b^m$$

$$(a+b)^m - [a^m + b^m] = mk, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow (a+b)^m \equiv a^m + b^m \pmod{m}$$

Kalan Sınıfları

Tamsayılar kümesinde m modülüne göre denk olma bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. (yansıma, simetri, geçişmeli)

İspat,, $x \equiv y \pmod{m} \Rightarrow m \mid x-y \Leftrightarrow \beta$

1° $\forall x \in \mathbb{Z}$ için $x-x=0 \Rightarrow m \mid 0 \Rightarrow x \equiv x \pmod{m} \Rightarrow (x,x) \in \beta$

2° $x, y \in \mathbb{Z}$ için $(x,y) \in \beta \Rightarrow x \equiv y \pmod{m} \Rightarrow m \mid x-y \Rightarrow m \mid -(y-x) \Rightarrow m \mid y-x \Rightarrow y \equiv x \pmod{m} \Rightarrow (y,x) \in \beta$

3° Ödev,,

Tanım: m modülüne göre denk olma denklik bağıntısının, tamsayılar kümesinden ayırdığı denklik sınıflarına, m 'nin kalan sınıfları denir.

$$\forall x \in \mathbb{Z} \text{ için } \bar{x} = \{y: y \in \mathbb{Z} \wedge y \equiv x \pmod{m}\}$$

Teorem: $\mathbb{Z}'$ de tanımlı m modülüne göre denk olma bağıntısının $\mathbb{Z}'$ den ayırdığı farklı denklik sınıfı sayısı m tane dir.

İspat,, Herhangi bir tamsayının m 'ye bölümünde bulunan kalanlar;

$$0, 1, 2, 3, \dots, m-1 \text{ sayılarından birisidir. (m tane dir.)}$$

Bu m tane kalan birbirinden farklıdır. Bunların denklik sınıfları;

$$\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \dots, \bar{m-1} \text{ (m tane dir.)}$$

$$\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \dots, \bar{m-1}\} \text{ kümesi } \mathbb{Z} \text{ nin bir ayrımıdır.}$$

$$\mathbb{Z}/m = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{m-1}\}$$

Buna göre, $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{Z}/m$ olmak üzere, $a \in \bar{x} \Rightarrow x \equiv a \pmod{m}$

$$b \in \bar{y} \Rightarrow y \equiv b \pmod{m}$$

$$1^\circ \quad x+y \equiv (a+b) \pmod{m} \Leftrightarrow \overline{x+y} = \overline{a+b}$$

$$2^\circ \quad xy \equiv ab \pmod{m} \Leftrightarrow \overline{xy} = \overline{ab}$$

Tanım: $(\mathbb{Z}/m$ de Toplama):

$$\oplus : \mathbb{Z}/m \times \mathbb{Z}/m \longrightarrow \mathbb{Z}/m$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) \longrightarrow \bar{x} \oplus \bar{y} = \overline{x+y} \quad \text{olarak tanımlanan bu işleme } \mathbb{Z}/m \text{ de}$$

kalanlı toplama denir.

Tanım: $(\mathbb{Z}/m$ de Çarpma):

$$\odot : \mathbb{Z}/m \times \mathbb{Z}/m \longrightarrow \mathbb{Z}/m$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) \longrightarrow \bar{x} \odot \bar{y} = \overline{xy} \quad " \quad " \quad " \quad "$$

kalanlı çarpma denir.

Teorem: $\mathbb{Z}/m = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{m-1}\}$ kümesi verildiğinde $(\mathbb{Z}/m, \oplus, \odot)$ matematik yapısı birim elementli komütatif bir halkadır.

İspat, $(\mathbb{Z}/m, \oplus, \odot)$

I- $(\mathbb{Z}/m, \oplus)$ bir abel grubudur ?

a) Birim element $\forall \bar{x} \in \mathbb{Z}/m \wedge \exists e \in \mathbb{Z}/m, \bar{x} \oplus e = e \oplus \bar{x} = \bar{x}$
(sıfır)

$$\bar{x} \oplus e = \bar{x} \quad e = \bar{y} \Rightarrow \bar{x} \oplus \bar{y} = \bar{x} \Rightarrow \overline{x+y} = \bar{x} \Rightarrow x+y \equiv x \pmod{m}$$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, x+y = x+km \Rightarrow y = km \Rightarrow y \equiv 0 \pmod{m}$$

$$\Rightarrow \bar{y} = \boxed{\bar{0} = e} \quad (\text{kapalılık, birleşme, değişme, ters element = ödev})$$

II- a) Birim element ($\odot$ işlemine göre)

$$\forall \bar{x} \in \mathbb{Z}/m \Rightarrow \bar{x} \odot e = e \odot \bar{x} = \bar{x}$$

$$\Rightarrow \bar{x} \odot e = \bar{x} \Rightarrow \bar{x} \odot \bar{y} = \bar{x} \Rightarrow \overline{xy} = \bar{x} \Rightarrow xy \equiv x \pmod{m}$$

$$e \in \mathbb{Z}/m, e = \bar{y}$$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, xy = x+km \Rightarrow xy - x = km \Rightarrow x(y-1) = km$$

$$\Rightarrow m/x(y-1), \forall x \in \mathbb{Z} \Rightarrow m/x(y-1) \wedge (m, x) = 1 \Rightarrow m/y-1$$

$$\Rightarrow y \equiv 1 \pmod{m} \Rightarrow \bar{y} = e = \bar{1}$$

III - Dağılma özelliği vardır. $\Rightarrow (Z/m, +, \cdot)$

Teorem: m asal sayı ise $\mathbb{Z}/m$ bir birlik bölgesidir.

İspat// $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{Z}/m$ olsun. $\bar{x} \odot \bar{y} = \bar{0} \Rightarrow (\bar{x} = \bar{0} \vee \bar{y} = \bar{0})$

$$\overline{x} \odot \overline{y} = \overline{0} \Rightarrow xy \equiv 0 \pmod{m} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, xy = km$$

$$\Rightarrow m \mid xy \Rightarrow (m \mid x \vee m \mid y) \Rightarrow [x \equiv 0 \pmod{m} \vee y \equiv 0 \pmod{m}]$$

$$\Rightarrow (\bar{x} = \bar{0} \vee \bar{y} = \bar{0})$$

$$m=10, \bar{x}=\bar{2} \wedge \bar{y}=\bar{5} \Rightarrow \bar{x} \odot \bar{y} = \bar{2} \odot \bar{5} = \bar{0}$$

Teorem: m asal sayı ise $(\mathbb{Z}/m, \oplus, \odot)$ bir cisimdir.

$\mathbb{Z}/m - \{\bar{0}\}$ kümesinin ters eleman özelliği vardır. ?

$$\forall x \in \mathbb{Z}/m - \{\bar{0}\} \Rightarrow \bar{x} \neq \bar{0} \Rightarrow x \not\equiv 0 \pmod{m} \Rightarrow m \nmid x \Rightarrow \text{ob} \in \beta(m, x) = 1$$

$$\Rightarrow (m, X) = 1 \Rightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z}, 1 = mu + Xv \Rightarrow 1 - Xv = mu \Rightarrow m \mid 1 - Xv$$

$$\Rightarrow m/xv=1 \Rightarrow xv=1 \pmod{m} \Rightarrow \overline{xv}=\overline{1} \Rightarrow \overline{x} \odot \overline{v}=\overline{1} \Rightarrow x^{-1}=\overline{v} \in \mathbb{Z}/m$$

Tanım: $(\mathbb{Z}/m, \oplus, \odot)$ cismine asal cisim denir.

- Bölünebilme Kuralları -

Theorem: $a \in \mathbb{Z}$ odd.

1- a nın 2 ile bölünebilmesi için gerek ve yeter şart, birler basamağındaki rakamın gösterdiği sayının 2 ile bölünebilmesidir.

2- a'nın 5 ile bölünebilmesi için " " " " " "
" " " 5 ile bölünebilmesidir.

3- a'nın 3 ile bölünebilmesi için " " " , rakamları toplamının 3 ile bölünebilmesidir.

4- a'nın 9 ile bölünebilmesi için " " " , " "

9 ile bölünebilmesidir.

ispot. 1-2 = $(x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0)_{10} = x_0 + x_1 \cdot 10 + x_2 \cdot 10^2 + \dots + x_{n-1} 10^{n-1} + x_n 10^n = \sum_{i=0}^n x_i 10^i$

$$x_0 \equiv x_0 \pmod{2}$$

$$10 \equiv 0 \pmod{2} \quad X_1 \equiv X_1 \pmod{2} \Rightarrow 10X_1 \equiv 0X_1 \pmod{2}$$

$$\Rightarrow 10x_1 \equiv 0 \pmod{2}$$

$$10^i \equiv 0^i \pmod{2}, \quad i > 0$$

$$\left. \begin{array}{l} 10^i \equiv 0^i \pmod{2} \\ x_i \equiv x_i \pmod{2} \end{array} \right\} i > 0 \rightarrow x_i 10^i \equiv \underbrace{0^i}_{=0} \cdot x_i \pmod{2}$$

$$x_i \equiv x_i \pmod{2}$$

$$a \equiv (x_0 + 0 + \dots + 0) \pmod{2} \Rightarrow a \equiv x_0 \pmod{2}$$

$$2/a \Rightarrow 2/a \wedge 2/a - x_0 \Leftrightarrow 2/x_0 \Rightarrow (2/a \Leftrightarrow 2/x_0)$$

$$2- \quad a = x_0 + 10x_1 + 10^2x_2 + \dots + 10^n x_n \quad x_0 \equiv x_0 \pmod{5}$$

$$x_1 \equiv x_1 \pmod{5}, 10 \equiv 0 \pmod{5} \Rightarrow 10x_1 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$10^i x_i \equiv 0 \pmod{5}, i > 0$$

$$a \equiv (x_0 + 0) \pmod{5} \Rightarrow a \equiv x_0 \pmod{5}$$

$$(5/a \Leftrightarrow 5/x_0)$$

$$3- \quad a = x_0 + 10x_1 + 10^2x_2 + \dots + 10^n x_n \quad x_0 = x_0 \pmod{3}$$

$$x_1 \equiv x_1 \pmod{3}, 10 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 10x_1 \equiv x_1 \pmod{3}$$

$$x_i \equiv x_i \pmod{3} \quad 10^i \equiv 1^i \pmod{3} \quad i > 0$$

$$\Rightarrow x_i 10^i \equiv x_i \pmod{3}$$

$$\Rightarrow a \equiv (x_0 + x_1 + x_2 + \dots + x_n) \pmod{3}$$

$$\Rightarrow a \equiv \sum_{i=0}^n x_i \pmod{3} \Rightarrow 3/a \Leftrightarrow 3/\sum_{i=0}^n x_i$$

Theorem: $a \in \mathbb{Z}^+$ ve $a = x_n 10^n + x_{n-1} 10^{n-1} + \dots + x_1 10 + x_0 = \sum_{i=0}^n x_i 10^i$ olsun.

$$a) \quad a \equiv (10x_1 + x_0) \pmod{4} \rightarrow \text{yani } (4/a \Leftrightarrow 4/10x_1 + x_0 = (x_1 x_0)_4)$$

$$b) \quad a \equiv (10x_1 + x_0) \pmod{25} \rightarrow (25/a \Leftrightarrow 25/10x_1 + x_0)$$

$$c) \quad a \equiv (100x_2 + 10x_1 + x_0) \pmod{8} \rightarrow (8/a \Leftrightarrow 8/100x_2 + 10x_1 + x_0 = (x_2, x_1, x_0)_8)$$

$$\text{ispat, } a - \quad \left. \begin{array}{l} x_1 10 + x_0 \equiv x_1 10 + x_0 \pmod{4} \\ 10^2 = 100 \equiv 0 \pmod{4} \end{array} \right\} x_2 10^2 \equiv 0 \pmod{4}$$

$$\left. \begin{array}{l} i \geq 2 \Rightarrow 10^i \equiv 0 \pmod{4} \\ x_i \equiv x_i \pmod{4} \end{array} \right\} \Rightarrow x_i 10^i \equiv 0 \pmod{4}$$

$$a \equiv (x_1 10 + x_0 + 0 + \dots + 0) \pmod{4} \Rightarrow a \equiv x_1 10 + x_0 \pmod{4}$$

$$\Rightarrow 4/a \Leftrightarrow 4/x_1 10 + x_0$$

Theorem: $a \in \mathbb{Z}^+$ ve $a = \sum_{i=0}^n x_i 10^i$ olsun.

$$a - \quad a \equiv \sum_{i=0}^n (-1)^i x_i \pmod{11}$$

$$b' - \quad a \equiv \sum_{i=0}^{n-2} (-1)^i (x_i + 3x_{i+1} + 2x_{i+2}) \pmod{7}$$

$$A \quad = (x_0 + 3x_1 + 2x_2) + (x_3 + 3x_4 + 2x_5) + (x_6 + 3x_7 + 2x_8) + \dots + (-1)^{n-2} [x_{n-2} + 3x_{n-1} + 2x_n]$$

$$a) \quad 11/a \Leftrightarrow 11/\sum_{i=0}^n (-1)^i x_i$$

$$b) \quad 7/a \Leftrightarrow 7/A$$

ispat, a- $x_0 \equiv x_0 \pmod{11} \Rightarrow x_0 \equiv (-1)^0 x_0 \pmod{11}$

$$10 \equiv (10+1-1) \pmod{11}$$

$$10 \equiv 11-1 \pmod{11}$$

$$10 \equiv -1 \pmod{11} \quad \left. \begin{array}{l} \\ x_1 \equiv x_1 \pmod{11} \end{array} \right\} \begin{array}{l} 10x_1 \equiv -x_1 \pmod{11} \\ \Rightarrow 10x_1 \equiv (-1)x_1 \pmod{11} \end{array}$$

$$10^2 \equiv (-1)^2 \pmod{11} \Rightarrow 10^2 \equiv 1 \pmod{11} \Rightarrow 10^2 \equiv (-1)^2 \pmod{11} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \Rightarrow x_2 \equiv x_2 \pmod{11} \end{array} \right\} \Rightarrow 10^2 x_2 \equiv (-1)^2 x_2 \pmod{11}$$

$$\Rightarrow 10^3 x_2 \equiv (-1)^3 x_3 \pmod{11}$$

$$10^i x_i \equiv (-1)^i x_i \pmod{11} \quad (\text{Taraf tarafa top/arsa})$$

$$a \equiv \sum_{i=0}^n (-1)^i x_i \pmod{11}$$

$$11/a \Leftrightarrow 11/\sum_{i=0}^n (-1)^i x_i$$

$$b- \quad x_0 \equiv x_0 \pmod{7}$$

$$10 \equiv 3 \pmod{7} \quad \left. \begin{array}{l} \\ x_1 \equiv x_1 \pmod{7} \end{array} \right\} \Rightarrow 10x_1 \equiv 3x_1 \pmod{7}$$

$$10^2 \equiv 3 \cdot 10 \pmod{7} \equiv 2 \pmod{7} \quad \left. \begin{array}{l} \\ x_2 \equiv x_2 \pmod{7} \end{array} \right\} \Rightarrow 10^2 x_2 \equiv 2x_2 \pmod{7}$$

$$\Rightarrow x_0 + 10x_1 + 10^2 x_2 \equiv x_0 + 3x_1 + 2x_2 \pmod{7}$$

$$\equiv (-1)^0 x_0 + 3x_1 + 2x_2 \pmod{7}$$

$$10^3 \equiv 10^2 \cdot 10 \equiv 2 \cdot 3 \pmod{7} \equiv 6 \pmod{7} \equiv (-1) \pmod{7}$$

$$10^3 \equiv (-1) \pmod{7} \quad \left. \begin{array}{l} \\ x_3 \equiv x_3 \pmod{7} \end{array} \right\} 10^3 x_3 \equiv (-1)x_3 \pmod{7}$$

$$10^4 \equiv 10^3 \cdot 10 \equiv (-1) \cdot 3 \pmod{7}$$

$$10^4 \equiv (-1)^1 3 \pmod{7} \Rightarrow 10^4 x_4 \equiv (-1)^1 3x_4 \pmod{7}$$

$$10^5 \equiv 10^3 \cdot 10^2 \equiv (-1)^1 2 \pmod{7}$$

$$10^5 x_5 \equiv (-1)^1 2x_5 \pmod{7}$$

$$a \equiv (-1)^0 x_0 + 3x_1 + 2x_2 + (-1)(x_3 + 3x_4 + 2x_5) + \dots \pmod{7}$$

Problemler :

- 1- Bölme işlemi yapmadan 432561 sayısının 99 a bölümündeki kalanı bulun.
- 2- 2373^{427} sayısının birler basamağındaki rakamı bulun.
- 3- $19^3 \cdot 288^2$ sayısının 5 ile bölümündeki kalanı bulun.
- 4- $5^{73} + 9^{12}$ sayısının 7 ile bölümündeki kalanı bulun. (6 dir.)
- 5- $\forall n \in \mathbb{N}$ için $3^{2n} - 2^n$ sayısının 7 ile bölündüğünü gösterin.
- 6- $\forall n \in \mathbb{N}$ için $10^n + 3 \cdot 4^{n+2} + 5$, 9 ile bölündüğünü gösterin.
- 7- $x \in \mathbb{N}$, $x \equiv 7 \pmod{9} \Rightarrow 4^x + 6x - 1 \equiv \dots \pmod{9}$
- 8- $(1y8x2)_{10}$ sayısının 4 ve 9 ile bölünebilmesi için $x=?$ $y=?$
- 9- 6 tabanına göre yazılan bir sayının, 5 ve 7 ile bölünebilme kuralını bulun. Bundan yararlanarak $(21254)_6$ sayısının 5 ile bölümündeki kalanı bulun.
- 10- m tabanına göre yazılan bir sayının $m-1$ ile bölünebilme kuralını bulun.

Gözümler :

$$1- (432561)_{10} = 1 + 6 \cdot 10 + 5 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^4 + 4 \cdot 10^5$$

- $1 \equiv 1 \pmod{99}$
- $10 \cdot 6 \equiv 10 \cdot 6 \pmod{99}$
- $10^2 \equiv 1 \pmod{99}$
- $5 \cdot 10^2 \equiv 5 \pmod{99}$
- $10^3 \equiv 10 \pmod{99} \Rightarrow 2 \cdot 10^3 \equiv 20 \pmod{99}$
- $10^4 \equiv 1 \pmod{99}$
- $3 \cdot 10^4 \equiv 3 \pmod{99}$
- $10^5 \equiv 10 \pmod{99} \Rightarrow 4 \cdot 10^5 \equiv 40 \pmod{99}$

$$432561 \equiv 1 + 60 + 5 + 20 + 3 + 40 \pmod{99}$$

$$\equiv 129 \pmod{99} \equiv 30 \pmod{99}$$

$$\begin{array}{r} 432561 \overline{) 99} \\ \underline{30} \end{array} //$$

$$2- 2373 \equiv 3 \pmod{10}$$

$$(2373)^2 \equiv 9 \pmod{10} \equiv (-1) \pmod{10}$$

$$(2373)^4 \equiv (-1)^2 \pmod{10} \equiv 1 \pmod{10}$$

$$((2373)4)^{106} 2373^3 \equiv 1^{106} (3.9) \pmod{10}$$

$$(2373)^{427} \equiv 7 \pmod{10}$$

$$3- 19 \equiv 4 \pmod{5} \quad 288 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$19^2 \equiv 1 \pmod{5} \quad 288^2 \equiv 4 \pmod{5}$$

$$19 \cdot 19^2 \equiv 4 \pmod{5}$$

$$19^3 \cdot 288^2 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$5- 7/3^{2n}-2^n \quad ?$$

$$3 \equiv 3 \pmod{7}$$

$$3^2 \equiv 2 \pmod{7}$$

$$(3^2)^n \equiv 2^n \pmod{7}$$

$$3^{2n} \equiv 2^n \pmod{7} \Rightarrow 3^{2n}-2^n \equiv 2^n-2^n \pmod{7} \Rightarrow 3^n-2^n \equiv 0 \pmod{7} //$$

$$6- 10^n + 3 \cdot 4^{n+2} + 5$$

$$10^1 \equiv 1 \pmod{9}$$

$$(10^1)^n \equiv 1^n \pmod{9} \Rightarrow 10^n \equiv 1 \pmod{9}$$

$$3 \equiv 3 \pmod{9} \quad 4^n 4^2 \quad 5 \equiv 5 \pmod{9}$$

$$4 \equiv 4 \pmod{9} \Rightarrow 4^2 \equiv 7 \pmod{9} \Rightarrow 4^3 \equiv 1 \pmod{9} \Rightarrow 4^4 \equiv 4 \pmod{9} \Rightarrow 4^5 \equiv 7 \pmod{9}$$

$$\Rightarrow 4^6 \equiv 1 \pmod{9}$$

$$\textcircled{a} 1 + 3 \cdot 4 \cdot 7 + 5 \pmod{9} \equiv a \Rightarrow a \equiv 0 \pmod{9}$$

$$\textcircled{b} a \equiv 1 + 3 \cdot 7 \cdot 4 + 5 \equiv 0 \pmod{9}$$

$$\textcircled{c} a \equiv 1 + 3 \cdot 1 \cdot 7 + 5 \equiv 0 \pmod{9}$$

$$7- x \equiv 7 \pmod{9} \Rightarrow 9/4^x + 6x - 1 \quad ?$$

$$x \equiv 7 \pmod{9} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, x = 7 + 9k$$

$$\Rightarrow 4^x + 6x - 1 = 4^{7+9k} + 6(7+9k) - 1$$

$$4^{7+9k} = 4^7 4^{9k} = 4^7 (4^9)^k$$

$$4 \equiv 4 \pmod{9}$$

$$\Rightarrow (4^9)^k = 4^{9k} \equiv 1^k \pmod{9} \equiv 1 \pmod{9}$$

$$4^2 \equiv 7 \pmod{9}$$

$$4^3 \equiv 1 \pmod{9}$$

$$4^9 \equiv 1^9 \pmod{9} \Rightarrow 4^9 \equiv 1 \pmod{9}$$

$$4^{7+9k} = 4^7 \cdot (4^9)^k \equiv 4 \pmod{9}$$

$$6(7+9k) = 6 \cdot 7 + 6 \cdot 9k \equiv 6 \pmod{9}$$

$$\frac{-1 \equiv -1 \pmod{9}}{4^x + 6x - 1 \equiv (4 + 6 - 1) \pmod{9}}$$

$$\equiv 0 \pmod{9}$$

9- $(x_n, x_{n-1}, \dots, x_2, x_1, x_0)_6$

$$a = x_0 + x_1 \cdot 6 + x_2 \cdot 6^2 + \dots + x_{n-1} \cdot 6^{n-1} + x_n \cdot 6^n$$

$$x_0 \equiv x_0 \pmod{5}$$

$$\left. \begin{array}{l} x_1 \equiv x_1 \pmod{5} \\ 6 \equiv 1 \pmod{5} \end{array} \right\} 6x_1 \equiv x_1 \pmod{5}$$

$$6^2 \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow x_2 6^2 \equiv x_2 \pmod{5}$$

$$x_n 6^n \equiv x_n \pmod{5} \quad \text{Taraf tarafa toplarsak,}$$

$$a \equiv (x_0 + x_1 + x_2 + \dots + x_n) \pmod{5}$$

$$a \equiv \sum_{i=0}^n x_i \pmod{5}$$

$$5/a \Leftrightarrow 5 / \sum_{i=0}^n x_i \quad (a \text{ sayısının } 5 \text{ ile bölünebilmesi için rakamları toplamı } 5 \text{ ile bölünebilir.})$$

m Modülüne Göre Denklemler :

$a, b \in \mathbb{Z}$ ve $m \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere,

$ax \equiv b \pmod{m}$ ifadesine m modülüne göre bir denklem denir. Bu ifade de,

x yerine yazıldığında denklemi doğrulayan bir x_0 tamsayısına denklemin bir kökü (çözümü) denir. x_0 tamsayılarının kümesine denklemin doğruluk kümesi denir.

Teorem: $a, b \in \mathbb{Z}$ ve $m \in \mathbb{Z}^+$ olsun. $\text{OBEB}(m, a) = d$ olmak üzere

$ax \equiv b \pmod{m}$ denkleminin (önermesinin) doğruluk kümesinin boş kümeden farklı olması için gerek ve yeter şart, " d/b " olmasıdır.

İspat, $\text{OBEB}(m, a) = d \Rightarrow (d/m \wedge d/a)$

$$\Rightarrow \exists a', m' \in \mathbb{Z}, m = d m' \wedge a = d a' \wedge (m', a') = 1$$

$$1^\circ \Rightarrow: d \neq \emptyset \text{ olsun. } \Rightarrow \exists x_0 \in \mathbb{Z}, ax_0 \equiv b \pmod{m}$$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, ax_0 = b + km$$

$$\Rightarrow da'x_0 = b + kd m'$$

$$\Rightarrow d(a'x_0 - km') = b \Rightarrow d/b$$

$$2^{\circ} \Leftarrow : d/b \wedge \text{OBEB}(m,a) = d \Rightarrow [\exists u, v \in \mathbb{Z}, d = mu + av \wedge b' \in \mathbb{Z}, b = db']$$

$$\Rightarrow b'd = mub' + ab'v$$

$$\Rightarrow b = m(vb') + a(b'v)$$

$$\Rightarrow a(b'v) - b = (-vb')m$$

$$\Rightarrow a(b'v) \equiv b \pmod{m} \Rightarrow x_0 = b'v \Rightarrow D \neq \emptyset$$

Sonuç // $a, b \in \mathbb{Z}$ ve $m \in \mathbb{Z}^+$ olsun. $\text{OBEB}(m,a) = d$ olmak üzere $d \nmid b$ ise

$$\underline{aX \equiv b \pmod{m}} \quad \underline{D = \emptyset}$$

Örnek // $5X \equiv 4 \pmod{12}$ $\mathbb{Z}'$ de çözümünü araştıralım.

$$a=5 \quad b=4 \quad m=12$$

$$\text{OBEB}(5,12) = 1 \Rightarrow 1/4 \quad D \neq \emptyset \text{ olur. //}$$

$$\mathbb{Z}/12 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \bar{11}\} \text{ bulunabilir.}$$

$$5(5X) = 5 \cdot 4 \pmod{12} \Rightarrow 25X \equiv 20 \pmod{12}$$

$$\Rightarrow \begin{matrix} 25X \equiv X \pmod{12} \\ 20 \equiv 8 \pmod{12} \end{matrix} \Rightarrow X \equiv 8 \pmod{12} \quad X = \bar{8} \quad D = \bar{8}$$

Örnek // $8X \equiv 2 \pmod{12}$ $D = ?$

$$a=8 \quad b=2 \quad m=12$$

$$\text{OBEB}(8,12) = 4 \Rightarrow 4 \nmid 2 \quad D = \emptyset \text{ olur. // } (\mathbb{Z}' \text{ de çözümü yoktur.})$$

Örnek 1 // $36X \equiv 8 \pmod{102}$ denkleminin $\mathbb{Z}/102$ deki çözümü nedir?

$$2 // \quad 2X \equiv 3 \pmod{5} \quad " \quad \mathbb{Z}/5 \quad " \quad " \quad " \quad ?$$

$$3 // \quad 5X \equiv 7 \pmod{12} \text{ ve } 12X \equiv 9 \pmod{15}, \mathbb{Z}' \text{ deki çözümü nedir?}$$

Çözüm 1 // $36X \equiv 8 \pmod{102}$

$$\text{OBEB}(36,102) = 6 \quad 6 \nmid 8 \quad D = \emptyset$$

$$2 // \quad \text{OBEB}(2,5) = 1 \quad 1/3 \quad D \neq \emptyset$$

$$\mathbb{Z}/5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$$

$$2\bar{X} = \bar{3} \Rightarrow 2 \odot \bar{X} = 3 \quad X = \bar{4} \quad D = \bar{4}$$

$$3 // \quad 12X \equiv 9 \pmod{15}$$

$$\text{OBEB}(12,15) = 3 \quad 3/9 \quad D \neq \emptyset \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, 12X = 9 + 15k$$

$$\Rightarrow 3 \cdot 4X = 3 \cdot 3 + 3 \cdot 5k$$

$$\Rightarrow 4X = 3 + 5k$$

$$\Rightarrow 4X \equiv 3 \pmod{5}$$

$$\Rightarrow 4 \cdot 4x \equiv 3 \cdot 4 \pmod{5}$$

$$\Rightarrow 16x \equiv 2 \pmod{5} \quad \Rightarrow x \equiv 2 \pmod{5} \quad D=2$$

- RASYONEL SAYILAR -

Tanım: $K = \{(a,b) : a,b \in \mathbb{Z} \wedge b \neq 0\}$ kümesinin her bir (a,b) elemanına bir kesir, $a : (a,b)$ kesrinin payı, $b : (a,b)$ kesrinin paydası denir.

Tanım: $(a,b), (c,d) \in K$ için $ad=bc$ ise (a,b) kesri (ikilisi), (c,d) kesrine denktir denir ve $(a,b) \sim (c,d)$ yazılır.

Örnek // $(1,2)$ ve $(3,6)$ kesirleri $1 \cdot 6 = 6 = 2 \cdot 3$ denktir.

$$(1,2) \sim (3,6)$$

Teorem: K kümesinde tanımlanan $(a,b), (c,d) \in K$ için,

$$(a,b) \sim (c,d) \Leftrightarrow ad=bc \text{ bağıntısı bir denklik bağıntısıdır.}$$

İspat // 1° $a,b \in \mathbb{Z}$, $ab=ba \Rightarrow (a,b) \sim (a,b)$ (yansıma öz.), $(a,b) \in K$

$$2^\circ (a,b), (c,d) \in \mathbb{Z}, (a,b) \sim (c,d) \Rightarrow ad=bc$$

$$\Rightarrow bc=ad$$

$$\Rightarrow cb=da$$

$$\Rightarrow (c,d) \sim (a,b) \quad (\text{simetri öz.})$$

$$3^\circ (a,b), (c,d), (e,f) \in K,$$

$$[(a,b) \sim (c,d) \wedge (c,d) \sim (e,f)] \Rightarrow [ad=bc \wedge cf=de]$$

$$\Rightarrow (ad)(cf) = (bc)(de)$$

$$\Rightarrow (af)(cd) = (be)(cd)$$

$$\Rightarrow af=be \Rightarrow (a,b) \sim (e,f) \quad (\text{geçişme öz.})$$

$\forall (a,b) \in K$ nin bir denklik sınıfı vardır.

$$\forall (a,b) \in K \text{ için } (\overline{a,b}) = \{(x,y) : (x,y) \in K \wedge (x,y) \sim (a,b)\}$$

Örnek // $(0,1), (1,2), (3,2)$ denklik sınıflarını bulalım.

$$\bullet (\overline{0,1}) = \{(x,y) : (x,y) \in K \wedge (x,y) \sim (0,1)\}$$

$$(x,y) \sim (0,1) \Rightarrow x \cdot 1 = y \cdot 0 \Rightarrow x=0$$

$$(\overline{0,1}) = \{(0,x) : x \in \mathbb{Z} - \{0\}\}$$

$$(\overline{0,1}) = \{ \dots, (0,-2), (0,-1), (0,1), (0,2), \dots \}$$

$$\bullet \quad (\overline{1,2}) = \{(x,y) : (x,y) \in \mathbb{K} \wedge (x,y) \sim (1,2)\}$$

$$(x,y) \sim (1,2) \Rightarrow x \cdot 2 = y \cdot 1 \Rightarrow y = 2x$$

$$= \{(x, 2x) : x \in \mathbb{Z} - \{0\}\}$$

$$= \{ \dots, (-3, -6), (-2, -4), (-1, -2), (1, 2), (2, 4), (3, 6), \dots \}$$

$$\bullet \quad (\overline{3,2}) = \{(x,y) : (x,y) \in \mathbb{K} \wedge (x,y) \sim (3,2)\}$$

$$(x,y) \sim (3,2) \Rightarrow x \cdot 2 = y \cdot 3 \Rightarrow 2x = 3y \Rightarrow 2/y \wedge 3/x$$

$$= \{(3x, 2x) : x \in \mathbb{Z} - \{0\}\}$$

$$= \{ \dots, (-6, -4), (-3, -2), (3, 2), (6, 4), \dots \}$$

Tanım: $\mathbb{K}$ 'da tanımlanan denk olma denklik bağıntısının $\mathbb{K}$ dan ayırdığı denklik sınıflarının herbirine bir rasyonel sayı, bu sayıların kümesine de rasyonel sayılar kümesi denir. $\mathbb{Q}$ ile gösterilir.

Örnek, $(\overline{2,3}), (\overline{3,2}), (\overline{11,5})$ rasyonel sayılardır.

Sonuç (esitlik): $(\overline{a,b}), (\overline{c,d}) \in \mathbb{Q}$ olsun.

$$(\overline{a,b}) = (\overline{c,d}) \Leftrightarrow (a,b) \sim (c,d) \Leftrightarrow ad = bc$$

Teorem: $(\overline{a,b}) \in \mathbb{Q}$ olsun. $x \in \mathbb{Z} - \{0\}$ olmak üzere,

$$(\overline{a,b}) = (\overline{ax, bx})$$

İspat, $(\overline{a,b}) = (\overline{ax, bx}) \Leftrightarrow (a,b) \sim (ax, bx) \Leftrightarrow a(bx) \stackrel{?}{=} b(ax)$

$$\Leftrightarrow abx = bax$$

$$\Leftrightarrow (ax, bx)$$

Tanım: (Toplama işlemi):

$$+ : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$$

$$[(\overline{a,b}), (\overline{c,d})] \longrightarrow (\overline{a,b}) + (\overline{c,d}) = (\overline{ad+bc, bd})$$

Tanım: (Çarpma işlemi):

$$\cdot : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$$

$$[(\overline{a,b}), (\overline{c,d})] \longrightarrow (\overline{a,b}) \cdot (\overline{c,d}) = (\overline{ac, bd})$$

Teorem: $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ matematik yapısı bir cisimdir.

1° $(\mathbb{Q}, +)$ Abel grubudur.

2° $(\mathbb{Q} - \{0\}, \cdot)$ " " 3° $\cdot$ nin $+$ üzerine dağılma özelliği vardır.

1- $\mathbb{Q}, +$ işlenine göre kapalıdır.2- $(\overline{a}, \overline{b}), (\overline{c}, \overline{d}) \in \mathbb{Q}$ için $(+)$ işleninin def. öz.

↑

$$(\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{c}, \overline{d}) = (\overline{a+d+bc}, \overline{bd}) = (\overline{da+cb}, \overline{db}) = (\overline{cb+da}, \overline{db}) = (\overline{c}, \overline{d}) + (\overline{a}, \overline{b})$$

3- Birleşme özelliği vardır.

4- Birim eleman öz. $\forall (\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Q} \wedge \exists (\overline{x}, \overline{y}) \in \mathbb{Q}$ için

$$(\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{x}, \overline{y}) = (\overline{x}, \overline{y}) + (\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{a}, \overline{b}), \quad e = (\overline{x}, \overline{y}) = ?$$

$$(\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{x}, \overline{y}) = (\overline{a}, \overline{b}) \Rightarrow (\overline{ay+bx}, \overline{by}) = (\overline{a}, \overline{b}) \quad ((+) \text{ işl. tanımı})$$

$$\Rightarrow (\overline{ay+bx}, \overline{by}) \sim (\overline{a}, \overline{b}) \quad (\text{esitlik tanımı})$$

$$\Rightarrow (\overline{ay+bx})b = (\overline{by})a \quad (\text{esitlik ''})$$

$$\Rightarrow ayb + b^2x = bya \quad (+ \text{ işl. sadel. öz})$$

$$\Rightarrow b^2x = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$\Rightarrow e = (\overline{0}, \overline{y}) \in \mathbb{Q}$$

5- Ters eleman öz. $\forall (\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Q}$ için $(\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{-a}, \overline{b}) = (\overline{ab-ba}, \overline{bb}) = (\overline{0}, \overline{y}) = e$

$$(\overline{-a}, \overline{b}) + (\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{0}, \overline{y})$$

$$-(\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{-a}, \overline{b}) \in \mathbb{Q}$$

II - $(\mathbb{Q} - \{0\}, \cdot)$ yapısı bir abel grubudur.

$$[0 = (\overline{0}, \overline{y})]$$

1- Kapalılık öz. 2- Birleşme öz.

3- Değişme öz. $\forall (\overline{a}, \overline{b}) \wedge (\overline{c}, \overline{d}) \in \mathbb{Q}$ için

$$(\overline{a}, \overline{b}) \cdot (\overline{c}, \overline{d}) = (\overline{ac}, \overline{bd}) = (\overline{ca}, \overline{db}) = (\overline{c}, \overline{d}) \cdot (\overline{a}, \overline{b})$$

4- Birim eleman öz. $\forall (\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Q} - \{0\}$ için $(\overline{a}, \overline{b}) (\overline{x}, \overline{y}) = (\overline{x}, \overline{y}) (\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{a}, \overline{b}), \quad e = (\overline{x}, \overline{y})$

$$\Rightarrow (\overline{a}, \overline{b}) (\overline{x}, \overline{y}) = (\overline{a}, \overline{b}) \Rightarrow (\overline{ax}, \overline{by}) = (\overline{a}, \overline{b})$$

$$\Rightarrow (\overline{ax}, \overline{by}) \sim (\overline{a}, \overline{b})$$

$$\Rightarrow (ax)b = (by)a$$

$$\Rightarrow (ab)x = (ab)y \Rightarrow x = y \Rightarrow e = (\overline{x}, \overline{x}) \wedge x \neq 0$$

5° Ters eleman öz. $\forall (\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Q}$ için

$$(\overline{a}, \overline{b}) (\overline{b}, \overline{a}) = (\overline{ab}, \overline{ba}) = (\overline{x}, \overline{x})$$

$$(\overline{a}, \overline{b})^{-1} = (\overline{b}, \overline{a})$$

1- $\mathbb{Q}, +$ işleminin göre kapalıdır.

2- $(\overline{a}, \overline{b}), (\overline{c}, \overline{d}) \in \mathbb{Q}$ için

(+) işleminin def. öz.

↑

$$(\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{c}, \overline{d}) = (\overline{ad+bc}, \overline{bd}) = (\overline{da+cb}, \overline{db}) = (\overline{cb+da}, \overline{db}) = (\overline{c}, \overline{d}) + (\overline{a}, \overline{b})$$

3- Birleşme özelliği vardır.

4- Birim eleman öz. $\forall (\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Q} \wedge \exists (\overline{x}, \overline{y}) \in \mathbb{Q}$ için

$$(\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{x}, \overline{y}) = (\overline{x}, \overline{y}) + (\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{a}, \overline{b}), e = (\overline{x}, \overline{y}) = ?$$

$$(\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{x}, \overline{y}) = (\overline{a}, \overline{b}) \Rightarrow (\overline{ay+bx}, \overline{by}) = (\overline{a}, \overline{b}) \quad ((+) \text{ işl. tanımı.})$$

$$\Rightarrow (\overline{ay+bx}, \overline{by}) \sim (\overline{a}, \overline{b}) \quad (\text{esitlik tanımı})$$

$$\Rightarrow (\overline{ay+bx})b = (\overline{by})a \quad (\text{esitlik "})$$

$$\Rightarrow ayb + b^2x = bya \quad (+ \text{ işl. sadel. öz.})$$

$$\Rightarrow b^2x = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$\Rightarrow e = (\overline{0}, \overline{y}) \in \mathbb{Q}$$

5- Ters eleman öz. $\forall (\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Q}$ için $(\overline{a}, \overline{b}) + (\overline{-a}, \overline{b}) = (\overline{ab-ba}, \overline{bb}) = (\overline{0}, \overline{y}) = e$

$$(\overline{-a}, \overline{b}) + (\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{0}, \overline{y})$$

$$-(\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{-a}, \overline{b}) \in \mathbb{Q}$$

II - $(\mathbb{Q} - \{0\}, \cdot)$ yapısı bir abel grubudur.

$$[0 = (\overline{0}, \overline{y})]$$

1- Kapalılık öz. 2- Birleşme öz.

3- Değişme öz. $\forall (\overline{a}, \overline{b}) \wedge (\overline{c}, \overline{d}) \in \mathbb{Q}$ için

$$(\overline{a}, \overline{b}) \cdot (\overline{c}, \overline{d}) = (\overline{ac}, \overline{bd}) = (\overline{ca}, \overline{db}) = (\overline{c}, \overline{d}) \cdot (\overline{a}, \overline{b})$$

4- Birim eleman öz. $\forall (\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Q} - \{0\}$ için $(\overline{a}, \overline{b}) (\overline{x}, \overline{y}) = (\overline{x}, \overline{y}) (\overline{a}, \overline{b}) = (\overline{a}, \overline{b}), e = (\overline{x}, \overline{y})$

$$\Rightarrow (\overline{a}, \overline{b}) (\overline{x}, \overline{y}) = (\overline{a}, \overline{b}) \Rightarrow (\overline{ax}, \overline{by}) = (\overline{a}, \overline{b})$$

$$\Rightarrow (\overline{ax}, \overline{by}) \sim (\overline{a}, \overline{b})$$

$$\Rightarrow (ax)b = (by)a$$

$$\Rightarrow (ab)x = (ab)y \Rightarrow x = y \Rightarrow e = (\overline{x}, \overline{x}) \wedge x \neq 0$$

5° Ters eleman öz. $\forall (\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Q}$ için

$$(\overline{a}, \overline{b}) (\overline{b}, \overline{a}) = (\overline{ab}, \overline{ba}) = (\overline{x}, \overline{x})$$

$$(\overline{a}, \overline{b})^{-1} = (\overline{b}, \overline{a})$$

III. - Doğılma ö2. (•nn + Üzerine) (Ödev)

$\forall (\overline{a,b}), (\overline{c,d}), (\overline{e,f}) \in \mathbb{Q}$ için,

$$(\overline{a,b}) \cdot [(\overline{c,d}) + (\overline{e,f})] \stackrel{?}{=} (\overline{a,b}) (\overline{c,d}) + (\overline{a,b}) (\overline{e,f})$$

$$[(\overline{a,b}) + (\overline{c,d})] (\overline{e,f}) \stackrel{?}{=} (\overline{a,b}) (\overline{e,f}) + (\overline{c,d}) (\overline{e,f})$$

Sonuç // $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ yapısı bir cisimdir. Bu cisme rasyonel sayılar cismi denir.

Örnek // $(\overline{3,2})$ rasyonel sayısının 2 ve -2 katını bulalım.

$$2(\overline{3,2}) = (\overline{3,2}) + (\overline{3,2}) = (\overline{3.2 + 2.3, 2.2}) = (\overline{12,4}) = (\overline{3.4, 1.4}) = (\overline{3,1})$$

$$-2(\overline{3,2}) = 2[-(\overline{3,2})] = [-(\overline{3,2})] + [-(\overline{3,2})] = (\overline{-3,2}) + (\overline{-3,2})$$

$$= (\overline{(-3)2 + 2(-3), 2.2}) = (\overline{-12,4}) = (\overline{-3,1})$$

Örnek // $(\overline{3,2})$ rasyonel sayısının 2. ve -2. kuvvetlerini bulalım.

$$(\overline{3,2})^2 = (\overline{3,2}) (\overline{3,2}) = (\overline{3.3, 2.2}) = (\overline{9,4})$$

$$(\overline{3,2})^{-2} = [(\overline{3,2})^{-1}]^2 = (\overline{2,3})^2 = (\overline{2,3}) (\overline{2,3}) = (\overline{4,9})$$

Teorem : $T = \{(\overline{a,1}) : a \in \mathbb{Z}\}$ olmak üzere T ve Z izomorftur. $T \subset \mathbb{Q}$

İspat // $f: T \longrightarrow \mathbb{Z}$

$$(\overline{a,1}) \longrightarrow f[(\overline{a,1})] = a$$

fonksiyonu tanımlanıyor.

1° $\forall (\overline{a,1}), (\overline{b,1}) \in T$ için,

$$f[(\overline{a,1}) + (\overline{b,1})] = f[(\overline{a.1 + 1.b = 1.1})] = f[(\overline{a+b,1})] = a+b = f[(\overline{a,1})] + f[(\overline{b,1})]$$

2° (Ödev) $f[(\overline{a,1}) \cdot (\overline{b,1})] = f(\overline{a,1}) \cdot f(\overline{b,1})$

3° $\forall (\overline{a,1}), (\overline{b,1}) \in T$ için $f[(\overline{a,1})] = f[(\overline{b,1})] \Rightarrow a=b \Rightarrow (\overline{a,1}) = (\overline{b,1})$ $f, 1:1$ dir.

4° $\forall a \in \mathbb{Z}, f(\overline{a,1}) = a$ $(\overline{a,1}) \in T$ f örtendir.

$T \sim \mathbb{Z}$ 'dir (T izomorftur Z)

$$(\overline{a,1}) = a$$

$$(\overline{0,1}) = 0 \quad (\overline{1,1}) = 1$$

Tanım : (Çıkarma işlemi):

$(\overline{a,b}), (\overline{c,d}) \in \mathbb{Q}$ için,

$(\overline{a,b}) + (\overline{-c,d})$ rasyonel sayısına $(\overline{a,b})$ ve $(\overline{c,d})$ rasyonel sayılarının farkı denir.

$$(\overline{a,b}) + (\overline{-c,d}) = (\overline{a,b}) + [-(\overline{c,d})] = (\overline{ad-bc, bd})$$

Tanım: (Bölme işlemi):

$(\overline{a/b}) \in \mathbb{Q}$ ve $(\overline{c/d}) \in \mathbb{Q} - \{0\}$ için

$(\overline{a/b}) (\overline{c/d})^{-1}$ rasyonel sayısına $(\overline{a/b})$ nin $(\overline{c/d})$ ile bölümü denir.

$$(\overline{a/b}) (\overline{c/d})^{-1} = \overline{(a/b)(d/c)} = \overline{(ad/bc)}$$

Sembolik Olarak:

Fark: $(\overline{a/b}) - (\overline{c/d}) = (\overline{a/b}) + (\overline{-c/d}) = \overline{(ad-bc, bd)}$

Bölme: $(\overline{a/b}) : (\overline{c/d}) = (\overline{a/b}) \cdot (\overline{d/c}) = \overline{(ad, bc)}$

(Ödev) $\circ$ $(\overline{-2/3}) - (\overline{5/4}) = ?$, $(\overline{-2/3}) : (\overline{5/4}) = ?$

• $(\overline{-2/3}) - (\overline{5/4}) = (\overline{-2/3}) + (\overline{-5/4}) = \overline{((-2)4 + 3 \cdot (-5), 3 \cdot 4)} = \overline{(-23, 12)}$

• $(\overline{-2/3}) : (\overline{5/4}) = (\overline{-2/3}) \cdot (\overline{4/5}) = \overline{((-2)4, 3 \cdot 5)} = \overline{(-8, 15)}$

Tanım: $a \in \mathbb{Z}$ olduğuna göre $(\overline{a/1})$ rasyonel sayısına tam rasyonel sayı denir.

Ve $(\overline{a/1}) = a$ diye gösterilir.

Buna göre $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ olur.

$(\overline{a/b})$ rasyonel sayısını da $\frac{a}{b}$ ile gösteririz. $(\overline{a/b}) = \frac{a}{b}$

Teorem: $a, b \in \mathbb{Z}$ ve $b \nmid a$ ise $a : b = \frac{a}{b}$

İspat // $a : b = (\overline{a/1}) : (\overline{b/1}) = (\overline{a/1}) \cdot (\overline{1/b}) = (\overline{a/b}) = \frac{a}{b}$

Tanım: $x, y \in \mathbb{Q}$ ve $y \neq 0$ ise $x : y = \frac{x}{y}$ olarak tanımlanır.

Teorem: $\forall x, y, z, w \in \mathbb{Q}$ için


a- $\frac{x}{y} + \frac{z}{w} = \frac{xw + yz}{yw}$ b- $\frac{x}{y} \cdot \frac{z}{w} = \frac{xz}{yw}$ c- $\frac{x}{y} - \frac{z}{w} = \frac{xw - yz}{yw}$

d- $\frac{x}{y} : \frac{z}{w} = \frac{xw}{yz}$

- Rasyonel Sayıların Bir Doğru Üzerinde Gösterimi -




$\frac{p}{q}$. $p > 0, q > 0$, $p, q \in \mathbb{Z}^+$

Bir birimi q parçaya bölelim.  Her parça uzunluğu $\frac{1}{q}$ olur.

$p \cdot \frac{1}{q} = \frac{p}{q}$

Sayı doğrusu üzerinde rasyonel sayılara karşılık gelmeyen nokta var mıdır?

İspat// Aksine İspat için bir örnek verelim.



Soru: $X^2=2$ olan X sayısı rasyonel midir?

Kabul edelim ki X rasyonel sayı olsun. $\Rightarrow X = \frac{p}{q} \wedge \exists p, q \in \mathbb{Z} \wedge (p, q) = 1$

$$\frac{p}{q} = \left(\frac{p}{q}\right) \Rightarrow \left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2 \Rightarrow p^2 = 2q^2 \Rightarrow 2/p^2 \Rightarrow 2/p$$

$$\Rightarrow \exists p_1 \in \mathbb{Z}, p = 2p_1$$

$$\Rightarrow (2p_1)^2 = 2q^2 \Rightarrow 4p_1^2 = 2q^2 \Rightarrow 2p_1^2 = q^2 \Rightarrow 2/q^2 \Rightarrow 2/q$$

$$\Rightarrow \exists q_1 \in \mathbb{Z}, q = 2q_1$$

$$\Rightarrow \text{OBEB}(p, q) = \text{OBEB}(2p_1, 2q_1) = 2 \text{ OBEB}(p_1, q_1) \neq 1 \Rightarrow (p, q) \neq 1$$

Sonuç// X rasyonel değildir.

Sayı doğrusu üzerinde rasyonel olmayan noktalar da vardır.

- Rasyonel Sayılar Kümesinde Sıralama -

Teorem: $x \in \mathbb{Q}$ ve $x = (\overline{a}, b) = (\overline{c}, d)$ olsun. $ab > 0$ ise $cd > 0$ dir.

İspat// $(\overline{a}, b) = (\overline{c}, d) \Rightarrow (a, b) \cup (c, d) \Rightarrow ad = bc \Rightarrow (ad)(ad) = (bc)(ad)$

$$\Rightarrow (ad)^2 = (bc)(ad) \wedge ab > 0 \Rightarrow (ad)^2 = (ab)(cd) \wedge ab > 0 \Rightarrow cd > 0$$

Tanım: $x = (\overline{a}, b) \in \mathbb{Q}$ olsun.

1° $ab > 0$ ise x sayısına pozitif rasyonel sayı denir. ve $x > 0$ yazılır.

2° $ab < 0$ ise " " negatif " " " " ve $x < 0$ yazılır.

Pozitif rasyonel sayıların kümesi, $\mathbb{Q}^+$,

Negatif " " " " , $\mathbb{Q}^-$ ile gösterilir.

Tanım: $x \in \mathbb{Q}$ olsun.

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \text{ ise} \\ -x, & x < 0 \end{cases} \Rightarrow \text{esitliğiyle belirir.}$$

$|x|$ sayısına, x rasyonel sayısının mutlak değeri denir.

Tanım: $a, b \in \mathbb{Q}$ olsun. $a+x=b$ olacak şekilde bir x pozitif rasyonel sayısı varsa, " a sayısı b sayısından küçüktür," denir ve $a < b$ şeklinde yazılır.

$b=a+x$ olacak şekilde bir x pozitif rasyonel sayısı varsa, " b rasyonel sayısı, a rasyonel sayısından büyüktür," denir ve $b > a$ şeklinde yazılır.

Eğer $a < b$ veya $a = b$ önermesi doğru ise bu durum kısaca, $a \leq b$ şeklinde (yazılır.) sembolik olarak gösterilir.

Eğer $a > b$ veya $a = b$ önermesi de doğru ise $a \geq b$ şeklindedir.

Tanım: $a, b \in \mathbb{Q}$ için $a < b$, $a > b$, $a \leq b$, $b \geq a$ önermelerine, rasyonel sayılar kümesinde birer esitsizlik denir.

Teorem: $a, b \in \mathbb{Q}$ olsun. $a \leq b \Leftrightarrow b-a \in \mathbb{Q}^+$

İspat // $1^0 \Rightarrow$: $a \leq b \Rightarrow \exists x \in \mathbb{Q}^+, a+x=b \vee a=b$
 $\Rightarrow x=b-a \in \mathbb{Q}^+$

$2^0 \Leftarrow$: $b-a \in \mathbb{Q}^+ \Rightarrow x=b-a \in \mathbb{Q}^+ \Rightarrow a+x=b, x \in \mathbb{Q}^+ \Rightarrow a < b$

Teorem: $\frac{a}{b} > \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad > bc$ ($a, b \in \mathbb{Z} \wedge c, d \in \mathbb{Z}^+$)

İspat // $\frac{a}{b} > \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a}{b} - \frac{c}{d} > 0 \Leftrightarrow \frac{ad-bc}{bd} > 0 \Leftrightarrow ad-bc > 0$
 $\Leftrightarrow ad > bc$

Teorem: $\forall x, y, z, w \in \mathbb{Q}$ için

- $x \geq x$
- $(x \geq y \wedge y \geq z) \Rightarrow x \geq z$
 $(x > y \wedge y > z) \Rightarrow x > z$
- $x \geq y \vee y \geq x$
- $(x \geq y \wedge y \geq x) \Rightarrow x = y$
- $x > y, y > x, x = y$ önermelerinden ancak birisi doğrudur.
- $x+1 > x$
- $x \geq y \Leftrightarrow x+z \geq y+z$, $x > y \Leftrightarrow x+z > y+z$
- $(x \geq y \wedge z \geq w) \Rightarrow x+z \geq y+w$, $(x > y \wedge z > w) \Rightarrow x+z > y+w$

$$i - \forall z, \in \mathbb{Q}^+ (x > y \Leftrightarrow xz > yz)$$

$$k - \forall z, \in \mathbb{Q}^- (x > y \Leftrightarrow xz < yz)$$

$$\text{İspat} // (x > y \wedge y > z) \stackrel{?}{\Rightarrow} x > z$$

$$(x > y \wedge y > z) \Rightarrow (\exists k \in \mathbb{Q}^+, x = y + k) \wedge (\exists r \in \mathbb{Q}^+, y = z + r)$$

$$\Rightarrow x = y + k = (z + r) + k$$

$$\Rightarrow x = z + (r + k), \quad r + k \in \mathbb{Q}$$

$$\Rightarrow x > z$$

Tanım : $x, y, z \in \mathbb{Q}$ olsun. Eğer " $x < y < z$ veya $z < y < x$ " önermesi doğru ise " y rasyonel sayısı x ve z rasyonel sayıları arasındadır" denir.

Teorem : Farklı iki rasyonel sayı arasında en az bir rasyonel sayı vardır.

İspat // $\forall x, y \in \mathbb{Q}$ ve $x \neq y$ olsun. $x < y$ olduğunu farzedelim.

$$\Rightarrow z = \frac{x+y}{2} \text{ alalım. } \Rightarrow z \in \mathbb{Q}$$

$$x < y \Rightarrow x + x < x + y$$

$$\Rightarrow 2x < x + y$$

$$\Rightarrow x < \frac{x+y}{2} \Rightarrow x < z$$

$$x < y \Rightarrow x + y < y + y$$

$$\Rightarrow x + y < 2y$$

$$\Rightarrow \frac{x+y}{2} < y \Rightarrow z < y$$

$$x < z \wedge z < y \Rightarrow x < z < y$$

Sonuç : Farklı iki rasyonel sayı arasında, birbirinden farklı, sonsuz tane rasyonel sayı vardır.

Tanım : $x \in \mathbb{Q}$ ve $n \in \mathbb{Z}^+$ olsun.

$$1^0 \quad x \neq 0 \text{ ise } x^0 = 1$$

$$2^0 \quad x \neq 0 \text{ ise } x^1 = x$$

$$3^0 \quad x \neq 0 \text{ ise } x^{n+1} = x^n \cdot x$$

$$4^0 \quad x \neq 0 \text{ ise } x^{-n} = (x^{-1})^n$$

Teorem : $x, y \in \mathbb{Q}$ ve $m, n \in \mathbb{Z}^+$ olsun.

$$1^0 \quad (xy)^n = x^n y^n$$

$$4^0 \quad n > m \text{ ve } x \neq 0 \text{ ise } \frac{x^n}{x^m} = x^{n-m}$$

$$2^0 \quad y \neq 0 \text{ ise } \left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}$$

$$5^0 \quad (x^n)^m = x^{nm}$$

$$3^0 \quad x^n \cdot x^m = x^{n+m}$$

ispat // $(xy)^n = \overbrace{(xy)(xy) \dots (xy)}^{n \text{ tere}} = \overbrace{(x \cdot x \dots x)}^{n \text{ tere}} \overbrace{(y \cdot y \dots y)}^{n \text{ tere}} = x^n \cdot y^n$

Teorem: $x, y \in \mathbb{Q}$ ve $n \in \mathbb{Z}^+$ olsun.

$$x^n = y^n \Rightarrow [(x=y) \vee (x=-y)]$$

ispat // $x = \frac{a}{b}$ $\wedge$ $y = \frac{c}{d}$ olsun. ($a, b, c, d \in \mathbb{Z}$)

$$\Rightarrow x^n = y^n \Rightarrow \left(\frac{a}{b}\right)^n = \left(\frac{c}{d}\right)^n$$

$$\Rightarrow \frac{a^n}{b^n} = \frac{c^n}{d^n}$$

$$\Rightarrow a^n d^n = c^n b^n$$

$$\Rightarrow (ad)^n = (cb)^n$$

$$\Rightarrow |(ad)^n| = |(cb)^n|$$

$$\Rightarrow |ad|^n = |cb|^n$$

$$\Rightarrow |ad| = |cb|$$

$$\Rightarrow (ad=bc) \vee (ad=-bc) \Leftrightarrow \left(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\right) \vee \left(\frac{a}{b} = -\frac{c}{d}\right)$$

$$\Rightarrow (x=y \vee x=-y)$$

Teorem: $a \in \mathbb{Q}$ ve $n \in \mathbb{Z}^+$ olsun. n çift ise $x^n = a$ olacak şekilde bir x rasyonel sayısı yoktur.

$x \in \mathbb{Q}$ ve n çift $\Rightarrow x^n \geq 0$, $a < 0$ olduğundan $\forall x \in \mathbb{Q}, x^n \neq a$ önermesi doğrudur. $\Rightarrow \exists x \in \mathbb{Q}, x^n = a$ önermesi yanlıştır.

Tanım: $a \in \mathbb{Q}$ ve $n \in \mathbb{Z}^+$ olsun.

a) a tek sayı olmak üzere $x^n = a$ denklemini sağlayan x rasyonel sayısı varsa bu sayıya a 'nın n . kuvvetten kökü denir ve

$$x = \sqrt[n]{a} \text{ veya } x = a^{1/n} \text{ olarak yazılır.}$$

b) n çift sayı olmak üzere ve $a \geq 0$ olmak üzere $x^n = a$ denklemini sağlayan pozitif bir x rasyonel sayısı varsa bu sayıya a 'nın n . kuvvetten pozitif kökü denir. Ve $x = \sqrt[n]{a}$ veya $x = a^{1/n}$ yazılır.

c) n çift sayı olmak üzere ve $a \geq 0$ için, $x^n = a$ denklemini sağlayan negatif bir x rasyonel sayısı varsa bu sayıya a 'nın n . kuvvetten negatif kökü denir.

Örnek 1// $n=3$ ise $\sqrt[3]{a}$ a'nın küp kökü

2// $n=2$ ise $\sqrt{a}$ a'nın kare kökü

3// $(-2)^3 = -8 \Rightarrow \sqrt[3]{-8} = -2$

4// $3^2 = 9 \Rightarrow \sqrt{9} = 3$ pozitif karekök

5// $(-3)^2 = 9 \Rightarrow \sqrt{9} = (-3)$ negatif "

Teorem: $a \in \mathbb{Q}$ ve $n \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere $x^n = a$ denkleminin $\mathbb{Q}$ 'daki doğruluk kümesi D olsun.

a) n tek sayı ve $D \neq \emptyset$ ise $D = \{\sqrt[n]{a}\}$

b) n çift sayı ve $D \neq \emptyset$ ise $D = \{\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}\}$

Tanım: $m, n \in \mathbb{Z}^+$ ve $b \in \mathbb{Q}$ olsun.

$$b^{m/n} = (b^{1/n})^m = \sqrt[n]{b^m}$$

Örnek// $16^{3/2} = (16^{1/2})^3 = (\sqrt{16})^3 = 4^3 = 64$

Teorem: $\forall x, y, z \in \mathbb{Q}$ için

a) $x^z \cdot y^z = (xy)^z$ b) $\frac{x^z}{y^z} = \left(\frac{x}{y}\right)^z$ c) $x^y \cdot x^z = x^{y+z}$ d) $\frac{x^y}{x^z} = x^{y-z} \quad y > 0$

e) $(x^y)^z = x^{yz}$

Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi

$a, b \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere $\frac{a}{b}$ rasyonel sayısı verilsin.

1° $\Rightarrow a = bq + r \wedge 0 \leq r < b$

$$\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{bq + r}{b} = q + \frac{r}{b} \quad 0 \leq r < b$$

2° $\frac{r}{b}$ ifadesinde $10r = bq_1 + r_1 \wedge 0 \leq r_1 < b$

$$\Rightarrow \frac{r}{b} = \frac{10r}{10b} = \frac{bq_1 + r_1}{10b} \Rightarrow \frac{r}{b} = \frac{q_1}{10} + \frac{r_1}{10b}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b} = q + \frac{q_1}{10} + \frac{r_1}{10b}$$

3° $10r_1 = bq_2 + r_2 \wedge 0 \leq r_2 < b$

$$\frac{r_1}{10b} = \frac{10r_1}{100b} = \frac{bq_2 + r_2}{100b} \Rightarrow \frac{r_1}{10b} = \frac{q_2}{100} + \frac{r_2}{100b}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b} = q + \frac{q_1}{10b} + \frac{q_2}{100b} + \frac{r_2}{100b}$$

$$4^{\circ} \frac{a}{b} = 9 + \frac{9_1}{10} + \frac{9_2}{10^2} + \frac{9_3}{10^3} + \frac{9_4}{10^4}$$

$$\frac{a}{b} = 9 + \frac{9_1}{10} + \frac{9_2}{10^2} + \frac{9_3}{10^3} + \dots + \frac{9_i}{10^i} + \dots$$

Tanım: $\frac{a}{b}$ rasyonel sayısının bu şekilde yazımına ondalık gösterimi (açılımı) denir.

Ve sembolik olarak $\frac{a}{b} = 9,9_1,9_2,\dots,9_i,\dots$ şeklinde gösterilir.

Örnek 11 $\frac{27}{8}$ sayısının ondalık gösterimini yazalım.

$$1^{\circ} 27 = 8 \cdot 3 + 3 \Rightarrow \frac{27}{8} = 3 + \frac{3}{8}$$

$$2^{\circ} 30 = 10 \cdot 3 = 8 \cdot 3 + 6 \Rightarrow \frac{3}{8} = \frac{8 \cdot 3 + 6}{8 \cdot 10} = \frac{3}{10} + \frac{6}{8 \cdot 10}$$

$$\frac{27}{8} = 3 + \frac{3}{10} + \frac{6}{10 \cdot 8}$$

$$3^{\circ} 60 = 8 \cdot 7 + 4 \Rightarrow \frac{6}{10 \cdot 8} = \frac{7}{100} + \frac{4}{10^2 \cdot 8}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{27}{8} = 3 + \frac{3}{10} + \frac{7}{10^2} + \frac{4}{10^2 \cdot 8}$$

$$4^{\circ} 40 = 8 \cdot 5 + 0 \Rightarrow \frac{4}{10^2 \cdot 8} = \frac{8 \cdot 5 + 0}{10^3 \cdot 8} = \frac{5}{10^3} + \frac{0}{10^3 \cdot 8}$$

$$\frac{27}{8} = 3 + \frac{3}{10} + \frac{7}{10^2} + \frac{5}{10^3} + \frac{0}{10^4} + \frac{0}{10^5}$$

$$= 3,375000 \dots = 3,375$$

Tanım: Herhangi bir rasyonel sayının ondalık gösterimi $(9,9_1,9_2,\dots,9_k,\dots$

$p_1,p_2,\dots,p_n, p_1,p_2,\dots,p_n, p_1,p_2,\dots,p_n, p_1,p_2,\dots,p_n)$ şeklinde ise bu gösterime devirli ondalık gösterim denir.

$(9_1,9_2,9_3,\dots,9_k)_{10}$ sayısına ondalık gösterimin devretmeyen kısmı,

$(p_1,p_2,p_3,\dots,p_n)_{10}$ " " " devreden kısmı denir ve

sembolik olarak $9,9_1,9_2,\dots,9_k \overline{p_1,p_2,\dots,p_n}$ şeklinde gösterilir.

Örnek 11 $0,8\overline{3} = 0,8333\dots$

Teorem: Her rasyonel sayının ondalık gösterimi devirlidir. Her bir devirli ondalık gösterim bir rasyonel sayıya eşittir.

İspat 11 $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}, a, b \in \mathbb{Z}^+ \Rightarrow \frac{a}{b} = r, r_1, r_2, \dots, r_n, \dots$ olsun.

$r, r_1, r_2, \dots, r_n$ sayıları a 'nın b ye bölümündeki kalanlardır.

$\Rightarrow$ bu kalanlardan en çok b tanesi farklıdır.

$\frac{a}{b} = r, \overbrace{r_1, r_2, \dots, r_i}^{\text{farklı ise}}, r_{i+1}, \dots, r_n$ $\frac{a}{b}$ nin ondalık gösterimi devirlidir.

$$2^o \Leftarrow: X = 9,9_1 9_2 \dots 9_k \overline{p_1 p_2 \dots p_n} \text{ olsun } \Rightarrow X \in \mathbb{Q}$$

$$10^{k+n} \cdot X = 9_1 9_2 \dots 9_k p_1 p_2 \dots p_n, p_1 p_2 \dots p_n$$

$$10^{k+n} \cdot X = 10^{k+n} \cdot 9 + (9_1 9_2 \dots 9_k p_1 p_2 \dots p_n)_{10} + 0, p_1 p_2 \dots p_n$$

$$10^k \cdot X = 9_1 9_2 \dots 9_k, p_1 p_2 \dots p_n$$

$$10^k X = 10^k 9 + (9_1 9_2 \dots 9_k)_{10} + 0, p_1 p_2 \dots p_n$$

$$\Rightarrow (10^{k+n} - 10^k) X = (10^{k+n} - 10^k) 9 + (9_1 9_2 \dots 9_k p_1 p_2 \dots p_n)_{10} - (9_1 9_2 \dots 9_k)_{10}$$

$$\Rightarrow X = \frac{(10^{k+n} - 10^k) 9 + (9_1 9_2 \dots 9_k p_1 p_2 \dots p_n)_{10} - (9_1 9_2 \dots 9_k)_{10}}{10^{k+n} - 10^k} \in \mathbb{Q}$$

Örnek // $X = 2,13\overline{142}$ ondalık gösterimini rasyonel olarak yazalım.

$$10^5 X = 213142, \overline{142}$$

$$10^5 X = 10^5 \cdot 2 + 13142 + 0,142$$

$$10^2 X = 213, \overline{142} = 10^2 \cdot 2 + 13 + 0,142$$

$$10^5 X - 10^2 X = (10^5 - 10^2) 2 + 13142 - 13$$

$$\Rightarrow X = \frac{(10^5 - 10^2) 2 + 13142 - 13}{10^5 - 10^2} = \frac{2 \cdot 99900 + 13129}{99900} = 2 + \frac{13129}{99900} //$$

Problemler :

1- $(74,185)$ kesrine denk olan öyle bir (x,y) kesri bulun ki, $x+y=21$ olsun.

2- $((1110)_2, (11)_2)$ kesri $((101010)_2, (1001)_2)$ kesrine denk midir?

3- $(\overline{2},1) + X = (\overline{0},3)$, $(\overline{2},5) \cdot X = (\overline{3},1)$ açık önermelerinin $\mathbb{Q}$ daki doğruluk kümeleri ?

4- $\frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}}}$ rasyonel sayısını $\frac{p}{q}$ şeklinde yazın.

5- $3,(\overline{2},5) (\overline{2},-5)$, $(\overline{1},-2)^3$ ifadelerini bulun.

6- $\frac{3}{8}$, $-\frac{11}{9}$, $-\frac{73}{7}$ sayılarının ondalık gösterimini bulun.

7- $2/4$; $2,125$; $1,23\overline{157}$; $3,26518\overline{05180518005\dots}$ sayılarını p/q şeklinde yazın.

8- a/ $x^7=0$ b/ $x^{-3}=\frac{27}{8}$ c/ $x^{-6}=10^6$ d/ $x^5=1$ e/ $x^7=0$

f/ $(2x)^4=16$ g) $(x+1)^2=4$ h) $(x-1)^4=1$ ı) $3x^4+81=162$

$3x^4 + 81 = -162 \Rightarrow 3x^4 = -243 \Rightarrow x^4 = -81 \Rightarrow (x^2)^2 = -81 \Rightarrow \emptyset$
 9- $\sqrt[3]{-1} = -1$ $\sqrt[3]{-8} = -2$ $4^{2/3} = (4^{1/2})^3 = (\sqrt{4})^3 = 2^3 = 8$ $\sqrt[3]{8} = 2$
 $\left(-\frac{1}{16}\right)^{-3/4} = \left(-\frac{1}{2^4}\right)^{-3/4} = (-2^{-4})^{-3/4} = (-2)^{-4(-3/4)} = (-2)^3 = -8 //$

- REEL SAYILAR -

$2x = 3$ denkleminin $\mathbb{Z}$ de çözümü yoktur. O halde,

Rasyonel sayılar kümesi, tam sayılar kümesinden daha geniştir.

$x^2 = 2$ rasyonel değil idi. Bu denklemi görmek için, reel sayılar (gerçek sayılar) kümesi tanımlanmıştır.

Tanım: Tanım kümesi: pozitif tam sayılar kümesi, değer kümesi: rasyonel sayılar kümesi olan fonksiyona rasyonel sayı dizisi denir.

Yani: $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Q}$
 $n \rightarrow f(n) = a_n$ bu diziyi sembolik olarak (a_n) ile gösteririz.

Tanım: (a_n) dizisi verildiğinde, a_n 'e dizinin n . terimi (veya genel terimi) denir.

Örnek // $a_n = \frac{1}{n}$ olan dizi için $n=1 \Rightarrow a_1 = 1$ 1. terimdir.

$n=2 \Rightarrow a_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow$ 2. terim

$n=3 \Rightarrow a_3 = \frac{1}{3} \Rightarrow$ 3. "

Tanım: $n \in \mathbb{Z}^+$ ve $a \in \mathbb{Q}$ olsun. $a_n = a$ ^{= sabit} olan diziye $[(a_n) = (a)]$ sabit dizi denir.

Örnek // $a_n = 1 \Rightarrow a_1 = 1 = a_2 = \dots$

Tanım: $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ için $a_n = b_n$ ise (a_n) ve (b_n) dizileri esittir denir.

Tanım: (a_n) rasyonel sayı dizisi verilsin. $\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}^+$ için $n \geq n_0$ olduğunda

$|a_n - a| < \varepsilon$ olacak şekilde $n_0(\varepsilon)$ pozitif tam sayısı varsa (a_n) dizisinin limiti a sayısıdır. (veya (a_n) dizisi a 'ya yakınsar) denir. Ve sembolik olarak, $\lim a_n = a$, $(a_n) \rightarrow a$ ile gösterilir.

Tanım: Limiti sıfır olan diziye sıfır dizisi denir.

Örnek // $a_n = \frac{1}{n}$ dizisi sıfır dizisidir.

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}^+ \text{ için } \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow n \geq n_0 \geq \frac{1}{\varepsilon} \\ \Rightarrow \left(\frac{1}{n} \right) \rightarrow 0$$

Tanım: (a_n) bir rasyonel sayı dizisi olsun. $\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}^+$ için $n \geq n_0$ ve $p \geq n_0$ olduğunda, $|a_n - a_p| < \varepsilon$ olacak şekilde bir $n_0(\varepsilon)$ pozitif tam sayısı varsa (a_n) dizisine temel dizi (Cauchy Dizisi) denir.

Teorem: Her yakınsak rasyonel sayı dizisi bir temel dizidir.

İspat: (a_n) dizisi yakınsak $\Rightarrow (a_n) \rightarrow a \Rightarrow \forall \varepsilon_1 \in \mathbb{Q}^+$ için $n \geq n_0$
 $\Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon_1$ olacak şekilde $n_0(\varepsilon_1)$ vardır. $n_0 \in \mathbb{Z}^+$.
 $\forall \varepsilon_2 \in \mathbb{Q}^+$, $p \geq n_0 \Rightarrow |a_p - a| < \varepsilon_2$
 $\Rightarrow |a_n - a_p| = |a_n - a + a - a_p| = |(a_n - a) + [-(a_p - a)]| \leq |a_n - a| + |-(a_p - a)|$
 $= |a_n - a| + |a_p - a| < \varepsilon_1 + \varepsilon_2$
 $\Rightarrow \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \frac{\varepsilon}{2}$ alırsak.
 $\Rightarrow \forall \varepsilon \in \mathbb{Q}^+$ için $n \geq n_0 \wedge p \geq n_0$, $|a_n - a_p| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$
 $\Rightarrow (a_n)$ bir temel dizidir.

Tanım: (a_n) bir rasyonel sayı dizisi olsun. $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ ve $\exists M \in \mathbb{Q}^+$ için $|a_n| \leq M$ ise (a_n) dizisi sınırlıdır denir.

Teorem: Herhangi bir rasyonel sayı dizisi (a_n) olsun. (a_n) temel dizi ise sınırlıdır.

İspat: $\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}^+$ için $n \geq n_0$ ve $p \geq n_0$ olmak üzere $|a_n - a_p| < \varepsilon \Rightarrow \lim a_n = a$ olacak şekilde bir $a \in \mathbb{Q}$ vardır.
 $\Rightarrow \forall \varepsilon_1 \in \mathbb{Q}^+$, $n \geq n_0 \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon_1$ bağıntısı sağlanır.
 $\Rightarrow -\varepsilon_1 < a_n - a < \varepsilon_1 \Rightarrow a - \varepsilon_1 < a_n < a + \varepsilon_1$
 $\exists M \in \mathbb{Q}^+$ seçilebilir ki, $M > a + \varepsilon_1$ ve $-M < a - \varepsilon_1$ yapılabilir.
 $\Rightarrow -M < a - \varepsilon_1 < a_n < a + \varepsilon_1 < M \Rightarrow -M < a_n < M \Rightarrow |a_n| < M$
 $\Rightarrow (a_n)$ dizisi sınırlı dizidir.

Tanım: Temel rasyonel sayılar dizilerinin kümesi T olsun. $(a_n), (b_n) \in T$ için $(a_n) + (b_n) = (a_n + b_n)$, $(a_n) \cdot (b_n) = (a_n \cdot b_n)$ olan bu işlemlere, temel diziler kümesinde, toplama ve çarpma işlemleri denir.

Teorem: $(T, +, \cdot)$ yapısı birimli ve değişmeli bir halkadır.

1° $\forall (a_n), (b_n) \in T, \Rightarrow \forall \varepsilon \in \mathbb{Q}^+, n \geq n_0 \wedge p \geq n_0$ olduğundan,

$$|a_n - a_p| < \varepsilon_1 \wedge |b_n - b_p| < \varepsilon_2$$

$$\Rightarrow |[a_n + b_n] - [a_p + b_p]| = |[a_n - a_p] + [b_n - b_p]| \leq |a_n - a_p| + |b_n - b_p| < \varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

$$\Rightarrow \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \frac{\varepsilon}{2} \text{ alınırsa}$$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon \in \mathbb{Q}^+, n \geq n_0 \wedge p \geq p_0 \text{ olduğunda } |[a_n + b_n] - [a_p + b_p]| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$$\Rightarrow (a_n + b_n) = (a_n) + (b_n) \in T \text{ kapalıdır.}$$

$$2^\circ (a_n) + (b_n) = (a_n + b_n) = (b_n + a_n) = (b_n) + (a_n) \text{ değişime öz. vardır.}$$

$$3^\circ (u_n) \rightarrow 0 \text{ dizisini alalım. Ve } \forall (a_n) \in T \text{ için}$$

$$\Rightarrow (u_n) \in T$$

$$\Rightarrow (u_n) + (a_n) = (a_n) + (u_n) = (a_n) \quad (u_n) \in T \text{ birim elementidir. } (u_n) = (0) = e$$

$$4^\circ \text{ Ters element, } \forall (a_n) \in T \Rightarrow -(a_n) = (-a_n) \in T$$

Teorem: Terimleri rasyonel sayılar olan temel dizilerin kümesi T , sıfır dizilerinin kümesi S olsun.

$$(a_n), (b_n) \in T \text{ için } (a_n), (b_n) \in \beta \Leftrightarrow (a_n - b_n) \in S$$

şeklinde tanımlanan β bağıntısı bir denklik bağıntısıdır.

İspat // $(a_n), (b_n), (c_n) \in T$ olmak üzere,

$$1^\circ \forall (a_n) \in T, \Rightarrow a_n - a_n = 0 \Rightarrow (a_n - a_n) = (0) \rightarrow 0 \text{ yansımaya özelliği vardır.}$$

$$\Rightarrow (a_n - a_n) \in S \Rightarrow [(a_n), (a_n)] \in \beta$$

$$2^\circ (a_n), (b_n) \in T \text{ için } [(a_n), (b_n)] \in \beta \Rightarrow (a_n - b_n) \in S \Rightarrow (a_n - b_n) \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow [-(a_n - b_n)] \rightarrow 0 \Rightarrow (b_n - a_n) \rightarrow 0 \Rightarrow (b_n - a_n) \in S \Rightarrow [(b_n), (a_n)] \in \beta \text{ simetri öz.}$$

$$3^\circ [(a_n), (b_n)] \in \beta \wedge [(b_n), (c_n)] \in \beta \Rightarrow (a_n - b_n) \in S \wedge (b_n - c_n) \in S$$

$$\Rightarrow (a_n - b_n) \rightarrow 0 \wedge (b_n - c_n) \rightarrow 0 \Rightarrow [(a_n - b_n) + (b_n - c_n)] \rightarrow 0 + 0$$

$$\Rightarrow (a_n - c_n) \rightarrow 0 \Rightarrow (a_n - c_n) \in S \Rightarrow [(a_n), (c_n)] \in \beta \text{ geçişme öz. vardır.}$$

β bağıntısının T den ayırdığı denklik sınıfları (a_n) elemanının denklik

sınıfı $(\overline{a_n})$ ile gösterilirse,

$$(\overline{a_n}) = \{ (x_n) : (x_n) \in T \wedge (x_n - a_n) \in S \}$$

Tanım: (Reel sayı): Terimleri rasyonel sayılar olan temel dizilerin kümesi

T 'de tanımlanan β denklik bağıntısının T 'den ayırdığı denklik sınıflarının herbirine bir reel (gerçek) sayı denir. Bu sayıların kümesine de reel sayılar kümesi denir. Ve $\mathbb{R}$ ile gösterilir.

1° $+$: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$[(\bar{a}), (\bar{b})] \longrightarrow [(\bar{a}) + (\bar{b})] = (\overline{a+b})$$

şeklindeki işleme, reel sayılar kümesindeki toplama işlemi denir.

2° $\cdot$: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$[(\bar{a}), (\bar{b})] \longrightarrow [(\bar{a}) \cdot (\bar{b})] = (\overline{a \cdot b})$$

şeklindeki işleme, reel sayılar kümesindeki çarpma işlemi denir.

Teorem: $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ yapısı bir cisimdir. (ispatı yapılmayacaktır.)

Teorem: Rasyonel sayılar cismi, reel sayılar cisminin bir alt cismine izomorftur.

ispat // $\mathbb{R}' = \{(\bar{a}) : a \in \mathbb{Q}\} \subset \mathbb{R}$ [1° Ödev : $(\mathbb{R}', +, \cdot)$ yapısı bir cisimdir]

2° $f: \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}'$

$a \longrightarrow f(a) = (\bar{a})$ fonksiyonu bir izomorftur. (ödev)

a) birebir ve örtendir. ?

b) $f(a+b) \stackrel{?}{=} f(a) + f(b)$, $f(a \cdot b) \stackrel{?}{=} f(a) \cdot f(b)$

$\mathbb{R}' \approx \mathbb{Q}$ $(\bar{a}) = a \Rightarrow \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Tanım: $x, y \in \mathbb{R}$ olsun.

1- $x + (-y)$ reel sayısına x ve y reel sayılarının farkı denir. Ve

$x - y$ ile gösterilir. Bu işleme de reel sayılarda çıkarma işlemi denir.

2- $y \neq 0$ olmak üzere $x \cdot y^{-1}$ reel sayısına x ve y reel sayıların bölümü

(x 'in y 'ye bölümü) denir ve $\frac{x}{y}$ veya $x : y$ şeklinde gösterilir. Bu işleme de rasyonel sayılarda bölme işlemi denir.

Tanım: $(F, +, \cdot)$ bir cisim olsun. Cismin sıfırı 0 ve bir alt kümesi P olsun.

a) $0 \notin P$ b) $a \in F$ ve $a \neq 0$ ise a veya $-a$ dan bir ve yalnız biri

P 'ye aittir. c) P kümesi F de tanımlı, toplama ve çarpma işlemlerine göre kapalıdır.

Önermeleri doğru ise P alt kümesine $(F, +, \cdot)$ cisminin pozitif kesimi, P 'nin her bir elemanına, F 'nin pozitif bir elemanı ve $(F, +, \cdot)$ cismine de SİRALI CİSİM denir.

Eğer $a \in F$ elemanı pozitif ise $a \in P$ ise $0 < a$ veya $a > 0$ şeklinde ifade edilir.

P 'nin pozitif olmayan sıfırdan farklı elemanlarına, negatif elemanları denir. $b \neq 0$ ve $b \notin P$ ise $b < 0$ veya $0 > b$ ile gösterilir.

Tanım: Sıralı $(F, +, \cdot)$ cisminin pozitif kesimi P olsun. $a, b \in P$ için $b - a \in P$ ise a, b 'den küçüktür denir ve $a < b$ şeklinde veya $b > a$ yazılır.

Eğer $a < b$ veya $a = b$ önermesi doğru ise bu durumu $a \leq b$ veya $b \geq a$ şeklinde ifade ederiz.

Tanım: $(F, +, \cdot)$ bir sıralı cisim ve $a \in F$ olsun.

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0 \text{ ise} \\ -a, & a < 0 \text{ ise} \end{cases} \quad \text{şeklinde tanımlanan } |a| \text{ elemanına, } a \text{'nin mutlak değeri denir.}$$

Teorem: $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ bir sıralı cisimdir.

İspat // $(\bar{a}_n) \in \mathbb{R}$ ve $(\bar{a}_n) \neq (\bar{0})$ olsun.

$\varepsilon \in \mathbb{Q}^+$ olmak üzere $n_0 \in \mathbb{Z}^+$ için $\mathbb{R}$ 'nin $n \geq n_0$ olduğunda $a_n > \varepsilon$ önermesini doğrulayan elemanlarının kümesi $\mathbb{R}^+$ olsun.

1° $(\bar{0}) \notin \mathbb{R}^+$ tanımdan dolayı.

$$\begin{aligned} 2^\circ \quad \forall (\bar{a}_n) \in \mathbb{R} \text{ için } & \Rightarrow |a_n| > \varepsilon \Rightarrow (a_n > \varepsilon \vee a_n < -\varepsilon) \\ & \wedge (\bar{a}_n) \neq \bar{0} \\ & \Rightarrow a_n > \varepsilon \vee -a_n > \varepsilon \\ & \Rightarrow [(\bar{a}_n) \in \mathbb{R}^+ \vee (-\bar{a}_n) \in \mathbb{R}^+] \end{aligned}$$

$$3^\circ \quad \forall (\bar{a}_n), (\bar{b}_n) \in \mathbb{R}^+ \text{ için } \begin{cases} n > n_0 \text{ için } \exists \varepsilon \in \mathbb{Q}, a_n > \varepsilon \\ n > m_0 \text{ için } \exists \delta \in \mathbb{Q}, b_n > \delta \end{cases}$$

$\Rightarrow \max(n_0, m_0) = N_0$ ile gösterirsek,

$n > N_0$ için $a_n > \varepsilon \wedge b_n > \delta$ dir.

$$\begin{aligned} \Rightarrow (a_n + b_n > \varepsilon + \delta \wedge a_n \cdot b_n > \varepsilon \cdot \delta) & \Rightarrow (\overline{a_n + b_n}) = (\bar{a}_n) + (\bar{b}_n) \in \mathbb{R}^+ \\ & \wedge (\overline{a_n \cdot b_n}) = (\bar{a}_n) \cdot (\bar{b}_n) \in \mathbb{R}^+ \end{aligned}$$

kapalılık öz.

Sonuç olarak, $\mathbb{R}^+$, $\mathbb{R}'$ 'nin pozitif kesimidir. $\mathbb{R}$ sıralı bir cisimdir.

Teorem: $x, y, z \in \mathbb{R}$ olsun.

1° $x < y$, $x = y$, $x > y$ önermelerinden yalnızca bir tanesi doğrudur.

2° $(x < y \wedge y < z) \Rightarrow x < z$ dir. ($\mathbb{R}$ de geçişme öz.)

3° $x < y \Rightarrow x + z < y + z$ dir.

4° $(x < y \wedge 0 < z) \Rightarrow xz < yz$ dir.

5° $(x < y \wedge 0 > z) \Rightarrow xz > yz$ dir.

Tanım: (Reel Sayıların Kuvvetleri):

$x \in \mathbb{R}$ olsun.

1- $x \neq 0$ ise $x^0 = 1$

2- $x^1 = x$

3- $n \in \mathbb{Z}$ ise $x^{n+1} = x^n \cdot x$

4- $n \in \mathbb{Z}^+$ ve $x \neq 0$ ise $x^{-n} = (x^{-1})^n$

Teorem: $x \in \mathbb{R}$ ve $n \in \mathbb{Z}^+$ olsun.

a) n çift ise ve $a > 0$ ise $x^n = a$ olacak şekilde biri pozitif ve diğeri negatif olan iki x reel sayısı vardır.

b) n çift ise ve $a < 0$ ise $x^n = a$ olacak şekilde bir x reel sayısı yoktur.

c) n tek ise $x^n = a$ olacak şekilde bir tek x reel sayısı vardır.

a pozitif ise x pozitif, a negatif ise x negatiftir.

Tanım: $a \in \mathbb{R}$ ve $n \in \mathbb{Z}^+$ olsun.

a) n çift sayı ve $a \geq 0$ olmak üzere $x^n = a$ denklemini sağlayan pozitif x reel sayısına,

b) n tek sayı ise $x^n = a$ denklemini sağlayan x reel sayısına a 'nın n 'inci kuvvetten kökü denir. ve $x = \sqrt[n]{a}$ veya $a^{1/n}$ şeklinde yazılır.

Tanım: $a \in \mathbb{R}$ ve $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ olsun. m ve a sayıları aynı anda sıfır değilse,

$$a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m = \sqrt[n]{a^m} = (m\sqrt[n]{a})^m$$

Teorem: $a, b \in \mathbb{R}^+$ ve $X \in \mathbb{Z}^+$ olsun.

$$a) \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

$$b) \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

Teorem: $m, n \in \mathbb{Q}$ ve $a, b \in \mathbb{R}$ olsun. Her iki yan tanımlı olmak üzere,

$$a) \left(\frac{1}{a}\right)^m = \frac{1}{a^m} = a^{-m} \quad b) \left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m} \quad c) a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad d) (a^m)^n = a^{mn}$$

Tanım: (irrasyonel Sayılar):

$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ kümesinin her bir elemanına bir irrasyonel sayı denir. İrrasyonel sayılar kümesi I ile gösterilir.

Örnek 1, $\sqrt{2}$ sayısı irrasyonel sayıdır.

Örnek 2, $r \in \mathbb{Q}$ ve $\alpha \in \mathbb{I}$ olsun. $r \neq 0$ olduğuna göre aşağıdaki sayıların herbirinin bir irrasyonel sayı olduğunu gösterin.

$$a) -\alpha \quad b) \alpha + r \quad c) \alpha - r \quad d) \alpha r \quad e) \frac{\alpha}{r} \quad f) \frac{r}{\alpha}, \alpha \neq 0 \quad g) \frac{1}{\alpha}, \alpha \neq 0$$

$$h) \sqrt{\alpha}, \alpha \neq 0$$

İspat, b) $\alpha + r$ irrasyoneldir. ?

Aksini kabul edelim. Yani $\alpha + r$ rasyonel olsun.

$$\alpha + r \in \mathbb{Q} \Rightarrow \alpha + r = p \in \mathbb{Q} \text{ olacak şekilde bir } p \text{ rasyonel sayısı vardır.}$$

$$\Rightarrow \alpha = p - r \in \mathbb{Q} \Rightarrow \alpha \in \mathbb{Q} \Rightarrow \text{hipoteze aykırıdır.}$$

$$\Rightarrow \alpha \in \mathbb{Q} \wedge \alpha \notin \mathbb{Q} \Rightarrow \text{kabulümüz yanlıştır.}$$

$$\Rightarrow \alpha + r \notin \mathbb{Q} \Rightarrow \alpha + r \in \mathbb{I}$$

Teorem: Herhangi iki rasyonel sayı arasında en az bir irrasyonel sayı vardır.

$$\text{İspat, } u, v \in \mathbb{Q} \Rightarrow u < v \Rightarrow v - u > 0 \Rightarrow \frac{v-u}{\sqrt{2}} > 0 \Rightarrow \underbrace{\frac{v-u}{\sqrt{2}} + u}_p > u$$

$$\Rightarrow 1 < \sqrt{2} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} < 1 \Rightarrow \frac{v-u}{\sqrt{2}} < v-u \Rightarrow \underbrace{\frac{v-u}{\sqrt{2}} + u}_p < v, \quad p > u \text{ ve } p < v$$

$$\Rightarrow u < p < v \wedge p \in \mathbb{I}$$

Problemler:

$$1 - a, b \in \mathbb{R}^+ \text{ olmak üzere, } f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = a^x + b^x \text{ ve } g(x) = \frac{f(3x)}{f(x)}$$

fonksiyonları verildiğine göre (fog) fonksiyonu ?

$$2 - |16 - 4x^2| < 1 \quad \mathbb{R} \text{ deki doğruluğu ?}$$

$$3 - |2x - 3| > 5 \quad " \quad " \quad ?$$

4- $|3x-11| < 5 \wedge \frac{x^2-16}{x} < 0$ $\mathbb{R}$ 'deki doğruluk kümesi?

5- $|5-2x| < 2 \wedge x^2 < 5$ " " "

6- $|3x+4| < |2x+5|+1$ " " "

7- $\sqrt{2\sqrt[3]{2}\sqrt[3]{2}}$ reel sayısını en basit biçimde yazın.

8- $A = \{(x,y) : x,y \in \mathbb{R} \wedge 3y-2x=3\}$

$B = \{(x,y) : x,y \in \mathbb{R} \wedge \frac{4x-3y+2}{1-2x} = -3\}$

$C = \{(x,y) : x,y \in \mathbb{R} \wedge \frac{4}{3}x + \frac{1}{2}y = -\frac{1}{3}\}$ ise $A \cap B \cap C = ?$

9- $\sqrt{6}$ sayısının irrasyonel olduğunu gösterin.

10- Herhangi iki irrasyonel sayı arasında en az bir irrasyonel sayı olduğunu ispatlayın.

Çözümler :

2- $|16-4x^2| < 1$

a) $-1 < 16-4x^2 < 1 \Rightarrow -17 < -4x^2 < -15 \Rightarrow \frac{17}{4} > x^2 > \frac{15}{4}$
 $\Rightarrow \frac{17}{4} > x^2 \wedge x^2 > \frac{15}{4}$
 $\Rightarrow \left(\frac{17}{4} - x^2\right) > 0 \wedge \left(x^2 - \frac{15}{4}\right) > 0$
 $\Rightarrow \left(\frac{\sqrt{17}}{2} - x\right)\left(\frac{\sqrt{17}}{2} + x\right) > 0 \wedge \left(x - \frac{\sqrt{15}}{2}\right)\left(x + \frac{\sqrt{15}}{2}\right) > 0$

b) $|16-4x^2| = \begin{cases} 16-4x^2, & 16-4x^2 \geq 0 \text{ ise} \\ -(16-4x^2), & 16-4x^2 < 0 \text{ ise} \end{cases} = \begin{cases} 16-4x^2, & -2 \leq x \leq 2 \\ -(16-4x^2), & x < -2 \vee x > 2 \end{cases}$

$16-4x^2 \geq 0 \text{ ise} \Rightarrow 4-x^2 \geq 0 \Rightarrow (2-x)(2+x) \geq 0 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2$

I) $-2 \leq x \leq 2 \Rightarrow 16-4x^2 < 1 \Rightarrow -4x^2 < -15 \Rightarrow x^2 > \frac{15}{4} \Rightarrow \left(x < -\frac{\sqrt{15}}{2} \vee x > \frac{\sqrt{15}}{2}\right)$
 $\wedge (-2 \leq x \leq 2) \Rightarrow D_1 = \left[-2, -\frac{\sqrt{15}}{2}\right) \vee \left(\frac{\sqrt{15}}{2}, 2\right]$

II) $(x < -2 \vee x > 2) \Rightarrow -16+4x^2 < 1 \Rightarrow 4x^2 < 17 \Rightarrow x^2 < \frac{17}{4}$
 $\Rightarrow \left(-\frac{\sqrt{17}}{2} < x < \frac{\sqrt{17}}{2}\right) \wedge (x < -2 \vee x > 2) \Rightarrow D_2 = \left(-\frac{\sqrt{17}}{2}, -2\right) \vee \left(2, \frac{\sqrt{17}}{2}\right)$
 $D = D_1 \cup D_2 = \left(-\frac{\sqrt{17}}{2}, -\frac{\sqrt{15}}{2}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{15}}{2}, \frac{\sqrt{17}}{2}\right)$

4- $\underbrace{|3x-11| < 5}_{D_1} \wedge \underbrace{\frac{x^2-16}{x} < 0}_{D_2}$

$D = D_1 \cap D_2$

$$|3x-11| < 5, \quad |3x-11| = \begin{cases} 3x-11, & 3x-11 \geq 0 \text{ ise} \\ -(3x-11), & 3x-11 < 0 \text{ ise} \end{cases} = \begin{cases} 3x-11, & x \geq \frac{11}{3} \\ -3x+11, & x < \frac{11}{3} \end{cases}$$

$$\text{I} - x \geq \frac{11}{3} \Rightarrow 3x-11 < 5 \Rightarrow 3x < 16 \Rightarrow x < \frac{16}{3} \Rightarrow \left(x \geq \frac{11}{3} \wedge x < \frac{16}{3}\right) \\ \Rightarrow D_1 = \left[\frac{11}{3}, \frac{16}{3}\right), \quad x < \frac{11}{3} \Rightarrow D_2 = \emptyset \quad D_1 \cup D_2 = \left[\frac{11}{3}, \frac{16}{3}\right)$$

$$\text{II} - \frac{x^2-16}{x} < 0 \Rightarrow \frac{(x-4)(x+4)}{x} < 0 \Rightarrow \begin{cases} x-4 < 0 \rightarrow x < 4 \\ x+4 < 0 \rightarrow x < -4 \\ x < 0 \rightarrow x < 0 \end{cases}$$

x	-	-4	+	0	+	4	+
x-4	-	-	-	0	+	+	+
x+4	-	0	+	+	+	+	+
$\frac{x^2-16}{x}$	-	-	+	-	+	+	+

$$D_3 = (-\infty, -4) \cup (0, 4)$$

$$D = D_1 \cap D_3 = \left[\frac{11}{3}, \frac{16}{3}\right) \cap (0, 4) = \left[\frac{11}{3}, 4\right)$$

yanlış
(2,4) olarak

$$6 - |3x+4| < |2x+5| + 1$$

$$|3x+4| = \begin{cases} 3x+4, & 3x+4 \geq 0 \\ -(3x+4), & 3x+4 < 0 \end{cases} = \begin{cases} 3x+4, & x \geq -\frac{4}{3} \\ -3x-4, & x < -\frac{4}{3} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} -\frac{5}{2}, -\frac{4}{3} &\Rightarrow -\frac{15}{6}, -\frac{8}{6} \\ (3) \quad (2) &\Rightarrow -\frac{15}{6} < -\frac{8}{6} \end{aligned}$$

$$|2x+5| = \begin{cases} 2x+5, & 2x+5 \geq 0 \\ -(2x+5), & 2x+5 < 0 \end{cases} = \begin{cases} 2x+5, & x \geq -\frac{5}{2} \\ -2x-5, & x < -\frac{5}{2} \end{cases}$$

$$\text{I} \quad -\frac{15}{6} \quad -\frac{8}{6} \quad \text{II}$$

$$\text{i} - x < -\frac{5}{2} \Rightarrow -3x-4 < -2x-5+1 \Rightarrow 0 < x \Rightarrow \left(x < -\frac{5}{2} \wedge 0 < x\right) \\ \Rightarrow D_1 = \emptyset$$

$$\text{ii} - -\frac{5}{2} \leq x < -\frac{4}{3} \Rightarrow -3x-4 < 2x+5+1 \Rightarrow -10 < 5x \Rightarrow -2 < x \\ \Rightarrow \left(-2 < x \wedge -\frac{5}{2} \leq x < -\frac{4}{3}\right) \Rightarrow D_2 = \left(-2, -\frac{4}{3}\right)$$

$$\text{iii} - x \geq -\frac{4}{3} \Rightarrow 3x+4 < 2x+5+1 \Rightarrow x < 2 \Rightarrow \left(x < 2 \wedge x \geq -\frac{4}{3}\right) \\ \Rightarrow D_3 = \left[-\frac{4}{3}, 2\right)$$

$$D = D_1 \cup D_2 \cup D_3 \Rightarrow \emptyset \cup \left(-2, -\frac{4}{3}\right) \cup \left[-\frac{4}{3}, 2\right) = (-2, 2)$$

KOMPLEKS (KARMAŞIK) SAYILAR

$\forall x \in \mathbb{R}$ için $x^2 \geq 0$, önermesi doğrudur.

$x^2 = -1$ önermesinin $\mathbb{R}$ deki çözümü $\emptyset$ dir.

Tanım: (kompleks-karmaşık-îmajiner Sayılar):

$\mathbb{C} = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$ olan $\mathbb{C}$ kümesine, karmaşık (kompleks) sayılar

kümesi denir. $\mathbb{C}$ nin her bir elemanına bir karmaşık sayı denir.

Eğer $(x, y) \in \mathbb{C}$ ise

x : karmaşık sayının reel (gerçek kısmı)

y : " " imajiner (sanal-kompleks kısmı) denir.

$z = (x, y)$ ise $x = \operatorname{Re}(z)$ ve $y = \operatorname{Im}(z)$ şeklinde ifade edilir.

Örnek, $(-2, 3), (0, -1), (\sqrt{2}, \frac{1}{2})$ reel sayı ikililerinin herbiri bir karmaşık sayıdır.

$$\bullet z = (\sqrt{2}, \frac{1}{2}) \Rightarrow \sqrt{2} = \operatorname{Re}(z), \frac{1}{2} = \operatorname{Im}(z)$$

Tanım: (eşitlik) : $(x, y), (u, v) \in \mathbb{C}$ olsun.

$$(x, y) = (u, v) \Leftrightarrow (x = u \wedge y = v)$$

Tanım: $\mathbb{C}$ kümesinde,

$$1^\circ \oplus : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$(x, y), (u, v) \longrightarrow (x, y) \oplus (u, v) = (x + u, y + v)$$

işlemine toplama işlemi denir.

$$2^\circ \odot : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$(x, y), (u, v) \longrightarrow (x, y) \odot (u, v) = (xu - yv, xv + yu)$$

işlemine çarpma işlemi denir.

Teorem: $(\mathbb{C}, \oplus, \odot)$ matematik yapısı bir cisimdir.

I- $(\mathbb{C}, \oplus)$ abel grubudur.

II- $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \odot)$ abel grubudur.

III- Dağılım özelliği vardır.

I- a) $\forall (x, y) \in \mathbb{C}, (x, y) \oplus (u, v) = (u, v) \oplus (x, y) = (x, y), (u, v) = e \in \mathbb{C} ?$

$$(x, y) \oplus (u, v) = (x, y) \Rightarrow (x + u, y + v) = (x, y) \Rightarrow (x + u = x) \wedge (y + v = y)$$

$$\Rightarrow u = 0 \wedge v = 0 \Rightarrow e = (u, v) = (0, 0) \in \mathbb{C} \text{ birim eleman.}$$

b) $z = (x, y) \Rightarrow -z = (-x, -y) \in \mathbb{C}$ ters eleman.

II- $(\mathbb{C} \setminus \{0, 0\}, \odot)$ abel grubudur.

a) $\forall (x, y) \in \mathbb{C} \setminus \{0, 0\}, (x, y) \odot (u, v) = (u, v) \odot (x, y) = (x, y), e = (u, v) \in \mathbb{C} ?$

$$(x, y) \odot (u, v) = (x, y) \Rightarrow (xu - yv, xv + yu) = (x, y)$$

$$\Rightarrow xu - yv = x \wedge xv + yu = y$$

$$\Rightarrow x^2u - xyv = x^2 \wedge y^2u + xyv = y^2$$

$$\Rightarrow (x^2 + y^2)u = x^2 + y^2$$

$$\Rightarrow (u = 1 \wedge v = 0) \Rightarrow e = (1, 0) \in \mathbb{C} \text{ birim eleman}$$

$$b) \forall x, y \in \mathbb{C}, (x, y) \odot (u, v) = (u, v) \odot (x, y) = (1, 0), (u, v) = (x, y)^{-1} \in \mathbb{C}$$

$$\Rightarrow (x, y) \odot (u, v) = (1, 0) \Rightarrow (xu - yv, xv + yu) = (1, 0)$$

$$\Rightarrow (xu - yv = 1 \wedge xv + yu = 0)$$

$$\Rightarrow ux^2 - xyv = x \wedge uy^2 + xyv = 0$$

$$\Rightarrow u(x^2 + y^2) = x$$

$$\Rightarrow u = \frac{x}{x^2 + y^2} \wedge v = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$\Rightarrow (x, y)^{-1} = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, -\frac{y}{x^2 + y^2} \right) \in \mathbb{C} \setminus \{0, 0\} \text{ ters eleman.}$$

III - $\odot$ nin $\oplus$ üzerine dağılma özelliği.

Teorem: $\mathbb{C}_R = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ olduğuna göre $(\mathbb{C}_R, \oplus, \odot)$ yapısı bir cisimdir.

Bu cisim $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ cismine izomorftur.

İspat // $f: \mathbb{C}_R \longrightarrow \mathbb{R}$
 $(x, 0) \longmapsto f(x, 0) = x$ tanımlanıyor.

$$I - (x, 0), (y, 0) \in \mathbb{C}_R, f[(x, 0) \oplus (y, 0)] = f(x+y, 0) = x+y = f(x, 0) + f(y, 0)$$

$$II - f[(x, 0) \odot (y, 0)] = f(xy - 0 \cdot 0, x \cdot 0 + y \cdot 0) = f(xy, 0) = xy = f(x, 0) \cdot f(y, 0)$$

III - f , 1:1 ve örtdür.

$$\mathbb{R} \cong \mathbb{C}_R$$

$$(x, 0) = x, (0, 0) = 0, (1, 0) = 1$$

Tanım: (Çıkarma ve Bölme):

$z, w \in \mathbb{C}$ olduğuna göre

1° $z \oplus (-w)$ sayısına " z ile w nin farkı" denir ve $z - w$ ile gösterilir.

Bu işleme de çıkarma işlemi denir.

2° $z \odot (w)^{-1}$ sayısına " z nin w ya bölümü" denir ve $z : w, \frac{z}{w}$ ile gösterilir.

Bu işleme de bölme işlemi denir.

Örnek // $z = (-1, 2), w = (3, -4) \Rightarrow -w = (-3, -(-4)) = (-3, 4)$

$$z - w = z \oplus (-w) = (-1 - 3, 2 + 4) = (-4, 6)$$

$$w^{-1} = \frac{1}{w} = \left(\frac{3}{3^2 + (-4)^2}, \frac{-(-4)}{3^2 + (-4)^2} \right) = \left(\frac{3}{25}, \frac{4}{25} \right)$$

$$\frac{z}{w} = z \odot w^{-1} = (-1, 2) \odot \left(\frac{3}{25}, \frac{4}{25} \right) = \left(-\frac{3}{25} - \frac{8}{25}, -\frac{4}{25} + \frac{6}{25} \right) = \left(-\frac{11}{25}, \frac{2}{25} \right)$$

Teorem: (sadeleştirme) : $z, u, w \in \mathbb{C}$ olduğuna göre $u \neq 0$ ve $v \neq 0$ ise

$$\frac{z \odot v}{u \odot v} = \frac{z}{u}$$

ispat // $\frac{z \odot v}{u \odot v} = (z \odot v) \odot (u \odot v)^{-1} = (z \odot v) \odot (v^{-1} \odot u^{-1})$ (işlemin özelliğinden)

$$= z \odot (v \odot v^{-1}) \odot u^{-1}$$

$$= z \odot e \odot u^{-1}$$

$$= z \odot u^{-1} = \frac{z}{u}$$

Tanım: (karmaşık Sayıların Tam Kuvvetleri) :

$z \in \mathbb{C}$ ve $n \in \mathbb{N}$ olmak üzere,

a) $z \neq 0$ ise $z^0 = 1$

b) $z^{n+1} = z^n \odot z$

c) $z^1 = z$

d) $z \neq 0$, $z^{-n} = (z^{-1})^n$

Tanım: $(0,1) = i$ ile gösterilir.

Teorem: $i^2 = -1$ dir.

ispat // $i^2 = i \odot i = (0,1) \odot (0,1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) = -1 \Rightarrow i^2 = -1 //$

Teorem: $(x,y) \in \mathbb{C}$ olduğuna göre $(x,y) = x \oplus (i \odot y)$ dir.

ispat // $(x,y) = (x,0) \oplus (0,y)$

$$i \odot (y,0) = (0,1) \odot (y,0) = (0 \cdot y - 1 \cdot 0, 0 \cdot 0 + 1 \cdot y) = (0,y)$$

$$\Rightarrow (x,y) = (x,0) \oplus [i \odot (y,0)] \quad (x,0) = x \wedge (y,0) = y$$

$$\Rightarrow (x,y) = x \oplus (i \odot y)$$

Sonuç // $\oplus = +$, $\odot = \cdot$ $\Rightarrow (x,y) = x+iy$

Tanım: (x,y) kompleks sayısının $x+iy$ şeklindeki gösterimine kompleks sayının normal (cebirsel) biçimi denir.

Sonuç // $z = x+iy$ ve $w = u+iv$ olduğuna göre ,

1- $z+w = (x+u) + (y+v)i$

3- $z \cdot w = (xu-yv) + (xv+yu)i$

2- $z-w = (x-u) + (y-v)i$

4- $z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{x+iy} = \frac{x-iy}{(x+iy)(x-iy)}$

$$= \frac{x}{x^2+y^2} + i \frac{-y}{x^2+y^2}$$

Problemler :

1- $(-3-4i)-(2+3i)$, $(1-2i)^3$, $\frac{(3+5i)}{(1-i)}$, $\frac{(1+i)}{i}$ kompleks sayılarını normal biçimde yazın.

2- $\frac{1+2i}{3-4i} + \frac{2+i}{5i} = ?$, $(1-i)^4 = ?$

3- $n \equiv r \pmod{4}$ olduğuna göre $i^n = i^r$ olduğunu ispat edin.

4- $\frac{3i^{30}-i^{19}}{2i-1}$ en basit şekilde yazın.

Çözümler:

1- $(-3-4i)-(2+3i) = (-3-2)+i(-4-3) = -5-7i //$

$(1-2i)^3 = 1^3 + 3(1)^2(-2i) + 3(1)(-2i)^2 + (-2i)^3 = -11+2i //$

$(3+5i):(1-i) = \frac{(3+5i)(1+i)}{(1+i)(1-i)} = -1+4i //$

2- $\frac{1+2i}{3-4i} + \frac{2+i}{5i} = \frac{(1+2i)(3+4i)}{(3-4i)(3+4i)} + \frac{(2+i)(-i)}{5i(-i)} = \frac{(3-8)+i(4+6)}{3^2+4^2} - \frac{2i-1}{5}$
 $= \frac{-5+10i}{25} - \frac{1+2i}{5} = \frac{-1+2i}{5} + \frac{1-2i}{5} = 0 //$

• $(1-i)^4 = [(1-i)^2]^2 = (1-2i+i^2)^2 = (1-2i-1)^2 = 4 //$

3- $n \equiv r \pmod{4} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, n = r + 4k$

$\Rightarrow i^n = i^{r+4k}$

$\Rightarrow i^n = i^r \cdot i^{4k} \quad (i^4)^k = 1^k = 1$

$\Rightarrow i^n = i^r \cdot (i^4)^k \Rightarrow i^n = i^r //$


4- $\frac{3i^{30}-i^{19}}{2i-1}$

$30 \equiv 2 \pmod{4} \Rightarrow i^{30} = i^2 = -1$

$19 \equiv 3 \pmod{4} \Rightarrow i^{19} = i^3 = i^2 \cdot i = -i$

$= \frac{3(-1)-(-i)}{2i-1} = \frac{-3+i}{2i-1} = \frac{(-3+i)(-2i-1)}{(2i-1)(-2i-1)} = \frac{(3+2)+i(6-1)}{1+4} = \frac{5(1+i)}{5} = 1+i //$

Karmaşık Sayıların Geometrik Gösterimi




$\vec{v} = (x, y) = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$

$z = (x, y)$ Bu düzleme kompleks düzlem denir.

OX eksenini : Reel (gerçek) eksen.

OY " : İmajiner (sanal) " .

$z = x + iy$ kompleks sayısını grafikte çizmek için, bileşenleri x ve y olan iki nokta alırız. Kesişimleri kompleks sayı olan bir nokta bulunur.




Tanım: (eşlenik) : " $z = x + iy$ kompleks (karmaşık) sayısının eşleniği" diye $x - iy$ karmaşık sayısına denir ve $\bar{z}$ ile gösterilir.

$$z = x + iy \Rightarrow \bar{z} = x - iy \text{ dir.}$$

Örnek, $z = 3 - 2i$ ise $\bar{z} = 3 + 2i$ dir.

Teorem: $z, w \in \mathbb{C}$ olduğuna göre,



$$1- \overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$$

$$2- \overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$$

$$3- \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}} \quad (z \neq 0)$$

$$4- \overline{\left(\frac{\bar{z}}{w}\right)} = \frac{z}{\bar{w}} \quad (w \neq 0)$$

$$5- z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$$

$$6- z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$$

İspat, $z = x + iy$ ve $w = u + iv$ olsun.

$$1- \overline{z+w} = \overline{(x+u) + i(y+v)} = (x+u) - i(y+v) = (x-iy) + (u-iv) = \bar{z} + \bar{w}$$

$$2- z \cdot w = (x+iy)(u+iv) = xu - yv + i(xv + yu)$$

$$\overline{z \cdot w} = (xu - yv) - i(xv + yu)$$

$$\bar{z} \cdot \bar{w} = (x-iy)(u-iv) = xu - yv + i(-xv - yu) = xu - yv - i(xv + yu)$$

$$\Rightarrow \overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$$

$$3- \frac{1}{z} = \frac{1}{x+iy} = \frac{x-iy}{(x+iy)(x-iy)} = \frac{x}{x^2+y^2} + i \frac{-y}{x^2+y^2}$$

$$\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{x}{x^2+y^2} - i \frac{-y}{x^2+y^2} = \frac{x}{x^2+y^2} + i \frac{y}{x^2+y^2}$$

$$\frac{1}{\bar{z}} = \frac{1}{x-iy} = \frac{x+iy}{(x-iy)(x+iy)} = \frac{x}{x^2+y^2} + i \frac{y}{x^2+y^2}$$

$$\left. \begin{aligned} \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} &= \frac{x}{x^2+y^2} + i \frac{y}{x^2+y^2} \\ \frac{1}{\bar{z}} &= \frac{x}{x^2+y^2} + i \frac{y}{x^2+y^2} \end{aligned} \right\} \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}$$

$$4- \left(\frac{\bar{z}}{w} \right) = \overline{\left(z \cdot \frac{1}{w} \right)} = \bar{z} \cdot \overline{\left(\frac{1}{w} \right)} = \bar{z} \cdot \frac{1}{\bar{w}} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$$



$$5- z + \bar{z} = (x+iy) + (x-iy) = 2 \operatorname{Re}(z) = 2x$$

$$6- z - \bar{z} = (x+iy) - (x-iy) = 2i \operatorname{Im}(z) = 2iy$$

Tanım: (Karmaşık Sayının Mutlak Değeri):

$z = x+iy$ olduğuna göre, $\sqrt{x^2+y^2}$ gerçel sayısına z karmaşık sayısının mutlak değeri (modülü) denir ve sembolik olarak $|z|$ şeklinde gösterilir.

$$|z| = \sqrt{x^2+y^2} \quad "z \text{ modül}" \text{ veya } "m\ddot{o}d\ddot{u}l \ z" \text{ diye okunur.}$$



$$|z-w| = |x+iy - (u+iv)|$$

$$= |(x-u) + i(y-v)|$$

$$|z-w| = \sqrt{(x-u)^2 + (y-v)^2}$$

Teorem: $z, w \in \mathbb{C}$ olsun.

$$1- |z| = |\bar{z}|$$

$$2- |z|^2 = z \cdot \bar{z}$$

$$3- |z| \geq |\operatorname{Re}(z)| \geq \operatorname{Re}(z)$$

$$4- |z| \geq |\operatorname{Im}(z)| \geq \operatorname{Im}(z)$$

$$5- |z| \geq 0$$

$$6- |z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

$$7- |z \cdot w| = |z| \cdot |w|$$

$$8- \left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}$$

İspat: $z = x+iy \Rightarrow \bar{z} = x-iy$

$$\left. \begin{aligned} 2- |z| = \sqrt{x^2+y^2} &\Rightarrow |z|^2 = x^2+y^2 \\ z \cdot \bar{z} &= (x+iy)(x-iy) = x^2+y^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow |z|^2 = z \cdot \bar{z}$$

$$3- |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq \sqrt{x^2 + 0} = \sqrt{|x|^2}$$

$$\Rightarrow |z| \geq |x| \geq x \Rightarrow |z| \geq |\operatorname{Re}(z)| \geq \operatorname{Re}(z)$$

$$6- |z| = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0 \wedge y = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

$$7- |z \cdot w|^2 = (zw)(\overline{zw}) = (zw)(\overline{z} \cdot \overline{w}) = (z\overline{z})(w\overline{w}) = |z|^2 |w|^2$$

$$\Rightarrow |zw|^2 = (|z||w|)^2 \Rightarrow |zw| = |z||w|$$

Teorem : (Schwarz Esitsizligi) :

$i \in \{1, 2, 3, 4, \dots, n\}$ için $x_i, y_i \in \mathbb{R}$ olsun.

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)$$

Teorem : (Üçgen Esitsizligi) :

$z, w \in \mathbb{C}$ için

$$1- |z+w| \leq |z| + |w|$$

$$2- ||z| - |w|| \leq |z - w|$$

İspat // 1- $z = x + iy$ $w = u + iv$ olsun.

$$|z+w|^2 = |(x+u) + i(y+v)|^2 = (x+u)^2 + (y+v)^2$$

$$= (x^2 + y^2) + (u^2 + v^2) + 2(xu + yv)$$

$$(xu + yv)^2$$

$$n=2 \quad x_1 = x, x_2 = y, y_1 = u, y_2 = v$$

$$\left(\sum_{i=1}^2 x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^2 x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^2 y_i^2 \right)$$

$$\Rightarrow (x_1 y_1 + x_2 y_2)^2 \leq (x_1^2 + x_2^2) (y_1^2 + y_2^2)$$

$$(xu + yv)^2 \leq (x^2 + y^2) (u^2 + v^2)$$

$$(xu + yv) \leq \sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{u^2 + v^2}$$

$$\Rightarrow |z+w|^2 \leq (x^2 + y^2) + (u^2 + v^2) + 2\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{u^2 + v^2}$$

$$\Rightarrow |z+w|^2 \leq (\sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{u^2 + v^2})^2$$

$$\Rightarrow |z+w|^2 \leq (|z| + |w|)^2$$

$$\Rightarrow |z+w| \leq |z| + |w|$$

7.6.1994


SALI Örnek // $z \in \mathbb{C}$ olduğuna göre aşağıdaki bağıntıları gerçekleyen noktaları

kümelerini karmaşık düzlemde gösterin.

a) $|z|=1$ b) $|z|<1$ c) $|z|\leq 1$ d) $z+\bar{z}=1$ e) $z-\bar{z}=i$ f) $z+\bar{z}=|z|^2$

a- $\{(x,y): x,y \in \mathbb{R} \wedge |z|=1\} = \{(x,y): x,y \in \mathbb{R} \wedge x^2+y^2=1\}$


$z=x+iy \Rightarrow |z|=\sqrt{x^2+y^2}=1 \Rightarrow x^2+y^2=1$



c- $|z|\leq 1$ (çemberin üzerindeki ve içindeki noktaların kümesidir.)

f- $z+\bar{z}=|z|^2$

$\{(x,y): 2x=x^2+y^2\} = \{(x,y): (x-1)^2+y^2=1\}$



Örnek // Aşağıdaki kümeleri karmaşık düzlemde gösterin.

a) $\{z: z \in \mathbb{C}, |z|=5 \text{ ve } \text{Im}(z)=3\} = M$

b) $\{z: z \in \mathbb{C}, \text{Im}(z)=1\}$


c) $\{z: z \in \mathbb{C}, |z-(1+i)|=3\}$

a- $z=x+iy, |z|=5 \Rightarrow \sqrt{x^2+y^2}=5 \Rightarrow x^2+y^2=5^2$

$\text{Im}(z)=3 \Rightarrow y=3$

$M = \{(x,y): x^2+y^2=5^2 \wedge y=3\}$

$= \{(-4,3), (4,3)\}$



Örnek // Aşağıdaki karmaşık sayılardan herbiri için $|z|$, $\bar{z}$, $z\bar{z}$, $\frac{z}{\bar{z}}$ ifadelerini bulun.

a) $3+2i$ b) $-i$ c) 1 d) $\frac{1}{3+2i}$ e) $i^{15}-1$

a- $z=3+2i \Rightarrow |z|=\sqrt{3^2+2^2}=\sqrt{13}$

$\Rightarrow \bar{z}=3-2i$

$\Rightarrow z\bar{z}=|z|^2=13$

$\Rightarrow \frac{z}{\bar{z}} = \frac{3+2i}{3-2i} = \frac{(3+2i)^2}{13} = \frac{5+12i}{13}$

Örnek // b belirli bir karmaşık sayı a ve c gerçel sayılar ve $a \neq 0$ ise

a $z\bar{z} + b\bar{z} + \bar{b}z + c = 0$ bağıntısını gerçekleyen z noktalarının karmaşık

düzlemde bir çember üzerinde olduğunu ispatlayın.

ispat, $z = x + iy$, $b = p + iq$ $b\bar{z} = w$ diyelim. $\overline{b \cdot \bar{z}} = \overline{w} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \bar{w} = \overline{b \cdot \bar{z}} = \bar{b} \cdot z$$

$$\Rightarrow b \cdot \bar{z} + \bar{b} \cdot z = w + \bar{w} = 2\operatorname{Re}(w)$$

$$w = b \cdot \bar{z} = (p + iq)(x - iy)$$

$$= px + qy + i(-py + qx)$$

$$\operatorname{Re}(w) = px + qy$$

$$a \cdot (x^2 + y^2) + 2(px + qy) + c = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 + 2\frac{p}{a}x + 2\frac{q}{a}y + \frac{c}{a} = 0$$

(Çember denklemidir.)

Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi

$$z = (x, y) = x + iy \in \mathbb{C}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{|z|} \quad \sin \theta = \frac{y}{|z|}$$

$$\Rightarrow x = |z| \cos \theta \quad \wedge \quad y = |z| \sin \theta$$

$$\Rightarrow |z| = x + iy$$

$$= |z| \cos \theta + i |z| \sin \theta = |z| (\cos \theta + i \sin \theta)$$


$$z = |z| (\cos \theta + i \sin \theta) \quad (z \text{ nin kutupsal biçimi})$$

θ : z 'nin argümenti (ağısı) dir.

$0 \leq \theta < 2\pi$ olan ağıya z nin asıl argümenti denir. $[0, 2\pi)$

z 'nin argümenti özel olarak $\operatorname{Arg} z$, $([0, 2\pi))$ de genel olarak $\arg z$ ile gösterilir.

örnek //



$$a) \operatorname{Arg} z = 0 \quad b) \operatorname{Arg} z_1 = \frac{\pi}{2} \quad c) \frac{\pi}{2} < \operatorname{Arg} z_2 < \pi$$

örnek // Aşağıdaki kompleks sayıların argümentlerini bulalım.

$$a) 1 \quad b) -1 \quad c) i \quad d) -i \quad e) -1 - i = z$$

$$a) 0^\circ \quad b) \pi \quad c) \frac{\pi}{2} \quad d) \frac{3\pi}{2}$$

$$e) z = |z| (\cos \theta + i \sin \theta) = \sqrt{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}} \right) \quad \cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \wedge \quad \sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\theta = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$$

Teorem: $z = |z|(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ $\wedge$ $w = |w|(\cos \theta + i \sin \theta)$ olduğuna göre

a) $z \cdot w = |z| \cdot |w| [\cos(\alpha + \theta) + i \sin(\alpha + \theta)]$

b) $\frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|} [\cos(\alpha - \theta) + i \sin(\alpha - \theta)]$ dir.

İspat // a) $z \cdot w = |z| \cdot |w| (\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \theta + i \sin \theta)$
 $= |z| \cdot |w| [\cos \alpha \cos \theta - \sin \alpha \sin \theta + i(\cos \alpha \sin \theta + \sin \alpha \cos \theta)]$
 $= |z| \cdot |w| [\cos(\alpha + \theta) + i \sin(\alpha + \theta)]$

Teorem: (kompleks sayıların tam kuvvetleri - De Moivre Formülü) :

$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ve $n \in \mathbb{Z}^+$ olduğuna göre ;

$\{z^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)\}$ dir

İspat // (Tümevarım metoduyla yapılacaktır.)

$n=1$ için $z^1 = z \Rightarrow 1 \in \mathbb{D}$

$n=k$ için önerme doğru olsun. $z^k = r^k(\cos k\theta + i \sin k\theta)$

$n=k+1 \Rightarrow z^{k+1} = z^k \cdot z$

$= r^k(\cos k\theta + i \sin k\theta) r(\cos \theta + i \sin \theta)$

$z^{k+1} = r^{k+1} [\cos k\theta \cdot \cos \theta - \sin k\theta \sin \theta + i(\cos k\theta \sin \theta + \sin k\theta \cos \theta)]$

$= r^{k+1} [\cos(k+1)\theta + i \sin(k+1)\theta] \Rightarrow k+1 \in \mathbb{D}$

Örnek // $\cos 3\theta$ ve $\sin 3\theta$ 'yi, $\sin \theta$ ve $\cos \theta$ cinsinden yazınız.

$\left. \begin{matrix} n=3 \\ r=1 \end{matrix} \right\} \cos 3\theta + i \sin 3\theta = (\cos \theta + i \sin \theta)^3$

$= \cos^3 \theta + 3 \cos^2 \theta (i \sin \theta) + 3 \cos \theta (i \sin \theta)^2 + (i \sin \theta)^3$

$= \cos^3 \theta + i 3 \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta$

$= \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta + i(3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta)$

$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$ $\wedge$ $\sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta$

Ödev // $\cos 5\theta$ ve $\sin 5\theta$ 'yi, $\cos \theta$ ve $\sin \theta$ cinsinden hesaplayın.

Teorem: $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$ ve $n \in \mathbb{Z}^+$ olduğuna göre

$z^{-n} = (z^{-1})^n = |z|^{-n} [\cos(-n\theta) + i \sin(-n\theta)]$

İspat // z^{-1} yerine değerini yazalım.

$$\frac{1}{z} = z^{-1} = \frac{1}{|z|(\cos\theta + i\sin\theta)} = \frac{1}{|z|} (\cos\theta - i\sin\theta)$$

$$= |z|^{-1} [\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)]$$

$$\Rightarrow z^{-n} = \left\{ |z|^{-1} [\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)] \right\}^n$$

$$\Rightarrow z^{-n} = |z|^{-n} [\cos(-n\theta) + i\sin(-n\theta)]$$

Tanım: Katsayıları $\mathbb{C}$ den seçilen bir polinom $P(x)$ olsun.

$P(x)=0$ denkleminde bir polinom denklemi, denklemi sağlayan her bir karmaşık sayıya denklemin bir kökü (çözümü) denir.

Teorem: Katsayıları $\mathbb{C}$ den seçilen bir polinom denkleminin en az bir kökü vardır. (ispatı yapılmayacaktır.)

Tanım: $z \in \mathbb{C}$ ve $n \in \mathbb{Z}^+$ olduğuna göre $w^n = z$ denklemini sağlayan (gerçekleyen), w kompleks sayıların herbirine z nin, n 'inci kuvvetten bir kökü denir. Ve $z^{1/n}$ ile gösterilir.

Teorem: Sıfırdan farklı bir karmaşık sayının n . kuvvetten farklı n tane kökü vardır.

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ ve $n \in \mathbb{Z}^+$ olduğuna göre $k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ olmak üzere bu kökler,

$$z_k = |z|^{1/n} \left[\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right] \text{ şeklindedir.}$$

İspat // (Bu teorem ispatlanmayacaktır. Gerçekten $w^n = z$ olduğunu görelim.)

$$w^n = z \Rightarrow (z_k)^n = \left[|z|^{1/n} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right]^n$$

$$= |z| \left[\cos n \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin n \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right]$$

$$= |z| (\cos(\theta + 2k\pi) + i \sin(\theta + 2k\pi))$$

$$= |z| (\cos\theta + i\sin\theta) = z$$

Örnek // $w^4 = -1 \Rightarrow z = -1 = |z|(\cos\theta + i\sin\theta) \quad |z| = 1$

$$\cos\theta = -1 \quad \sin\theta = 0 \quad \pi = \theta \quad z = (\cos\pi + i\sin\pi) = \cos(\pi + 2k\pi) + i\sin(\pi + 2k\pi)$$

$$w^4 = z \Rightarrow w = z^{1/4}$$

$$z^{1/4} = 1^{1/4} \left[\cos \frac{\pi + 2k\pi}{4} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{4} \right]$$

$$k=0, w_1 = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$k=1, w_2 = \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} = -\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$k=2, w_3 = \cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} = -\frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$k=3, w_4 = \cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Örnek // $\text{Arg}(-3+3i) = ?$

$$|-3+3i| = 3\sqrt{2} \quad z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) \quad \left\{ \cos \theta = \frac{-3}{3\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \sin \theta = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$$

$$-3+3i = 3\sqrt{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \Rightarrow \theta = \frac{3\pi}{4} \quad \text{Arg}(-3+3i) = \frac{3\pi}{4} //$$

Örnek // $z = (2+2\sqrt{3}i)$ karmaşık sayısını kutupsal biçimde yazınız.

$$|z| = 2\sqrt{1+3} = 4 \quad z = 4 \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 4 \left[\cos \left(\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} \right) \right]$$

Örnek // $\left(\frac{1}{2}\sqrt{3} + \frac{1}{2}i \right)^{100}$ karmaşık sayısını $x+iy$ şeklinde yazınız.

$$z = \frac{1}{2}\sqrt{3} + \frac{1}{2}i \quad |z| = \frac{1}{2}\sqrt{3+1} = 1$$

$$z = 1 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

$$\Rightarrow z = \cos \left(\frac{\pi}{6} + 2k\pi \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{6} + 2k\pi \right)$$

$$\Rightarrow z^{100} = \cos 100 \left(\frac{\pi}{6} + 2k\pi \right) + i \sin 100 \left(\frac{\pi}{6} + 2k\pi \right)$$

$$\Rightarrow z^{100} = \cos \frac{50\pi}{3} + i \sin \frac{50\pi}{3}$$

$$\Rightarrow z^{100} = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$$

$$\Rightarrow z^{100} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$z^{100} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i //$$

Ödev // (-1) sayısının köpköklerini bulun.


$$(-1+i) \quad " \quad " \quad " \quad \sqrt[3]{1+i}$$

$z^5 = -32$ denkleminin $\mathbb{C}$ deki köklerini bulun.

Tanım: Sonlu kümeler ailesinde tanımlanan eşit güçlü olma bağıntısına göre elde edilen ve $0,1,2,3,\dots$ ile gösterilen denklik sınıflarının herbirine bir doğal sayı denir. Bu sayıların kümesine de doğal sayılar kümesi denir.

Doğal sayılar kümesinin bir alt kümesine eşit güçlü olan kümeye sayılabilir küme denir. Sayılabilir olmayan kümeye de sayılamayan küme denir.

$$A = \{x, y, z, a, b\}, B = \{0, 1, 2, 3, 4\} \text{ ise,}$$



teşkil edilen fonksiyon.

1:1 ve örten dir.

$$f: A \xrightarrow[örten]{1:1} B$$

Örnek,, Doğal sayılar kümesinin kendisi sayılabilir mi?

Sonuç: Doğal sayılar kümesi sonsuz kümedir.

Tanım: $S = \{1, 2, 3, \dots\} \subseteq \mathbb{N}$

Doğal sayılar kümesi ile sayma sayıları kümesi arasında eşit güçlülük teşkil ediliyorsa, doğal sayılar kümesi sonsuz kümedir.

Tanım: Bir A kümesi $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ kümesine eşit güçlüyse n'ye A kümesinin eleman sayısı denir.

Boş kümenin eleman sayısı sıfırdır.

Tanım: (Doğal Sayılar Kümesinde Toplama İşlemi):

$x, y \in \mathbb{N}$, x sayısını temsil eden A kümesi ve y sayısını temsil eden ve A ile ayrık olan B kümesinin birleşiminin bulunduğu denklik sınıfına x ve y doğal sayılarının toplamı denir.

$$x \in \bar{A} \text{ ve } y \in \bar{B} \text{ ve } A \cap B = \emptyset \Rightarrow x + y = \overline{A \cup B}$$

Örnek,, 2 ve 3 sayılarının toplamını bulalım.

$$\left. \begin{array}{l} \bar{A} = 2 \quad A = \{a, b\} \\ \bar{B} = 3 \quad B = \{x, y, z\} \end{array} \right\} x + y = \overline{A \cup B} = \{a, b, x, y, z\} = 2 + 3 = 5$$

Teorem: $\{\mathbb{N}, +\}$ 'nın aşağıdaki özellikleri vardır :

- 1- $\forall x, y \in \mathbb{N}, x+y \in \mathbb{N}$ (kapalılık)
- 2- $\forall x, y \in \mathbb{N}, x+y = y+x$ (değişme)
- 3- $\forall x, y \in \mathbb{N}, (x+y)+z = x+(y+z)$ (birleşme)
- 4- $x, 0 \in \mathbb{N}, x+0 = 0+x = x$ (birim eleman)

İspat, $\forall x, y \in \mathbb{N}, x = \overline{A} \wedge y = \overline{B}$ ve $A \cap B = \emptyset, B \cap C = \emptyset, z = \overline{C}$

- 1- $x+y = \overline{A \cup B} \in \mathbb{N}$
- 2- $x+y = \overline{A \cup B} = \overline{B \cup A} = y+x$
- 3- $(x+y)+z = (\overline{A \cup B}) \cup C = \overline{A \cup (B \cap C)} = x+(y+z)$
- 4- $x, 0 \in \mathbb{N}, x = \overline{A}$ ve $0 = \emptyset$

$x+0 = 0+x = x$ (doğal sayılar kümesinin birim elemanı sıfırdır.)

Teorem: Sonlu iki kümenin kartezyen çarpımı da sonludur.

İspat ① A ve B iki küme ve bunlardan birisi boş ise $A \times B = \emptyset$ olur.

$\Rightarrow \emptyset$ sonlu ise $A \times B$ de sonludur.

② $A \neq \emptyset$ ve $B \neq \emptyset$ olsun.

$\Rightarrow A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ olsun.

$\Rightarrow A = \{a_1\} \cup \{a_2\} \cup \dots \cup \{a_n\}$

$\Rightarrow A \times B = (\{a_1\} \cup \{a_2\} \cup \dots \cup \{a_n\}) \times B$

$\Rightarrow A \times B = (\{a_1\} \times B) \cup (\{a_2\} \times B) \cup \dots \cup (\{a_n\} \times B)$

$\Rightarrow A \times B = \{a_1\} \times B \cup \dots \cup \{a_n\} \times B$

Herhangi bir kümeyle bu kümenin herhangi bir elemanının kartezyen çarpımı eşit güçlü bir kümedir denir.

$f: B \xrightarrow{1:1 \text{ örten}} \{a\} \times B$

$x \longmapsto f(x) = \{a, x\}$

$\Rightarrow \{a_1\} \times B$ sonludur.

$\Rightarrow \{a_2\} \times B$ "

$\Rightarrow \{a_3\} \times B$ "

Tanım : (Çarpma) :

X ve y iki doğal sayı olsun. $X = \bar{A}$ ve $y = \bar{B}$ olmak üzere AXB nin bulunduğu denklik sınıfına X ve y doğal sayılarının çarpımı denir.

" $X \cdot y$ " ile gösterilir. $X \cdot y = AXB$ dir.

Teorem : Doğal sayılar kümesinde çarpma işleminin şu özellikleri vardır :

1- Kapatılık özelliği,

2- Değişme özelliği,

3- Birleşme özelliği,

4- Birim eleman özelliği.

İspat,, 1- $\forall X, y \in \mathbb{N}$ için A ve B sonlu kümesi ve $X = \bar{A} \wedge y = \bar{B}$.

$\Rightarrow AXB$ sonludur.

$\Rightarrow Xy = \overline{AXB} \in \mathbb{N}$

2- $\forall X, y \in \mathbb{N}$, $Xy = \overline{AXB} = \overline{BXA}$

$f: AXB \xrightarrow[örten]{1:1} BXA$

$(u, v) \longrightarrow f(u, v)$ fonksiyonunun 1:1 ve örten olduğunu

ispata geçelim.

$\forall (u_1, v_1), (u_2, v_2) \in AXB$, $f(u_1, v_1) = f(u_2, v_2) \Rightarrow (u_1, v_1) = (u_2, v_2)$

$\Rightarrow (u_1 = u_2) \wedge (v_1 = v_2) \Rightarrow (u_1, v_1) = (u_2, v_2)$

sonuç olarak, $\overline{AXB} = \overline{BXA}$

3- $\forall X, y \in \mathbb{N}$, $(xy)z = \overline{(AXB)XC} = \overline{AX(BXC)} = X(yz)$

$x = \bar{A}$ $y = \bar{B}$ $z = \bar{C}$

4- $x, 1 \in \mathbb{N}$, $x = \bar{A} \wedge 1 = \{\bar{a}\}$

$x.1 = AX\{\bar{a}\} = \{a\}XA$ (eşit güçlüdürler, dolayısıyla denklik

sınıfları aynıdır.) $x.1 = 1.x = x$ (1, çarpma işleminde birim elemandır.)

Teorem : $\forall x, y \in \mathbb{N}$ için,

1- $x = y \wedge z = t \Rightarrow (xz = yt)$

4- $\forall x, y \in \mathbb{N}$, $xy = 0 \Rightarrow (x = 0 \vee y = 0)$

2- $x, y, z \in \mathbb{N}$, $x = y \Rightarrow xz = yz$

5- $x(y+z) = xy + xz$

3- $\forall x, y, z \in \mathbb{N}$, $(xy = yz) \wedge y \neq 0 \Rightarrow x = z$

6- $(x+y)z = xz + yz$

İspat // 1- $x, y, z, t \in M, \Rightarrow x = \bar{A}, y = \bar{B}, z = \bar{C}, t = \bar{D}$

$$(x=y \wedge z=t) \quad \bar{A} = \bar{B} \cap \bar{C} = \bar{D} \Rightarrow (A \cup B \cap C \cup D)$$

$$\Rightarrow \exists f: A \xrightarrow[örten]{1:1} B \quad \wedge \quad \exists g: C \xrightarrow[örten]{1:1} D$$

$$xz = \overline{A \cap C} \quad \wedge \quad yt = \overline{B \cap D}$$

$$xz = yt \Rightarrow \overline{A \cap C} = \overline{B \cap D} \quad (\text{Eşit güçlüdürler, yani aralarında 1:1 ve}$$

örten fonksiyonlar vardır. O halde bu fonksiyonu bulacak olursak;)

$$f: A \cap C \longrightarrow B \cap D$$

$$(x, y) \longrightarrow f(x, y) = (f(x), g(y)) \quad (\text{Bu fonksiyonu daha önceden}$$

tanımlanmış ve 1:1 ve örten olduğunu göstermiştik.)

$$xz = (\overline{A \cap C} = \overline{B \cap D}) = yt$$

$$i - (x=y) \wedge (z=t) \Rightarrow (xz=yt)$$

$$ii - x=y \Rightarrow xy=yz$$

$$3 - \forall x, y \in M, (xy=yz \wedge y \neq 0) \Rightarrow x=z$$

$$x = \bar{A} \wedge y = \bar{B} \wedge z = \bar{C} \quad xy=yz \wedge y \neq 0 \Rightarrow B \neq \emptyset$$

(Aksini farzedelim, $x \neq z$ olsun. $\bar{A} \neq \bar{C} \Rightarrow$ iki kümenin denklik sınıfı birbirine eşit değilse, 1:1 ve örten fonksiyon bulunmaz, çünkü eşit güçlü değildirler.)

$$\bar{A} \neq \bar{C} \Rightarrow \exists C_1 \subseteq C, \bar{A} = \bar{C}_1$$

Sonuç olarak, öyle bir f fonksiyonu vardır ki,

$$f: A \xrightarrow[örten]{1:1} C$$

$$xy=yz \Rightarrow \overline{A \cap B} = \overline{B \cap C} = \overline{C \cap B}$$

$$f: A \cap B \xrightarrow[örten]{1:1} C_1 \cap B$$

$$(x, y) \longrightarrow f(x, y) = (f(x), y)$$

$$\text{Sonuç olarak, } A \cap B \cap C_1 \cap B \Rightarrow A \cap B \cap C \cap B \wedge A \cap B \cap C_1 \cap B$$

$$\Rightarrow C \cap B \cap A \cap B \wedge A \cap B \cap C_1 \cap B \quad (\text{simetri öz.})$$

$$\Rightarrow C \cap B \cap C_1 \cap B \wedge C_1 \cap B \subseteq C \cap B \quad C \cap B \text{ kümesi bir özalt kümesine}$$

eşit güçlüdür. O halde $C \cap B$ sonsuzdur. $\Rightarrow x=z$ bağıntısı vardır.

4 - $\forall x, y \in \mathbb{N}, (xy=0) \Rightarrow (x=0 \vee y=0)$

$$(x \neq 0 \wedge y \neq 0) \Rightarrow \exists A, B \quad x = \overline{A} \quad y = \overline{B} \quad \wedge \quad A \neq \emptyset \quad \wedge \quad B \neq \emptyset$$

olacak biçimde A ve B kümeleri vardır.

$$\Rightarrow \exists u \in A \wedge \exists v \in B, (u, v) \in A \times B \Rightarrow A \times B \neq \emptyset$$

$$0 \text{ halde } A \times B \neq \emptyset \Rightarrow \overline{A \times B} = 0 \Rightarrow xy \neq 0$$

sonuç olarak, $x \neq 0$ ve $y \neq 0$ ise $xy \neq 0$ dir.

Bunun karşıt tersi $xy=0 \Rightarrow x=0 \vee y=0$ doğrudur.

Tanım: $x, y \in \mathbb{N}$ $x = \overline{A}$ ve $y = \overline{B}$ olmak üzere $A \subset B$ ise,

"x doğal sayısı, y doğal sayısından küçüktür", denir. Ve

$x < y$ şeklinde yazılır. x küçük y diye okunur. Eğer $A \subseteq B$ ise

x küçüktür veya esittir denir ve $x \leq y$ yazılır.

$$\underbrace{x < y, y < x}_{\text{kuvvetli}}$$

$$\underbrace{x \leq y, y \leq x}_{\text{zayıf}} \quad (\text{doğal sayılarda eşitsizliklerden})$$

Teorem: $x, y \in \mathbb{N}$ olmak üzere; $x < y, y < x, x = y$ önermelerinden ancak birisi doğrudur.

İspat, $x, y \in \mathbb{N}$ olmak üzere $x = \overline{A} \wedge y = \overline{B} \Rightarrow A, B$ kümeleri için

$A \subset B, B \subset A, A = B$ önermelerinden ancak birisi doğrudur.

Teorem: $x, y \in \mathbb{N} \wedge x + y = 0 \Rightarrow (x = 0 \wedge y = 0)$ olur.

İspat, $x, y \in \mathbb{N}$ ve $x + y = 0$ olsun. $\Rightarrow x = \overline{A} \wedge y = \overline{B} \wedge x + y = 0$

$$\Rightarrow x + y = \overline{A \cup B} \wedge A \cap B = \emptyset \text{ dir.}$$

$$\Rightarrow x + y = \overline{A \cup B} \wedge A \cap B = \emptyset \wedge x + y = 0 \Rightarrow \overline{A \cup B} = 0 \Rightarrow A \cup B = \emptyset$$

$$\Rightarrow A = \emptyset \wedge B = \emptyset \text{ olmalıdır.}$$

$$\Rightarrow (x = \overline{A} = \emptyset = 0 \wedge y = \overline{B} = \emptyset = 0) \text{ olur.}$$

Teorem: Bir x doğal sayısının y sayısından küçük olması için ($y \in \mathbb{N}$)

gerek ve yeter şart, $x + k = y$ olacak şekilde bir tek $k \neq 0$

doğal sayısının var olmasıdır.

Sonuç olarak, $x < y \Leftrightarrow x + k = y \wedge k \neq 0$ olmalıdır.

İspat,, 1 $\Rightarrow$: $x, y \in \mathbb{N} \wedge x < y$ olduğunu varsayalım. Buna göre

$\Rightarrow x = \bar{A} \wedge y = \bar{B}$ olacak şekilde bir A ve B kümeleri vardır ki,

x ve y, A ile B'nin denklik sınıflarına eşittir. Ayrıca $x < y$ olduğuna göre

$A \subset B$ dir. Buna göre öyle bir $\exists c \neq \emptyset$ vardır ki,

$A \cup c = B$ dir. (c kümesi $B \setminus A$ ile bulunur.)

$\Rightarrow A \cap c = \emptyset \wedge A \cup c = B$

Sonuç olarak, $\bar{A} \cup c = \bar{B} \Rightarrow x + k = y, k = \bar{c}$

Eğer $x < y$ ise en az bir k doğal sayısı vardır. k'nın tek olduğunu
ispatlamak için aksini ispat edeceğiz.

$k_1, k_2 \in \mathbb{N}$ gibi iki sayı varsa, bu taktirde ;

$x + k_1 = y \wedge x + k_2 = y$ olur $\Rightarrow x + k_1 = x + k_2 \Rightarrow k_1 = k_2$ dir.

2 $\Leftarrow$: $x + k = y \wedge k \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \stackrel{?}{\Rightarrow} x < y$ (iddianın doğru olmadığını farzedelim.)

i- $y < x$ doğru olabilir. Veya

ii- $x = y$ doğru olabilir.

Önce kabul edelim ki, $y < x$ olsun.

i- $\Rightarrow \exists r \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, y + r = x$ (gerek şarttan dolayı)

$\wedge x + k = y \wedge k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ (hipotezden)

(2. ifadedeki y değerini 1. ifadede yerine yazarsak)

$\Rightarrow (x + k) + r = x \Rightarrow x + (k + r) = x \Rightarrow k + r = 0$ olur.

$\Rightarrow (k = 0 \wedge r = 0)$ dir. doğru değildir.

Bu bir çelişkidir. Öyleyse $x = y$ nin doğruluğuna bakalım.

ii- $x = y \Rightarrow x = x + k \wedge k \neq 0 \Rightarrow k = 0$ olur. Bu da bir çelişkidir.

Doğru değildir. Daha önce söylediğimiz ifade de $x < y, x > y, x = y$
önermelerinden yalnız birisi doğru olacağına göre ve $y < x, x = y$ önermeleri
yanlış olduğuna göre $x < y$ önermesi kesinlikle doğrudur. Yani,

$x < y \Leftrightarrow x + k = y \wedge k \neq 0$ dir.

Teorem: $\forall x, y, z, w \in \mathbb{N}$ için,

1- $x < y \Leftrightarrow x + z < y + z$

2- $x < y \wedge z < w \Rightarrow x + z < y + w$

3- $x < y \wedge z \neq 0 \Rightarrow xz < yz$

4- $x < y \wedge z < w \Rightarrow xz < yw$

ispat, 1- $x < y \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, x + k = y \Rightarrow y + z = (x + k) + z$

$$\Rightarrow (x + z) + k = y + z \wedge k \neq 0 \Rightarrow x + z < y + z$$

4- $x < y \wedge z < w \Rightarrow (\exists k \neq 0, x + k = y) \wedge (\exists r \neq 0, z + r = w)$

$$\Rightarrow (x + k)(z + r) = yw \Rightarrow xz + \underbrace{k(z + r) + (x + k)r}_{t} = yw$$

$$\Rightarrow xz + t = yw \wedge t \neq 0 \Rightarrow xz < yw$$

Teorem: $\forall x, y \in \mathbb{N}$ için $(x < y \Rightarrow x + 1 \leq y)$

ispat, $x < y \Rightarrow k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, y = x + k$

$$\Rightarrow \exists t \in \mathbb{N}, k = t + 1 \wedge y = x + k$$

$$\Rightarrow y = x + (t + 1) \Rightarrow y = (x + 1) + t \wedge t \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow (t = 0 \text{ olursa } y = x + 1) \vee (t \neq 0 \text{ olursa } x + 1 < y) \Rightarrow x + 1 \leq y \text{ olur.}$$

Teorem: 0 ile 1 doğal sayıları arasında hiçbir doğal sayı yoktur.

ispat, Bu önermenin doğruluk kümesi D olsun.

$$D = \{x : x \in \mathbb{N} \wedge 0 < x < 1\}$$

$$= \{x : x \in \mathbb{N} \wedge 0 < x \wedge x < 1\} \quad (x < y \Rightarrow x + 1 \leq y)$$

$$= \{x : x \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq x \wedge x < 1\} \quad \text{bu önerme yanlıştır.}$$

$$D = \{x : x \in \emptyset\} = \emptyset \quad \text{Bu önermenin doğruluk kümesi } \emptyset \text{ dir.}$$

Yani 0 ile 1 arasında doğal sayı yoktur.

- Tümevarım İlkesi -

$\mathbb{N}_a$ (Doğal sayıların bir alt kümesi olsun.)

Buradaki a bu kümenin en küçük elemanıdır.

1- $a \in \mathbb{N}_a$ 2- $\forall k \in \mathbb{N}_a \Rightarrow k + 1 \in \mathbb{N}_a \quad (k > a)$

Uygulaması: $n \in \mathbb{N}$ olmak üzere $P(n)$ önermesi veriliyor. Ve doğruluğunun ispatlanması isteniyor.

1- $n=a$ için $P(a)$ doğrudur. (ispat)

2- $\forall k \in \mathbb{N} \wedge k > a$ için $P(k)$ doğrudur. (kabul edisin)

3- $P(k+1)$ 'in doğruluğu. ($P(k)$ 'nin doğruluğundan yararlanılarak ispatlanıyor.)

Sonuç olarak;

$P(n)$ önermesi, a 'dan büyük veya eşit her doğal sayı için doğrudur deniliyor.

Örnek, Sayma sayıları kümesi S olmak üzere,

$\forall n \in S$ için $1+2+3+4+\dots+(n-1)+n = \frac{n(n+1)}{2}$ olduğunu ispatlayalım.

$n=1$ için, doğruluğunu ispatlamak için her iki tarafa n yerine 1 yazılır.

$$1 \stackrel{?}{=} \frac{1 \cdot 2}{2} \Rightarrow 1=1 \quad n=1 \text{ için önerme doğrudur.}$$

$n=k$ için, önerme doğru olsun, yani;

$$1+2+3+\dots+(k-1)+k = \frac{k(k+1)}{2} \text{ olsun.}$$

$n=k+1$ için,

$$\begin{aligned} 1+2+3+\dots+k+(k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= (k+1) \left(\frac{k}{2} + 1 \right) = \frac{(k+1)(k+2)}{2} \end{aligned}$$

Sonuç olarak, $k+1$ için önerme doğrudur. O halde tümevarım ilkesine göre

$\forall n \in S$ için $1+2+3+4+\dots+(n-1)+n = \frac{n(n+1)}{2}$ önermesi doğrudur.

Tanım: $x \in \mathbb{N}$ olsun.

a- $x \neq 0$ ise $x^0 = 1$

b- $x^1 = x$

c- $\forall x \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \{1\}$ için $x^{n+1} = x^n \cdot x$

d- x^n ye x 'in n . kuvveti denir. ($n \in \mathbb{N}$)

(özel olarak; x^2 : x kare, x^3 : x küp diye okunur.)

Örnek, $2^3 = 2^2 \cdot 2 = (2 \cdot 2) \cdot 2 = 8$

$2^0 = 1$, $0^1 = 0$, $0^5 = 0$, $0^0 = \text{tanımsız.}$

Teorem: $x, y, m, n \in \mathbb{N}$ olsun.

a- $x^m, x^n \in \mathbb{N}$ ise $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$ dir.

b- $x^n, (x^m)^n \in \mathbb{N}$ ise $(x^m)^n = x^{m \cdot n}$ dir.

c- $(x \cdot y)^n \in \mathbb{N}$, $(xy)^n = x^n \cdot y^n$ dir.

d- $x \neq 0$ ve $m \geq n$ ise $x^m : x^n = x^{m-n}$ dir.

İspat // a- $x^m, x^n \in \mathbb{N}$ olsun. ($x=0 \Rightarrow m \neq 0 \wedge n \neq 0$)

$x=0$ ve $x \neq 0$ hallerini ayırt edelim

i- $x \neq 0$ olsun. $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$ önermesini doğrulayan n doğal

sayılarının kümesi D olsun. Acaba $1 \in D$ midir?

Sol tarafta n yerine 1 yazarak ispatlarız.

$$x^m \cdot x^1 = x^m \cdot x = x^{m+1}$$

$n=1$ için önerme doğrudur. O halde $1 \in D$ dir.

$n=k$ için $k \in D$ olsun.

$$x^m \cdot x^{k+1} = x^m (x^k \cdot x) \quad (\text{tanımdan})$$

$$= (x^m \cdot x^k) x \quad (\text{birleşme öz.})$$

$$= x^{m+k} x \quad (\text{kabulden dolayı})$$

$$= x^{(m+k)+1} \quad (\text{tanımdan})$$

$$= x^{m+(k+1)} \quad (\text{birleşme öz.})$$

Sonuç olarak $x^m \cdot x^{k+1} = x^{m+(k+1)} \Rightarrow k+1 \in D$ dir.

Tümevarım ilkesinden dolayı, $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$ dir.

Tanım: (Çıkarma):

$a, b \in \mathbb{N}$ olsun. $x+a=b$ olacak şekilde bir x doğal sayısı varsa

bu sayıya b ve a doğal sayılarının farkı denir. (b 'den a 'nın farkı denir.)

ve $x = b - a$ şeklinde yazılır. Farkı bulmak için yapılan işleme de, doğal sayılarda çıkarma işlemi denir.

Tanım: (Bölme):

$a, b \in \mathbb{N}$ olmak üzere $a \cdot x = b$ olacak şekilde bir x doğal sayısı varsa,

bu sayıya b 'nin a 'ya bölümü denir. Bölümü bulmak için yapılan işleme de doğal sayılarda bölme işlemi denir.

$$ax = b \Rightarrow x = b : a \text{ şeklinde gösterilir.}$$

Eğer $ax = b$ ise bu duruma " a, b 'yi böler" denir. Ve sembolik olarak a/b şeklinde yazılır. Sonuç olarak,

$$a/b \Leftrightarrow a, b \in \mathbb{N}, \exists x \in \mathbb{N}, ax = b$$

Teorem: Doğal sayılar kümesinde $(\mathbb{N} \setminus \{0\})$ bölünebilme bağıntısı bir sıralama bağıntısıdır. (İspatı yapılmayacaktır.)

Problemler:

$$1 - \sum_{i=1}^n (2i) = n(n+1) \quad 2 - \sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2 \quad 3 - \sum_{i=1}^n (3i-2) = \frac{1}{2}n(3n-1)$$

$$4 - \sum_{i=1}^n 3^{i-1} = \frac{1}{2}(3^n - 1) \quad 5 - \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

$$6 - \sum_{i=1}^n i(i+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2) \quad 7 - \forall n \in \mathbb{N}, 2^n > n$$

$$8 - \forall n \in \mathbb{N}, 3/n^3 + 2n \quad 9 - \forall n \in \mathbb{N}, 4/3^{2n} - 1$$

$$10 - n > 4, n \in \mathbb{N}, n! > 2^n \quad 11 - \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \sum_{i=1}^n i(i!) = (n+1)! - 1$$

özdeşliklerinin doğru olduğunu ispatlayınız.

Çözümler:

$$1 - n=1 \text{ için } \sum_{i=1}^1 (2i) = 2 \cdot 1 = 2 \quad 1(1+1) = 2 \text{ doğrudur.}$$

$n=k$ için doğru olsun, yani:

$$\sum_{i=1}^k (2i) = k(k+1) \text{ olsun.} \quad n = k+1, \quad \sum_{i=1}^{k+1} (2i) = (k+1)(k+2)$$

$$\sum_{i=1}^{k+1} (2i) = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + 2k + 2(k+1) = \sum_{i=1}^k (2i) + 2(k+1)$$

$$= k(k+1) + 2(k+1) = (k+1)(k+2)$$

$(k+1)$ için önerme doğru olduğundan, tüm önerme doğru olur.

$$2 - \sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$$

$$n=1 \text{ için } \sum_{i=1}^1 (2i-1) = (2 \cdot 1 - 1) = 1 \quad 1^2 = 1 \quad 1 \in \mathbb{N}$$

$n=k$ için doğru olsun.

$$\sum_{i=1}^k (2i-1) = k^2$$

$$\Rightarrow (2.1-1) + (2.2-1) + (2.3-1) + \dots + (2k-1) = k^2 \text{ olsun.}$$

$$\Rightarrow 1 + 3 + 5 + \dots + (2k-1) = k^2 \text{ olduğunu kabul ediyoruz.}$$

$$n = k+1, \sum_{i=1}^{k+1} (2i-1) \stackrel{?}{=} (k+1)^2 \text{ olduğunu ispatlayacağız.}$$

$$\sum_{i=1}^{k+1} (2i-1) = (2.1-1) + (2.2-1) + (2.3-1) + \dots + (2k-1) + \underbrace{2((k+1)-1)}_{2k+1}$$

$$= k^2 + (2k+1)$$

$$= k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2, (k+1) \in \mathbb{D}$$

Önermenin doğruluğu böylece ispatlanmış oldu.

$$3- \sum_{i=1}^n (3i-2) \stackrel{?}{=} \frac{1}{2} n(3n-1)$$

$$n=1 \text{ için } \sum_{i=1}^1 (3i-2) = (3.1-2) = 1, \quad \frac{1}{2} 1(3.1-1) = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1 \text{ doğrudur.}$$

$$n=k \text{ için } \sum_{i=1}^k (3i-2) = \frac{1}{2} k(3k-1) \text{ doğru olsun.}$$

$$= (3.1-2) + (3.2-2) + \dots + (3k-2) + \frac{1}{2} k(3k-1) \text{ olsun.}$$

$n=k+1$ için doğruluğuna bakalım,

$$\sum_{i=1}^{k+1} (3i-2) \stackrel{?}{=} \frac{1}{2} (k+1)[3(k+1)-1]$$

$$\stackrel{?}{=} \frac{1}{2} (k+1)(3k+2)$$

$$\sum_{i=1}^{k+1} (3i-2) = (3.1-2) + (3.2-2) + \dots + (3k-2) + [3(k+1)-2]$$

$$= \sum_{i=1}^k (3i-2) + 3k+1$$

$$= \frac{1}{2} k(3k-1) + 3k+1$$

$$= \frac{3}{2} k^2 - \frac{1}{2} k + 3k + 1$$

$$= \frac{3}{2} k^2 + \frac{5}{2} k + 1$$

$$= \frac{1}{2} (3k^2 + 5k + 2) = \frac{1}{2} (k+1)(3k+2), \quad k+1 \in \mathbb{D}$$

Önerme $k+1$ için doğru olduğundan, doğru bir önermedir.

$$4- \forall n \in \mathbb{N}, 3/n^3 + 2n$$

$$n=1 \text{ için } 1^3 + 2.1 = 3 \Rightarrow 3/3 \text{ doğrudur.}$$

$$n=k \text{ için } 3/k^3 + 2k \text{ doğru olsun.}$$

$$n=k+1 \text{ için } 3/(k+1)^3 + 2(k+1) \text{ ?}$$

$$(k+1)^3 + 2(k+1) = k^3 + 3k^2 + 3k + 1 + 2k + 2 = (k^3 + 2k) + (3k^2 + 3k + 3)$$

$$= 3 + 3k^2 + 3k + 3 = 3(4 + k^2 + k + 1), \quad 4 + k^2 + k + 1 \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow 3/(k+1)^3 + 2(k+1) \quad k+1 \in \mathbb{D} \text{ önerme doğrudur.}$$

5- $n \geq 4, n \in \mathbb{N}, n! > 2^n$ olduğunu ispatlayalım.

$$n=4 \text{ için, } 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 \quad 2^4 = 16 \quad 4! > 2^4 \text{ doğrudur.}$$

$n=k$ için, $k! > 2^k$ doğru olsun.

$n=k+1$ için, $(k+1)! > 2^{k+1}$ olduğunu ispatlayalım.

$$(k+1)! = k!(k+1) > 2^k(k+1) \quad (\text{kabulden dolayı})$$

$$\Rightarrow 2^k(k+1) > 2^k \cdot 2 \quad (k+1 \text{ yerine ondan daha küçük olan } 2 \text{ yazılarak.})$$

$$\Rightarrow (k+1)! > 2^{k+1} \text{ olur. Verilen önerme doğrudur.}$$

6- $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \sum_{i=1}^n i(i!) \stackrel{?}{=} (n+1)! - 1$

$$n=1 \text{ için, } \sum_{i=1}^1 i(i!) = 1(1!) = 1 \quad (1+1)! - 1 = 1 \quad 1 \in \mathbb{D}$$

$$n=k \text{ için, } \sum_{i=1}^k i(i!) = (k+1)! - 1 \text{ doğru olsun.}$$

$$n=k+1 \text{ için, } \sum_{i=1}^{k+1} i(i!) = 1(1!) + 2(2!) + \dots + k(k!) + (k+1)(k+1)!$$

$$= \sum_{i=1}^k i(i!) + (k+1)(k+1)!$$

$$= (k+1)! - 1 + (k+1)(k+1)!$$

$$= (k+1)! (1 + k+1) - 1$$

$$= (k+1)! (k+2) - 1 = (k+2)! - 1 \quad k+1 \in \mathbb{D} //$$

Doğal Sayıların Çeşitli Tabanlara Göre Yazılışı

Teorem: $X \neq 0$ olmak üzere, $X \in \mathbb{N}$ sayısı ve $a > 1$ olmak üzere bir a doğal sayısı verilsin. $i \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ olmak üzere $i \neq n$ için $0 \leq X_i < a$ ve $i=n$ için $0 < X_i < a$ olan $n+1$ tane $X_0, X_1, \dots, X_n$ doğal sayıları vardır.

Bu doğal sayılar yardımıyla bir X doğal sayısı tek türlü olarak;

$$X = X_0 + X_1 a + X_2 a^2 + \dots + X_n a^n \text{ şeklinde yazılır.}$$

İspat, Varlığın ispatı;

Bu şekilde yazılabilen X doğal sayılarının kümesi D olsun.

$$a^0 = 1 \Rightarrow 1 \cdot a^0 = 1 \quad X_n a^n = 1 \quad n=0 \Rightarrow 1 \in D$$

$$2, 3, \dots, X \in D \text{ olsun. } \Rightarrow X+1 \stackrel{?}{\in} D$$

$$1 < a, a < a^2, a^2 < a^3, \dots, a^n < a^{n+1}$$

$$\Rightarrow a^n < X+1 < a^{n+1} \quad X+1 \text{ sayısını } a^n \text{ e bölelim.}$$

(Tanımdan sonra devam edecek.)

Tanım : (Kalanlı Bölme) :

a ve b doğal sayıları verildiğinde, $a = bq + r$ $\wedge$ $0 \leq r < b$ olacak şekilde q ve r doğal sayılarını bulma işlemine, a 'nın b 'ye kalanlı olarak bölümlü denir. Bu işleme de doğal sayılarda kalanlı bölme denir.

Örnek // $5, 25 \Rightarrow 25 = 5 \cdot 5 + 0$

$$17, 9 \Rightarrow 17 = 9 \cdot 1 + 8, \quad 0 < 8 < 9$$

$$9, 17 \Rightarrow 9 = 17 \cdot 0 + 9, \quad 0 < 9 < 17$$

İspatın devamı : $\Rightarrow X+1 = a^n q + r$ olacak şekilde q ve $r \in \mathbb{N}$ vardır.

$$\wedge 0 \leq r < a^n \Rightarrow r < X+1 \text{ dir. (Sonuç)}$$

$$\Rightarrow X+1 - r > 0 \Rightarrow a^n q > 0 \Rightarrow q = X_n \Rightarrow a^n q = X_n a^n$$

biçiminde ifade edebiliriz.

$$\Rightarrow X+1 = X_n a^n + r \wedge r < X+1 \Rightarrow r \in \mathbb{D}$$

$$\Rightarrow r = x_0 + x_1 a + x_2 a^2 + \dots + x_k a^k \text{ olarak yazılabilir.}$$

$$\Rightarrow X+1 = x_0 + x_1 a + x_2 a^2 + \dots + x_k a^k + X_n a^n$$

$$X+1 = x_0 + x_1 a + x_2 a^2 + \dots + x_k a^k + \underbrace{0 a^{k+1} + 0 a^{k+2} + \dots + x_{n-1} a^{n-1} + x_n a^n}_0$$

$$\Rightarrow X+1 = x_0 + x_1 a + x_2 a^2 + \dots + x_n a^n \Rightarrow X+1 \in \mathbb{D} \text{ olur.}$$

Tekliliğin İspatı ;

Aksini farzederek,

$$X = x_0 + x_1 a + x_2 a^2 + \dots + x_n a^n$$

$$y = y_0 + y_1 a + y_2 a^2 + \dots + y_n a^n \text{ iki şekilde yazılsın.}$$

$$\Rightarrow X = x_0 + a(x_1 + x_2 a + \dots + x_n a^{n-1}) \wedge y = y_0 + a(y_1 + y_2 a + \dots + y_n a^{n-1})$$

$$\Rightarrow X = x_0 + a q_1 \wedge y = y_0 + a q_2 \Rightarrow x_0 = y_0 \Rightarrow q_1 = q_2 = q$$

$$\Rightarrow q = x_1 + x_2 a + \dots + x_n a^{n-1} \wedge q = y_1 + y_2 a + \dots + y_n a^{n-1}$$

$$\Rightarrow q = x_1 + a(x_2 + \dots + x_n a^{n-2}) \wedge q = y_1 + a(y_2 + \dots + y_n a^{n-2})$$

$$\Rightarrow x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_n = y_n \text{ elde edilir.}$$

Tanım: $i \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ olsun. $i \neq n$ için $0 \leq x_i < a$ ve $i = n$ için

$0 < x_i < a$ olmak üzere sıfırdan farklı X doğal sayısının,

$x_0 + x_1 a + x_2 a^2 + \dots + x_n a^n$ şeklinde yazılmasına " a tabanına göre ağırlımı" denir. $(x_n x_{n-1} \dots x_2 x_1 x_0)_a$ şeklinde yazılır.

Sonuç olarak;

$$X = (x_n x_{n-1} \dots x_3 x_2 x_1 x_0)_a = x_0 + x_1 a + x_2 a^2 + \dots + x_n a^n \text{ yazılır.}$$

Örnek, $a = 2$ ise sembolleri 0, 1 dir.

$a = 10$ ise 0, 1, 2, ..., 8, 9 sembolleri kullanılır.

$a = 12$ ise 0, 1, 2, ..., 8, 9, W, V sembolleri kullanılır.

Not: X doğal sayısını a tabanına göre yazarken, burada kullanılan sayılar

$x_n, x_{n-1}, \dots, x_2, x_1, x_0$ doğal sayılarına özel semboller bulunmalıdır.

Bir X sayısını a tabanına göre yazdığımızı forzedelim.

$$X = x_0 + x_1 a + x_2 a^2 + \dots + x_n a^n = (x_n x_{n-1} \dots x_2 x_1 x_0)_a$$

$$X = x_0 + a \underbrace{(x_1 + x_2 a + \dots + x_n a^{n-1})}_q \quad (q : \text{bölümdür.})$$

$$X = x_0 + a q \quad (x_0 : X \text{'in } a \text{'ya bölümünden elde edilen I. kalandır.})$$

$$q = x_1 + x_2 a + x_3 a^2 + \dots + x_n a^{n-1} \Rightarrow q = x_1 + a \underbrace{(x_2 + x_3 a + \dots + x_n a^{n-2})}_{q_1}$$

$$\Rightarrow q = x_1 + a q_1 \quad (x_1 : q \text{ nun } a \text{ ya bölümündeki II. kalandır.})$$

$$\Rightarrow q_1 = x_2 + x_3 a + \dots + x_n a^{n-2} = x_2 + a \underbrace{(x_3 + \dots + x_n a^{n-3})}_{q_2}$$

$$x_2 = \text{III. kalan} \quad x_3 = \text{IV. kalan}$$

Örnek, 97 sayısını 5 tabanında yazınız.

$$\begin{array}{r|l} 97 & 5 \\ -5 & 19 \\ \hline 47 & 5 \\ -15 & 3 \\ \hline 45 & 0 \\ \hline 2 & \end{array}$$

$$97 = (342)_5$$

Örnek, 12 sayısını 12 tabanına göre yazınız.

$$\begin{array}{r|l} 12 & 12 \\ -12 & 1 \\ \hline 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 \\ \hline 1 & \end{array}$$

$$12 = (10)_{12}$$

Örnek //

3000 sayısını 12 tabanında yazınız.

$$\begin{array}{r|l}
 3000 & 12 \\
 \hline
 -24 & 250 \\
 \hline
 60 & -24 \\
 \hline
 60 & 10 \\
 \hline
 0 & -12 \\
 \hline
 & 8 \\
 & -0 \\
 & 1 \\
 & 0
 \end{array}$$

10 = u dersek

$$3000 = (18u0)_{12}$$

Geşitli Sayı Tabanlarına Göre İşlemler

Örnek //

(342)₅ sayısını 10 tabanında yazınız.

$$3 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5 + 2 \cdot 5^0 = 75 + 20 + 2 = 97$$

$$(342)_5 = 97$$

Toplama işlemi =

$$(231)_8 + (64)_8 = (315)_8$$

Çıkarma işlemi =

$$(4172) - (277) = 3673_8$$

Çarpma işlemi =

$$\begin{array}{r}
 (2032)_4 \\
 \times (312)_4 \\
 \hline
 10130 \\
 2032 \\
 + 12222 \\
 \hline
 1313310
 \end{array}
 \quad (1313310)_4$$

Bölme işlemi =

$$\begin{array}{r|l}
 (21220111)_3 & (10212)_3 \\
 \hline
 -21201 & (2001)_3 \\
 \hline
 00012111 & \\
 -10212 & \\
 \hline
 0(1122)_3 &
 \end{array}$$

Karekök Alma :

$$\begin{array}{r|l}
 \sqrt{225} & 15 \\
 \hline
 -1 & 1 \times 2 \rightarrow 25 \\
 \hline
 125 & \times 5 \\
 \hline
 125 & 125 \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l}
 \sqrt{24041}_6 & 135 \\
 \hline
 -1 & (1)_6 \times (2)_6 \rightarrow (23)_6 \\
 \hline
 (140)_6 & \times (3)_6 \\
 \hline
 - (113)_6 & (113)_6 \\
 \hline
 02341 & \\
 -2341 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r|l}
 (13)_6 \times (2)_6 \rightarrow (305)_6 \\
 \hline
 \times (5)_6 \\
 \hline
 (2341)_6
 \end{array}$$

10 tabanına çevirmeden bir sayıyı başka bir tabana göre yazma :

Örnek,, $(3420)_6$ 7 tabanında yazınız.

Önce 10 tabanında verilen 7 sayısını 6 tabanında yazarız.

$$\begin{array}{r|l} 7 & 6 \\ -6 & 1 \ 6 \\ \hline 1 & -0 \ 0 \\ & 1 \end{array}$$

$$7 = (11)_6$$

$$\begin{array}{r|l} (3420)_6 & (11)_6 \\ -33 & (310)_6 \\ \hline 12 & -22 \\ & (50)_6 \\ -11 & (44)_6 \\ \hline x_0 = (10)_6 & x_1 = (2)_6 \end{array}$$
$$\begin{array}{r|l} (11)_6 & (11)_6 \\ -24 & (24)_6 \\ \hline (22)_6 & (22)_6 \\ -22 & (0)_6 \\ \hline x_2 = (2)_6 & x_3 = (2)_6 \end{array}$$

$$(3420)_6 = [(2)_6 (2)_6 (2)_6 (10)_6]_{(11)_6} = (2226)_7$$

Problemler :

1 - $(3467)_8$, 7 tabanında yazınız.

$(6012)_{12}$, 11 " " .

$(100101001)_2$, 10 " " .

2 - Çeşitli tabanlara göre verilen aşağıdaki işlemleri yapın.

$$(10232)_4 + (3133)_4 = ?$$

$$(6716)_8 - (717)_8 = ?$$

$$(7804)_{12} + (0V29)_{12} + (V00V)_{12} = ?$$

$$(23141)_5 - (11123)_5 = ?$$

$$(78216)_9 \cdot (348)_9$$

$$(90V)_{12} \cdot (V \cdot 6)_{12} = ?$$

3 - 10 tabanına göre yazmadan $(24341)_5$ sayısının $(131)_5$ sayısına bölümündeki kalan nedir?

$$4 - (151) = (227)_t \Rightarrow t = ?$$

$$5 - \sqrt{(21301)_4} , \sqrt{(562)_7} = ?$$

$$6 - \{ [(10000110)_2 + (10001)_2] - [(101)_2 \cdot 11] \} : (1001)_2 = ?$$

7 - $a = n^2 + 1 \Rightarrow n^2 + 2, n^2 + 2n, (n^2 + 2)^2$ sayılarını a tabanına göre yazınız?

5-

$$\begin{array}{r|l}
 (121)_4 & \\
 \hline
 \sqrt{(21301)_4} & (1)_4 \times (2)_4 \rightarrow (22)_4 \quad \rightarrow (\text{sürekli } 2 \text{ ile çarpılır.}) \\
 - (1)_4 & \times (2)_4 \\
 \hline
 (113)_4 & (110)_4 \\
 - (110)_4 & \\
 \hline
 (301)_4 & (12)_4 \times (2)_4 \rightarrow (301)_4 \\
 - (301)_4 & \times (1)_4 \\
 \hline
 0 & (301)_4
 \end{array}$$

$$\sqrt{(21304)_4} = (121)_4$$

$$\begin{array}{r|l}
 (23)_7 & \\
 \hline
 \sqrt{(562)_7} & (2)_7 \times (2)_7 \rightarrow (43)_7 \\
 - (4)_7 & \times (3)_7 \\
 \hline
 (162)_7 & (162)_7 \\
 - (162)_7 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

$$\sqrt{(562)_7} = (23)_7$$

7-

$$a = n^2 + 1$$

$$\begin{array}{r|l}
 n^2 + 2 & n^2 + 1 \\
 \hline
 7n^2 + 1 & 1 \\
 \hline
 X_0 = 1 & X_1 = 1
 \end{array}$$

$$(n^2 + 2)_{10} = (11)_a$$

$$9- \quad t > 2 \quad (121)_t = t^0 \cdot 1 + t^1 \cdot 2 + t^2 \cdot 1 = 1 + 2t + t^2 = (t+1)^2 \text{ tamkaredir.}$$

$$\begin{aligned}
 10- \quad (X_1 X_2 X_3 X_3 X_2 X_1)_a &= X_1 a^0 + X_2 a + X_3 a^2 + X_3 a^3 + X_2 a^4 + X_1 a^5 \\
 &= X_1 + X_2 a + X_3 a^2 + X_3 a^3 + X_2 a^4 + X_1 a^5 \\
 &= X_1 (1 + a^5) + X_2 a (1 + a^3) + X_3 a^2 (1 + a) \\
 &= X_1 (a+1)(a^4 - a^3 + a^2 - a + 1) + X_2 a (a+1)(a^2 - a + 1) + X_3 a^2 (1 + a) \\
 &= (a+1) [X_1 (a^4 - a^3 + a^2 - a + 1) + X_2 a (a^2 - a + 1) + X_3 a^2] \\
 &= a+1 / (X_1 X_2 X_3 X_3 X_2 X_1)
 \end{aligned}$$

Devamı (S: 109) da ...

(S: 118 'den devam :)

Tamsayılar Kümesinde Bölme :

Tanım: $a, b \in \mathbb{Z}$ ve $a \neq 0$ olsun. $b = ax$ olacak biçimde bir x tamsayısı varsa

a 'ya b 'nin bir çarpanı (veya, b 'ye a 'nın bir katı), x sayısına b 'nin a 'ya bölümü denir. Ve $x = b : a$ yazılır.

a sayısı, b 'nin bir çarpanı ise b sayısı a sayısına bölünebiliyor denir ve a/b olarak yazılarak anlatılır. " a böler b " diye okunur.

Uyarı // Tamsayılar kümesi bölme işlemine göre kapalı değildir. Neden ?

Tanım: $a, b \in \mathbb{Z}$ olsun. X ve y herhangi tamsayılar olduğuna göre $ax+by$ tamsayısına a ve b tamsayılarının bir lineer toplamı denir.

1. Teorem: $a, b, c, x, y \in \mathbb{Z}$ olsun.

$$(a|b \wedge a|c) \Rightarrow a|(bx+cy)$$

İspat // $(a|b \wedge a|c) \Rightarrow \exists k, t \in \mathbb{Z}, (b=ak, c=at)$

$$\Rightarrow bx+cy = (ak)x + (at)y$$

$$\Rightarrow bx+cy = a(kx+ty)$$

$$\Rightarrow a|kx+ty \Rightarrow a|bx+cy$$

2. Teorem: $a, b \in \mathbb{Z}$ olsun.

$$(a|b \wedge b|a) \Rightarrow (b=a \vee b=-a)$$

İspat // $(a|b \wedge b|a) \Rightarrow \exists k, t \in \mathbb{Z}, b=ak \text{ ve } a=bt$

$$\Rightarrow ab = abkt$$

$$\Rightarrow 1=kt \Rightarrow k=t=1 \vee k=t=-1$$

$$\text{Öte yandan } (b=ak \text{ ve } k=1) \Rightarrow b=a$$

$$(a=bt \text{ ve } t=-1) \Rightarrow b=-a$$

3. Teorem: $\forall x, y, z \in \mathbb{Z}, (x|y \wedge y|z) \Rightarrow x|z$

İspat // $(x|y \wedge y|z) \Rightarrow \exists k, t \in \mathbb{Z}, y=kx \text{ ve } z=ty$

$$\Rightarrow \exists k, t \in \mathbb{Z}, z=t(kx) = (kt)x$$

$$\Rightarrow x|z$$

Uyarı // $\mathbb{Z}$ 'de yukarıda tanımlanmış olan "1" bölme bağıntısı, denklik bağıntısı olmadığı gibi sıralama bağıntısı da değildir.

Tamsayılar Kümesinde Kalanlı Bölme :

Tanım: $a, b \in \mathbb{Z}$ ve $b \neq 0$ olsun. a 'yı b 'ye kalanlı olarak bölmek demek,

$$a = bq + r \text{ ve } 0 \leq r < |b| \text{ olacak biçimde bir } q \text{ tamsayısı ile bir}$$

r doğal sayısını bulmak demektir. Bu durumda a 'ya bölünen, b 'ye bölen

q 'ya bölüm, r 'ye kalan denir.

Örnek,, $25 = 6 \cdot \underline{4} + \underline{1}$ ve $0 < 1 < 6$ olduğundan, 25 sayısının 6'ya bölümünde bölüm 4, kalan 1'dir.

Örnek,, $14 = (-4)(\underline{-3}) + \underline{2}$ ve $0 < 2 < |-4|$ olduğundan, 14 sayısının -4 ile bölümünde, bölüm -3, kalan 2 dir.

(Devamı s: 119'da...)